

Atların afrika xəstəliyinə
insanlar yoluxmur!

Virusun ölkə ərazisinə daxil olmasının
qarşısının alınması məqsədi ilə atların iddal
edildiyi ölkələrdə bu xəstəliklə bağlı son
epizootik vəziyyət izlənilməlidir.



Azərbaycanda atların afrika
xəstəliyi qeydə alınmayıb. Odur ki,
bu xəstəliyə qarşı ölkəmizdə atlar
arasında **profilaktiki peyvəndləmə**
tədbirləri həyata keçirilmir.

XƏSTƏLİYİN İQTİSADI ZƏRƏRLƏRİ ATLARIN AFRİKA XƏSTƏLİYİNİN MÜALİCƏSİ YOXDUR.

Xəstəlik nəticəsində heyvanlar arasında kütləvi
tələfat baş verir;
Xəstə və xəstəliyə şübhəli atlar öldürülərək
cəsədləri məhv edilir;
Xəstəlik baş verdikdə təsərrüfata karantin tətbiq
edilir;
Xəstəliyin mövcudluğu ölkələrarası beynəlxalq
ticarəti, o cümlədən yeni at cinslərinin ölkəyə
iddalını məhdudlaşdırır.



Azərbaycan Respublikasının
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

✉ info@afsa.gov.az
🌐 www.afsa.gov.az
📞 +994 12 377 00 77



ATLARIN AFRİKA XƏSTƏLİYİ

ATLARIN AFRIKA XƏSTƏLİYİ

Atlar arasında yüksək tələfata (90-95%) səbəb olan transmissiv yoluxucu virus xəstəliyidir.

XƏSTƏLİK HAQQINDA MƏLUMAT

Azərbaycanda indiyədək atların afrika xəstəliyi qeydə alınmayıb. Xəstəliyin törədiciləri reoviruslar ailəsindən olan RNT-li viruslardır.

XƏSTƏLİYİN MƏNBƏYİ VƏ XƏSTƏLİYƏ YOLUXMA YOLLARI

İnfeksiya törədicisinin mənbəyi qansoran həşəratlar hesab olunur. Virus sağlam heyvanlara qansoran həşəratların (ağcaqanad, gənə, milçək) dəri örtüyünü dişləməsi nəticəsində sirayət edir. Törədicinin sağlam heyvanlara birbaşa təmas zamanı yoluxması isə istisnalıq təşkil edir.

Cavan atlar xəstəliyə daha çox həssasdır.

Xəstəlik mövsümi xarakter daşıyır.

XƏSTƏLİYİN GEDIŞİ

XƏSTƏLİYİN GEDIŞİ 4 FORMADA MÜŞAHİDƏ OLUNUR: İLDİRİMVARİ, İTİ, YARIMİTİ, QARIŞIQ.

İldirimvari - inkubasiya müddəti 3-4 gündür. Bədən hərarəti kəskin surətdə 41°C-dək yüksəlir, 5-7 günə heyvan ölürlər.

İti - ağıciyər formasıdır. Hərarət yüksəlir, tənəffüs çətinləşir, öskürək başlanır, burun və ağız boşluqlarından serozlu maye axır.

Yarımıti - ürək formasıdır. Daha uzun müddəli inkubasiya dövrü 7 günədək olur. Yüksek hərarət 3-4 gün davam edir, Heyvan 10-15 gün içində ürək fəaliyyətinin zəifliyi nəticəsində ölürlər.

Qarışiq - kliniki əlamətlər yuxarıda təsvir olunan formaların hamısının eyni vaxtda biruzə verməsi ilə xarakterizə olunur, hipoksiya və heyvanın ölümü ilə nəticələnir.

XƏSTƏLİYİN KLINİKİ ƏLAMƏTLƏRİ

- Yüksek hərarət
- Dərialtı toxumada şişkinliklər
- Öskürək
- Ürək çatışmazlığı
- Göz qapaqlarının şışməsi
- Tənəffüs yollarının selikli qışasının iltihabı
- Hemorragiya

XƏSTƏLİYƏ QARŞI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ

Təsərrüfatlarda mütəmadi olaraq kompleks baytarlıq-sanitariya tədbirləri həyata keçirilməlidir. Təsərrüfata yeni alınmış atlar mütləq karantində saxlanılmalıdır.

Atların afrika xəstəliyi aşkar olunan ölkələrdə heyvanlar arasında profilaktiki peyvəndləmə tədbirləri həyata keçirilir.

Heyvanlarda peyvəndləmə bir ildən çox müddətə immunitet yaradır.

