| № | Preparatın adı | İstehsalçı şirkətin adı | İstehsalçı ölkənin adı | Preparatın tipi | Preparatın növü | Təsiredici maddənin adı | t.e.m - miqdarı (qr ,ml) | ölçü vahidi | Qeydiyyat şəhadətnaməsi | | | Preparatın mənşə ölkəsi | Preparatın tətbiq sahəsi | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | N-si | Qeydiyyat tarixi | Qeydiyyatın bitmə tarixi | | Preparatın tətbiq edilmə norması | Bitki | Zərərli orqanizm | Preparatın tətbiq olunma üsulu, vaxtı, xüsusiyyəti | Gözləmə müddəti(işləmlərin sayı | Əl ilə (mexanikləşdirilmiş) işlərə başlama vaxtı |
| 1 | Lamdex 50 CS | Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | q/L | 000785 | 13.04.2020 | 13.04.2025 | İsrail Dövləti | 0,5 l/500 lt suya | kartof | kolorado böcəyi | zərərvericinin 2%-dən çox bitkiya yayıldığı dövrdə çiləmə aparılır | 20(2) | 7(3) |
| 2 | Goltix Plus | Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metamitron+Ethofumesate | 350+150 | q/L | 000786 | 13.04.2020 | 13.04.2025 | İsrail Dövləti | 2 lt/ha 300 lt suya | mətbəx çuğunduru | birlapalı və ikilapalı alaq otlarına qarşı | birlapalı və ikilapalı alaq otlarının cücərtilərinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır | 1-ci çiləmə çuğundur tam çıxış aldıqdan sonra və alaq otları 2-4 yarpaq çıxdıqdan sonra çiləmə aparılır | 10(3) | 7(3) |
| 3 | Trek-P | Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Terbuthylazine+Pendimethalin | 270+64 | q/L | 000787 | 13.04.2020 | 13.04.2025 | İsrail Dövləti | 3 lt/ha 300 lt suya | qarğıdalı | birlapalı və ikilapalı alaq otlarına qarşı | qarğıdalı 3-5 yarpaq mərhələsində, alaq otları 0-4 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 4 | Arrodim Süper 116 EC | Adama Türkiye Tarim San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 116.2 | q/L | 000789 | 13.04.2020 | 13.04.2025 | İsrail Dövləti | 0,6 lt/ha 300 lt suya | pomidor | birlapalı birillik və çoxillik alaq otlarına qarşı | pomidor sütükləri əkildikdən sonra alaq otları 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 5 | Panter King | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-P-tefuryl EC | 40 | q/L | 000822 | 17.04.2020 | 17.04.2025 | Çin Xalq Respublikası | 1,5 lt/ha 300 lt suya | buğda | birillik iki lapalı alaq otlarına qarşı | bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 6 | King Captain | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Akarisid | Abamectin EC | 18 | q/L | 000823 | 17.04.2020 | 17.04.2025 | Çin Xalq Respublikası | 6 lt/ha 1000 lt suya | xiyar (istixana şəraitində) | tor gənəsi | bitki çiçəkləməsindən sonra hər yarpaqda orta hesabla 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə tətbiq olunur | 0(1) | 7(3) |
| 7 | King Special | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Funqisid | Metalaxyl-M + Fludioxonil FS | 10+25 | q/L | 000824 | 17.04.2020 | 17.04.2025 | Çin Xalq Respublikası | 4,5 lt/1 ton toxuma | buğda | bərk sürmə xəstəliyi | səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması | 0(1) | 7(3) |
| 8 | King Maestro | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid SC | 350 | q/L | 000825 | 17.04.2020 | 17.04.2025 | Çin Xalq Respublikası | 1,2 lt/ha 350-400 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | istixana ağqanadlısı | bitki çiçəkləməsindən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə tətbiq olunur | 0(1) | 7(3) |
| 9 | MZ Super 72 | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl + Mancozeb WP | 8+64 | % | 000826 | 17.04.2020 | 17.04.2025 | Çin Xalq Respublikası | 2,2 kq/ha 350-400 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | fitoftora | 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmə meyvə formalaşmasından sonra, xəstəliyin intensiv inkişaf mərhələsində tətbiq olunur | 12(2) | 7(3) |
| 10 | King Grestar | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone + MCPA SL | 250+125 | q/L | 000827 | 17.04.2020 | 17.04.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,8 lt/300 lt suya | buğda (damışa şəraitində) | birillik iki lapalı alaq otlarına qarşı | bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 11 | Fitoplazmin VRK | OOO Aqro Eko | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Makroilidnıy tiozinovıy kompleks +Trietilenqlikol + Propinol B-400 | 20+35+5 | % | 000828 | 17.04.2020 | 17.04.2025 | Rusiya Federasiyası | 12 L/ha | xiyar (istixana şəraitində) | kök çürüməsi xəstəliyi | toxum cücərtiləri müşahidə edildikdən sonra təbiq edilir | -(1) | 3(7) |
| 12 | Farmayod QR | OOO Aqro Eko | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Kristal yod + Solyubilizator + Trietilenqlikol + Penoqazitel | 100+624+412 +5 | q/L | 000829 | 17.04.2020 | 17.04.2025 | Rusiya Federasiyası | 100 ml 100 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | boz çürümə xəstəliyi | 1-ci çiləmə xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında təbiq edilir | 15(2) | 3(7) |
| 13 | Zellek Super EC | Dow Agrosciences | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Herbisid | Haloxyfop-R-methyl | 104 | q/L | 000830 | 17.04.2020 | 17.04.2025 | | 0,06 0,06-0,24 | pomidor meyvə bağları | birillik və çoxillik taxıl fasiləsi alaqları | alaq otlarının faal inkişaf mərhələsində çiləmə aparılır | -(1) | 3(1) |
| 14 | Festan | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil + Fludioxonil | 37,5+25 | % | 000832 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 70 qr/100 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | boz çürümə | 1-ci çiləmə törədicinin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmə xəstəliyin kütləvi inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır | 20(2) | 7(3) |
| 15 | Flomice | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Metaflumizone | 240 | q/L | 000833 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 1,1 L/ha 350-400 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | pomidor güvəsi | vegetasiya müddətində zərərvericinin ciddi ziyan vurduğu zaman çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 16 | Eton | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etofenprox | 50 | q/L | 000834 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/ha 350-400 lt suya | pomidor (istixana şəraitində) | tor gənəsi | çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 17 | Trelon 65 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 000836 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 1,8 L/ha 300-400 lt suya | pomidor (istixana şəraitində) | pambıq sovkası | çiçəkləmədən sonra meyvə əmələ gəlmə fazasında zərərvericinin ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla hər nəsilə qarşı çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 18 | Dorex 25 WP | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Triflumuron | 25 | % | 000837 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 32 qr/100 lt suya | pomidor (istixana şəraitində) | istixana ağqanadlısı | çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 19 | Puerto Sc 100 | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat | 100 | q/L | 000838 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 55 ml/100 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | istixana ağqanadlısı | çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır | 1(1) | 7(3) |
| 20 | Alphagold 100 EC | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | q/L | 000839 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Hindistan Respublikası | 0,6 L/ha 300-400 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | pambıq sovkası | çiçəkləmədən sonra meyvə əmələ gəlmə fazasında zərərvericinin ziyanlı həddi nəzərə alınmaqla hər nəsilə qarşı çiləmə aparılır | -(1) | 7(3) |
| 21 | Avatar 25 WP | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 25 | % | 000840 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Hindistan Respublikası | 0,35 kq/ha 350-400 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | pomidor güvəsi | çiçəkləmədən sonra 100 yarpaqda orta hesabla 1-2 ədəd zərərvericinin sülfəsi müşahidə edildikdə çiləmə aparılır | -(1) | 7(3) |
| 22 | Premocarb 150 SC | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | q/L | 000841 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Hindistan Respublikası | 0,45 L/ha 400 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | pambıq sovkası | zərərvericinin miqdarı iqtisadi-ziyanlı hədd səviyyəsində olduqda meyvələrin ilk formalaşması dövründə çiləmə aparılır | -(1) | 7(3) |
| 23 | Astamprid 20 SP | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 000842 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Hindistan Respublikası | 0,35 L/ha 350-400 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | istixana ağqanadlısı | çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır | -(1) | 7(3) |
| 24 | Astacor Gold 35 WG | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 35 | % | 000843 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Hindistan Respublikası | 12 qr/100 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | pomidor güvəsi | çiçəkləmədən sonra 100 yarpaqda orta hesabla 1-2 ədəd zərərvericinin sülfəsi müşahidə edildikdə çiləmə aparılır | -(1) | 7(3) |
| 25 | Phaeton 100 | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 100 | q/L | 000844 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha 300 lt suya | buğda | birillik ikilapalı alaqlar | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübariz aparılması daha səmərəlidir | -(1) | 7(3) |
| 26 | Hektazone Süper | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone + MCPA | 250+125 | q/L | 000845 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 2,2 L/ha 300 L suya | çəltik | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübariz aparmaq səmərəlidir | -(1) | 7(3) |
| 27 | Fedora | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cyhalofop-butyl | 200 | q/L | 000846 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 0,80 L/ha 300 L suya | çəltik | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübariz aparmaq səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 28 | Hektazone Extra | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone+ MCPA | 400+60 | q/L | 000847 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 2,2 L/ha 300 L suya | çəltik | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübariz aparmaq səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 29 | Hektaş Bakir | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalik bakıra əşdeğer bakır oksiklorid | 50 | % | 000849 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 350 qr/100 L suya | pomidor (istixana şəraitində) | fitoftora | vegetasiya dövründə 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə isə meyvələrin formalaşmasından sonra təbiq edilir | 15(2) | 7(3) |
| 30 | Efdal Etux | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | q/L | 000850 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 40 ml/100 L suya | xiyar (istixana şəraitində) | tor gənəsi | çiçəkləmədən sonra hər yarpaqda orta hesabla 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə aparılır | -(1) | 7(3) |
| 31 | Efdal Sulfur 80 WG | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fugisid-Akarisid | Kükürd | 80 | % | 000851 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Hindistan Respublikası | 400 qr/100 L suya | xiyar (istixana şəraitində) | unlu şeh xəstəliyi | 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf fazasında, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır | 15(2) | 7(3) |
| 32 | Efdal Baksül | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik Bakıra Eşdeğer Bordo Bulamacı | 20 | % | 000852 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 4,2 kq/ha 350-400 L suya | xiyar (istixana şəraitində) | yalançı unlu şeh xəstəliyi | 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf fazasında, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır | 15(2) | 7(3) |
| 33 | Efdal Maco WG | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 75 | % | 000853 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 220 qr/100 L suya | xiyar (istixana şəraitində) | yalançı unlu şeh xəstəliyi | 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf fazasında, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır | 15(2) | 7(3) |
| 34 | Efdal Kip 50 WG | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 000854 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Türkiyə Respublikası | 45 qr/100 L suya | xiyar (istixana şəraitində) | yalançı unlu şeh xəstəliyi | 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf fazasında, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır | 20(2) | 7(3) |
| 35 | Efdal Etanop | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-Methyl | 70 | % | 000855 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Hindistan Respublikası | 45 qr/100 L suya | xiyar (istixana şəraitində) | unlu şeh xəstəliyi | 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl xəstəliyin ilk inkişaf fazasında, 2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişaf fazasında meyvələrin formalaşmasından sonra aparılır | 20(2) | 7(3) |
| 36 | Microthiol Special Disperss | UPL Ziraat ve Kimya San. ve Tic. LTD Sti | Türkiye Respublikası | Pestisid | Funqisid | Kükürd | 80 | % | 000857 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | Fransa Respublikası | 3.0-5.0 kq/ha | üzüm | oidium | vegetasiya dövründə çiləmə | 10(1-5) | 4(1) |
| 37 | Ziram 76 DF | UPL Ziraat ve Kimya San. ve Tic. LTD Sti | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ziram | 76 | % | 000858 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | | 0,6 kq/ha | xiyar (istixana) | antraknoz | vegetasiya dövründə çiləmə | 20(2) | 3(1) |
| 38 | Grandris SC | UPL Ziraat ve Kimya San. ve Tic. LTD Sti | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | q/L | 000859 | 21.04.2020 | 21.04.2025 | | 0.4-0.6 kq/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya dövründə çiləmə | 5(2) | 5(3) |
| 39 | Sencor SC 600 | Bayer AG | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 600 | q/L | 000872 | 22.05.2020 | 22.05.2025 | | 0,75 | kartof pomidor | birillik birlapalı və ikilapalı alaqlar | Mədəni bitkinin çıxışları əmələ gələnə qədər Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə | -(1) | 7(3) |
| 40 | Atlantis WG 12,6 | Bayer AG | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | (Iodosulfuron-methyl-sodium + Mesosulfuron-methyl+ Mefenpyr-diethyl) | 6+30+90 | q/kq | 000874 | 22.05.2020 | 22.05.2025 | | 0,3 | buğda | birillik ikilapalı alaqlar | mədəni bitkinin kollanma borusuçıxma və alaqların ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə aparılır | -(1) | 7(3) |
| 41 | Movento SC 100 | Bayer AG | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat | 100 | q/L | 000875 | 22.05.2020 | 22.05.2025 | | 0,1 | meyvə ağacları | ballıca, yastıcalar | vegetasiya dövründə çiləmə | 14(2) | 7(3) |
| 42 | Pyrus 400 SC | Arysta LifeScience Benelux SPRL | Belçika Krallığı | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 400 | q/L | 000876 | 01.06.2020 | 01.06.2025 | Belçika Krallığı | 0,8 L/ha 2,0-2,5 L/ha 3,0 L/ha | kələm üzüm pomidor | boz çürümə | bitkilərdə vegetasiya müddətində zərərliorqanizmin iqtisadi ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla preparatın istifadə edilməsi məqsədə uyğundur | 20(1) 20(1) 18(2) | 7(3) |
| 43 | Abagard | Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 180 | q/L | 000877 | 01.06.2020 | 01.06.2025 | Türkiyə Respublikası | 0,05 L/ha | pomidor | tor gənəsi | pomidor bitkisinin 5-6 yarpaq fazasında çiçəkləmədən əvvəl zərərli orqanizmin iqtisadi ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla preparatın istifadə edilməsi məqsədə uyğundur | 18(2) | 7(3) |
| 44 | Entifun | Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dithianon+Trifloxystrobin | 400+100 | q/L | 000878 | 01.06.2020 | 01.06.2025 | Türkiyə Respublikası | 0,75 L/ha | buğda | helmintosporioz | buğda əkinlərində zərərli orqanizim müşahidə edildiyi zaman preparatın istifadə edilməsi məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 45 | Guadex | Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil+Cymoxanil | 500 +75 | q/L | 000879 | 01.06.2020 | 01.06.2025 | Türkiyə Respublikası | 2,0 L/ha | pomidor | fitoftora | vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildiyi zaman preparatın istifadə edilməsi məqsədə uyğundur | 18(2) | 7(3) |
| 46 | Clam | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Clothianidin+Lambda-Cyhalothrin | 200+100 | q/L | 000906 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 110 ml/1000 m^2 | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra yarpaqlarda orta hesabla 2-4 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparatın istifadəsi məqsədə uyğundur | 20(1) | 7(3) |
| 47 | Alpha-CYP | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphan-Cypermethrin | 100 | q/L | 000907 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 220 ml/1000 lt suya | kələm | kələm ağkəpənəyi | vegetasiya müddətində bitkilərin baş bağlaması fazasında zərərvericinin iqtisadi zərər vermə həddi nəzərə alınmaqla preparatın istifadəsi məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 48 | Arox | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | q/L | 000908 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 160 qr/1000 lt suya | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilkin inkişaf mərhələsində xəstəliyə qarşı 1-ci çiləmə çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmənin çiçəkləmədən sonra aparılması məqsədə uyğundur | 18(2) | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Denilo | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 750 | q/kq | 000909 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 2,1 kq/ha | üzüm | boz çürümə | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilkin inkişaf mərhələsində xəstəliyə qarşı 1-ci çiləmə, 2-ci çiləmə gilələrdə xəstəlik törədicisinin intensiv inkişafı zamanı aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 50 | B-Zone | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone | 480 | q/L | 000910 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 1,28 lt/ha | soya | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının 8-10 yarpaq, boyunun 10-12 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 18(1) | 7(3) |
| 51 | Dimaphos 40 EC | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 000911 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 1,5 lt/ha | pomidor (istixana) | manənə | vegetasiya müddətində zərərli orqanizim yarpaqda 2-4 ədəd müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 18(1) | 7(3) |
| 52 | Clopa | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 750 | q/kq | 000912 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,4 lt/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 18(1) | 7(3) |
| 53 | Acid-FF | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4 D acid+Fluroxypyr+Florasulam | 410 + 50+ 5 | q/L | 000913 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,45 lt/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 18(1) | 7(3) |
| 54 | Amiclo | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid+Amidosulfuron | 500+250 | q/kq | 000914 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 120 qr/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4 yarpaq, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 18(1) | 7(3) |
| 55 | Azox-FF | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin+Tebuconazole+Fluti afol | 90+317+93 | q/L | 000915 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,45 L/ha | soya | alternarioz | vegetasiya müddətində xəstəliyə qarşı 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləmə meyvələrin formalaşmasından sonra tətbiq olunur | 18(2) | 7(3) |
| 56 | Abamec | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 36 | q/L | 000916 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 300 mL/ha | pomidor | tor gənəsi | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 18(2) | 7(3) |
| 57 | Antidot | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Iodosulfuron-metyl-sodium+Amidosulfuron+ Mefenpyr-diyethyl (antidot) | 25+100+250 | q/L | 000917 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 1,5 L/ha | buğda | enli yarpaqlı alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur | 18(1) | 7(3) |
| 58 | 3-Met | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron -methyl | 750 | q/kq | 000918 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,03 kq/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur | 18(1) | 7(3) |
| 59 | Engine | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamaprid | 20 | % | 000919 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 15 qr/100 lt suya | pomidor | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra yarpaqlarda orta hesabla 2-4 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparatın istifadəsi məqsədə uyğundur | 18(1) | 7(3) |
| 60 | Cropcop | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Oxychloride | 50 | % | 000920 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 75 qr/100 lt suya | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilkin inkişaf mərhələsində xəstəliyə qarşı 1-ci çiləma, meyvələrin formalaşması xəstəlik törədicisinin intensiv inkişafı zamanı 2-ci çiləma aparılması məqsədə uyğundur | 18(2) | 7(3) |
| 61 | Suprim | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | q/L | 000921 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,6 L/ha | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində zərərli orqanizim iqtisadi ziyanlı haddi nəzərə alınmaqla hər nəsla qarşı bir dəfə mübarizə aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 62 | Halo 5 EC | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 5 | % | 000922 | 02.06.2020 | 02.06.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,55 L/ha | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində zərərli orqanizim iqtisadi ziyanlı haddi nəzərə alınmaqla mübarizə aparılması məqsədə uyğundur | 18(1) | 7(3) |
| 63 | Canmec | Cansa Kimya Sanayi Va Ticaret Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 000932 | 09.06.2020 | 09.06.2025 | Türkiyə Respublikası | 0,300 mL/ha | pomidor (istixana) | tor gənəsi | vegetasiya müddətində zərərli orqanizim iqtisadi ziyanlı haddi nəzərə alınmaqla hər nəsla qarşı bir dəfə mübarizə aparılması məqsədə uyğundur | 15-20(2) | 7(3) |
| 64 | Cansa Alfamethrin 100 EC | Cansa Kimya Sanayi Va Ticaret Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | q/L | 000933 | 09.06.2020 | 09.06.2025 | Türkiyə Respublikası | 0,6 L/ha | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra 100 yarpaq və kalada orta hesabla 1-2 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə mübarizə aparmaq məqsədə uyğundur | 18(2) | 7(3) |
| 65 | Cansamil 72 WP | Cansa Kimya Sanayi Va Ticaret Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb + Metalaxyl | 64+8 | % | 000934 | 09.06.2020 | 09.06.2025 | Türkiyə Respublikası | 2,6 kq 1000 lt suya | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində xəstəliyin inkişaf daracəsi nəzərə alınmaqla, qönçələnədən əvvəl mübarizə aparmaq məqsədə uyğundur | 18(2) | 7(3) |
| 66 | Cansetyl 300 SC | Cansa Kimya Sanayi Va Ticaret Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | q/L | 000935 | 09.06.2020 | 09.06.2025 | Türkiyə Respublikası | 1,3 lt 1000 lt suya | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində 1-ci çiləma törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləma xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 18(2) | 7(3) |
| 67 | Marduk 100 EC | Cansa Kimya Sanayi Va Ticaret Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | q/L | 000936 | 09.06.2020 | 09.06.2025 | Türkiyə Respublikası | 0,5 lt/ha | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində 1-ci çiləma törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləma xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 18(2) | 7(3) |
| 68 | Lasiotrap | Borgwaldt Flavor | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Feromon tələ | 4,6 - dimethyl- 7- hydroxy- 3 - OH | | | 000939 | 10.06.2020 | 10.06.2025 | Almaniya Federativ Respublikası | 50 m^2-3 ədəd | tütün | tütün böcəyi | anbarda tütün məhsulunun saxlanması zamanı tütün böcəyinin 1-ci və 2-ci nəslinin müəyyənləşməsi üçün tətbiqi səmərəlidir | 15(2) | 0(0) |
| 69 | Platin Malathion 65 EC | Platin Kimya Mühəssillik və Dış.Tic.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 000947 | 20.06.2020 | 20.06.2025 | Türkiyə Respublikası | 2 lt/ha 1000 lt suya | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində zərərli orqanizm 2%-dən çox olduğu müşahidə olunduqda preparat tətbiq edilir | 20(2) | 7(3) |
| 70 | Funguran OH 50 WP | Spiess - Urania Chemicals GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalik Mis (77 % Mis hidroksida ekvivalentdir) | 50 | % | 000948 | 16.07.2020 | 16.07.2025 | | 1,5-2,0 kq/ha 2,4-3,4 kq/ha | üzüm alma | mildiyim damğıl | vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir | 15(2) | 7(3) |
| 71 | Goal 2 E | Dow Agrosciences | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | q/L | 000953 | 16.07.2020 | 16.07.2025 | | 0,5 L/ha | soğan sarımsaq | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində madəni bitkilərin 2-4 yarpaq mərhələsində tətbiq edilir | 0(1) | 4(4) |
| 72 | Hekpak | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Dezinfektant | Active chlorine released from sodium hyoxchlorite | 0,1 | % | 000975 | 22.07.2020 | 22.07.2025 | Türkiyə Respublikası | 1 m^2/200 ml | pomidor (istixana) | virus mənşəli xəstəliklər | istixana şəraitində xəstəliklərə qarşı profilaktiki mübarizə tədbiri olaraq tətbiq edilir | 0(1) | 1(1) |
| 73 | Alfamilin 17,6 % SC | Arysta LifeScience Benelux SPRL | Belçika Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin+Diflubenzuron | 80+96 | q/L | 000987 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Belçika Krallığı | 0,45 lt/ha | üzüm | üzüm salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla preparat tətbiq edilir | 19(2) | 7(3) |
| 74 | Gazelle | Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin+Oxadiazon | 450+75 | q/L | 000988 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Türkiyə Respublikası | 3,75 lt/ha | pambıq | pambığın alaq otları | çiyid səpilməndən dərhal sonra alaq otlarına qarşı preparat tətbiq edilir | 18(1) | 7(3) |
| 75 | Sunforce 48 SL | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate Isopropylamin Duzu | 480 | q/L | 000995 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Türkiyə Respublikası | 3,0 lt/ha | alma | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının aktiv böyüməmə dövründə torpaqda tətbiqi yolu ilə istifadə edilir | 25(2) | 7(3) |
| 76 | Zamir 400 EW | Adama Makhteshim Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Prochloraz+Tebuconazole | 267+133 | q/L | 000996 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | İsrail Dövləti | 1,25-1,50 lt/ha | buğda | unlu şeh septorioz | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilkin əlamətləri müşahidə edildikdə tətbiq edilir | 20(2) | 7(3) |
| 77 | Swarm 2 DS | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD.STİ. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 2 | % | 000997 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kq/1 ton toxma | buğda | bark sürmə toz sürmə | sapından əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla islanması məqsədə uyğundur | 10(1) | 7(3) |
| 78 | Kuprikol | OOO RostAqroImpeks | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | mis xloroksid | 88 | % | 000998 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Rusiya Federasiyası | 5,2 lt/ha | xiyar | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmə qarşı 1-ci çiləma çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləmanın çiçəklənədən sonra aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 79 | Kupravit BC | OOO RostAqroImpeks | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | mis xloroksid | 400 | q/L | 000999 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Rusiya Federasiyası | 5,5 lt/1000 lt suya | pomidor | fitoftora | vegetasiya müddətində bitkinin 5-7 yarpaq və 10-12 yarpaq fazasında xəstəliyin inkişaf daracəsi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 80 | Yaşıl sabun | OOO RostAqroImpeks | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid/İnsektisid | Mis sulfat | 0,02 | q/kq | 001000 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Rusiya Federasiyası | 12 lt/ha | xiyar | mənənə | vegetasiya müddətində hər yarpaqda orta hesabla 6-8 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(1) | 7(3) |
| 81 | Kuprostat | OOO RostAqroImpeks | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | mis sulfat (CuSO4, 5H20) | 98 | % | 001001 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Rusiya Federasiyası | 10,5 lt/1000 lt suya | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində 1-ci çiləma törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləma xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 82 | Serakol | OOO RostAqroImpeks | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Kükürd | 99.4 | % | 001002 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Rusiya Federasiyası | 420 qr/ha | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində 1-ci çiləma çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmani xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 83 | Bordo Mahlulu | OOO RostAqroImpeks | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | üç əsaslı mis sulfat | 172 | q/L | 001004 | 28.07.2020 | 28.07.2025 | Rusiya Federasiyası | 10,2 kq/1000 lt suya | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində 1-ci çiləma törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində çiçəklənədən əvvəl, 2-ci çiləma xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 84 | Megasil 200 LS | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl | 200 | q/L | 001080 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | | 6,0 | günabaxan | unlu şeh | sapından əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla islanması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 85 | Matador 250 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 001081 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | | 0,3 | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir | 25(3) | 7(3) |
| 86 | Morbidol 240 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | q/L | 001082 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | | 0,75 | soğan | birillik alaq otları | mədəni bitkilərin çıxışından əvvəl preparat tətbiq edilir | 0(3) | 7(3) |
| 87 | Bancol 500 SC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 500 | q/L | 001084 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | | 0,25 | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir | 15(2) | 7(3) |
| 88 | Suprodinil Plus | Agri Ventures | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 001085 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 0,5 kq/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində 1-ci çiləma çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləmaninin xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 89 | Cordogen 20 SC | Agri Ventures | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | q/L | 001086 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 12 qr/100 L suya | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra kalaların formalaşması mərhələsində 100 yarpaqda 1-2 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur | 15(1) | 7(3) |
| 90 | Benaton 200 EC | Agri Ventures | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Pestisid | İnsektisid/Nematisid | Etoprophos | 200 | q/L | 001087 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 52,0 L/ha | pomidor (istixana) | fir nematodu | istixana şəraitində şitil əkilmədən əvvəl torpağa preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 91 | Karmella 70 WP | Agri Ventures | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 001088 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 0,75 kq/ha | pomidor | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 92 | Vanzer 50 WP | Agri Ventures | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Pestisid | İnsektisid | Primicarb | 50 | % | 001089 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 32 qr/100 lt suya | pomidor | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Kalmis | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Propyzamide | 50 | % | 001090 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Türkiya Respublikası | 4,5 kq/ha | pomidor | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 94 | Tifis WG | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesosulfuron-methyl+odosulfuron-methyl-sodium+Mefenpyr-diethyl (Safener) | 3 + 0,6 + 9 | % | 001091 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Türkiya Respublikası | 0,5 kq/ha | pomidor | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 95 | Spidor 25 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxadiazon | 250 | q/L | 001093 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Türkiya Respublikası | 0,5 lt/ha | pomidor | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 96 | Leda S 915 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | S-metolachlor + Benoxacor (Safener) | 915+45 | q/L | 001094 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Türkiya Respublikası | 1,6 lt/ha | pomidor | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 97 | Vulkan 48 SL | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 480 | q/L | 001095 | 31.08.2020 | 31.08.2025 | Hindistan Respublikası | 3,0 kq/ha | pomidor | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 98 | Truman 5 SG | Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 5 | % | 001115 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 0,4 kq/100 lt suya | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində zərərli orqanizm müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 99 | Cosavet | Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kükürd | 80 | % | 001117 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Hindistan Respublikası | 0,6 kq/100 lt suya | xiyar | unlu şeh | vegetasiya müddətində bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazasında çiləmə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 100 | Intracure | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | q/L | 001119 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 0,55 lt/ha | pomidor | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 101 | Alphasave | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 200 | q/L | 001120 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 3,80 lt/ha | pambıq | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 102 | Qinitium | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 001121 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 2,2 lt/ha | qarğıdalı | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 103 | Blove | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 50 | q/L | 001122 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 0,55 lt/ha | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(1) | 7(3) |
| 104 | Metagri | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4 D 2- Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam | 452,42 + 6,25 | q/L | 001123 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 0,6 lt/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(1) | 7(3) |
| 105 | Sprint | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 500 | q/L | 001124 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 2,2 lt/ha | alma | damğıl | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 106 | Zipper | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 001125 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 1,2 lt/ha | pomidor | manana | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(1) | 7(3) |
| 107 | Sparta 25 WP | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 001126 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 55 qr/100 lt suya | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 108 | Genozeb 80 WP | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 001127 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 220 qr/100 lt suya | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 109 | Vixen | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid+Pyraclostrobin | 25,2+12,8 | % | 001129 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 35 qr/100 lt suya | alma | damğıl | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 110 | Quantas | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 64+8 | % | 001130 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 260 qr/1000 lt suya | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 111 | Sorado | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etaxazole | 110 | q/L | 001131 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 37 ml/1000 lt suya | xiyar (istixana) | tor gənəsi | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(1) | 7(3) |
| 112 | Epostar 480 SL | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate IPA | 480 q | q/L | 001132 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 3,5 L/ha | üzüm | alaq otları | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 50(2) | 7(3) |
| 113 | Kuramite | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Akarisid | Pyridaben | 20.00 | % | 001133 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 110 qr/100 lt suya | pomidor (istixana) | hörümçək gənəsi | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 114 | Filap 20 EC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Nematosid | Etoprophos | 200 | q/L | 001134 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 52,0 lt/ha | xiyar | fr nematodu | sahəyə şitil köçürülməsindən əvvəl mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 5(1) | 7(3) |
| 115 | Reikon | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin+Cyproconazole | 200+80 | q/L | 001135 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 0,6 lt/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 116 | Odeon 50 WP | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 001136 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 270 qr/100 lt suya | üzüm | mildium | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənədən əvvəl törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 117 | Pirisect | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Hymexazol | 360 | q/L | 001137 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 160 qr/100 lt suya | pomidor | kök çürüməsi | vegetasiya müddətində cücərtilər müşahidə edildikdən sonra çiləmanın aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 118 | Knoxboro | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | q/L | 001138 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 0,320 L/ha | şəkər çuğunduru | serkosporioz | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 119 | Pavlina 100 EC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | q/L | 001139 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 55 ml/100 L suya | pomidor (istixana) | unlüşeh | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 120 | Verdun | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosethyl -Al | 80 | % | 001140 | 23.09.2020 | 23.09.2025 | Türkiya Respublikası | 160 qr/100 lt suya | soğan | yalançı unlüşeh | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə törədicinin ilkin inkişaf mərhələsində, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 121 | Otason 40 OD | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | q/L | 001141 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 1-1,25 | qarğıdalı | birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları | vegetasiya müddətində mədani bitkilərin 3-6 yarpaq fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur | -(1) | 7(3) |
| 122 | Metto Ultra | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl + Epoxiconazole | 310+187 | q/L | 001142 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 0,6 | buğda | qonur pas unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır | 30(1) | 7(3) |
| 123 | Cruiser 90 SP | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 90 | q/L | 001143 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 0,9 | pambıq | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır | 20(2) | 7(3) |
| 124 | Cyaca Plus | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 001144 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 2,5 | üzüm | üzüm salxım bükanı | vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır | 20(2) | 7(3) |
| 125 | Declare 25 EC | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 001145 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 2,5 | üzüm | üzüm salxım bükanı | vegetasiya müddətində çiləmənin aparılır | 20(2) | 7(3) |
| 126 | Platin malathion | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 190 | q/L | 001146 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 3,5 | armud | armud babəcidi | vegetasiya müddətində çiləmə aparılır | 20(2) | 10(4) |
| 127 | Pintro 050 EC | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lufenuron | 50 | q/L | 001147 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 0,35 | qarğıdalı | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində çiləmə aparılır | 20(2) | 10(4) |
| 128 | Planstar | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron -Methyl | 75 | % | 001148 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 0,015 | buğda | birillik ikiləpəli alaqlar | bitkinin cücərmə-kollanma mərhələsində çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 129 | Postamin 500 SL | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4 - D asite barabar dimethyl amin duzu | 500 | q/L | 001149 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 2,0 | buğda | birillik və çoxillik enliyarpaq alaqlar | bitkinin boruyaçıxma mərhələsində çiləmə aparılır | 0(1) | 7(4) |
| 130 | Stanby 48 SL | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate Asite barabar Glyphosate isopropylamin duzu | 480 | q/L | 001150 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 10 | üzüm | birillik və çoxillik ikiləpəli və taxıl fəsiləsi alaqlar | vegetasiya müddətində çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 131 | Tuyph 150 EC | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | q/L | 001151 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 0,12 | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində çiləmə aparılır | 20(2) | 10(4) |
| 132 | Coacho 600 FS | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 600 | q/L | 001153 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 0,65 ml 100 kq toxum | qarğıdalı | məftil qurdları | sapoqabağı toxumun darmanlanması | 0(1) | 7(3) |
| 133 | Planfarm DF | Platin Kimya Mümessillik ve Dış.Tic.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metiram kompleks | 80 | % | 001154 | 24.09.2020 | 24.09.2025 | | 0,75 | pomidor | fitoftora | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 20(2) | 10(4) |
| 134 | Korcamba 420 SL | Koruma Kior Alkali San. Ve Tic. A.S. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | MCPA+Dicamba | 340+80 | q/L | 001156 | 29.09.2020 | 29.09.2025 | | 1,25 | bütda | birillik ikiləpəli alaqlar | kollanma mərhələsində çiləmə aparılır | 0(1) | 7(3) |
| 135 | Kurmuzine 70 WP | Koruma Kior Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 001157 | 29.09.2020 | 29.09.2025 | | 0,75 | kartof pomidor | birillik taxıl fəsilesi və ikiləpəli alaqlar | əkindən əvvəl torpağa çiləməsi nəzərdə tutulub | 0(1) | 7(3) |
| 136 | Allegro | Koruma Kior Alkali San. Ve Tic. A.S. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosethyl -Al | 80 | % | 001159 | 29.09.2020 | 29.09.2025 | | 2,2 | üzüm | mildium | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 20(2) | 7(3) |
| 137 | Kontrosil 90 SP | Koruma Kior Alkali San. Ve Tic. A.S. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 90 | % | 001160 | 29.09.2020 | 29.09.2025 | | 0,9 | pambıq | pambıq sovkası | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 20(2) | 10(3) |
| 138 | Almerinei | Koruma Kior Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Boy Tanzimləyici | Gibberellin A4/A7 + 6-Benzyladenin | 18,5 + 18,8 | q/L | 001161 | 29.09.2020 | 29.09.2025 | | 0,9 | alma armud | - | çiçəklənmənin sonunda çiləmə aparılır (tökülən inkişafını stimullaşdırır, meyvənin yetişməsini sürətləndirir, məhsuldarlığı artırır) | 0(1) | 1(1) |
| 139 | Qranat,VDQ (Granat, WDG) | Şelkovo Agroxim SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron methyl | 750 | q/kq | 001170 | 12.10.2020 | 12.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,025 kq/ha | buğda arpa | ikiləpəli alaqlara qarşı | vegetasiya müddətində preparat bitkinin kollanma fazasında tətbiq edilir | 0(1) | 7(3) |
| 140 | Qeyzer, KKR (Geizer, CSC) | Şelkovo Agroxim SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Bentazone+Quizalofob-P-ethyl | 300+45 | q/L | 001171 | 12.10.2020 | 12.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 2,5 lt/ha | noxud | birillik ikiləpəli və taxıl fəsilesi alaqları | vegetasiya müddətində preparat bitkinin 5-6 yarpaq fazasında tətbiq edilir | 0(1) | 7(3) |
| 141 | Sprut Ekstra, VR (Sprut Extra, SL) | Şelkovo Agroxim SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate acid (Kalium duzu saklında) | 540 | q/L | 001172 | 12.10.2020 | 12.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 2,5-4,0 lt/ha | əkin üçün nəzərdə tutulmuş sahələrdə | birillik, çoxillik dənli və ikiləpəli alaqlar | əkindən əvvəl yazda alaqların aktiv inkişafı fazasında preparat tətbiq edilir | 0(1) | 7(3) |
| 142 | Ovsugen Super, Ke (Ovsugen Super, EC) | Şelkovo Agroxim SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-P-ethyl + Clouintocet -mexyl (antidote) | 140+47 | q/L | 001173 | 12.10.2020 | 12.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,6 lt/ha | arpa | birləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində preparat bitkinin kollanma fazasında tətbiq edilir | 0(1) | 7(3) |
| 143 | Skarlet, ME (Scarlet, ME) | Şelkovo Agroxim SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Imazalil+Tebuconazole | 100+60 | q/L | 001174 | 12.10.2020 | 12.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,4 lt 1 ton toxum üçün | buğda qarğıdalı soya | sürmə, kök çürüməsi | sapından əvvəl toxum materialının darmanlanması | 0(1) | 7(3) |
| 144 | Dennzit ME (Denozit, ME) | Şelkovo Agroxim SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil+Imazalil+Metalaxyl | 40+40+30 | q/l | 001175 | 12.10.2020 | 12.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 1-2 lt 1 ton toxum üçün | qarğıdalı | askoxitoz fuzarioz | sapından əvvəl toxum materialının darmanlanması | 0(1) | 7(3) |
| 145 | Cypermethrin 25% EC | Act Agro Chem PVT.Ltd. | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 001177 | 15.10.2020 | 15.10.2025 | Hindistan Respublikası | 200 qr/1000 lt suya | armud | armud ballıcası | vegetasiya müddətində bitkilərin çiçək laçaklərı tökülüdükdən sonra preparat zərərli orqanizmə qarşı tətbiq edilir | 10(2) | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Tanoşans, SPD | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Famoxadone+Cymoxanil | 250+250 | q/kq | 001200 | 19.10.2020 | 19.10.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,5 kq/ha<br>0,6 kq/ha<br>0,4-0,6 kq/ha | üzüm<br>kartof pomidor<br>günəbaxan | mildiu<br>fitoftora alternarioz<br>ağ çürümə, fomopsis | vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 12(3) | 7(3) |
| 147 | Betaşans Trio, EK | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Ethofumesate+Phenmedipham+Desmedipham | 112+91+71 | q/L | 001205 | 19.10.2020 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 3,0 lt/ha | soğan<br>şəkər çuğunduru | birillik ikiləpəli və bazi birillik taxıl fəsilasi alafları | vegetasiya müddətində, bitkinin 4. alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 148 | Karişans, SPD | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Triflusulfuron-methyl | 500 | q/kq | 001210 | 19.10.2020 | 19.10.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,04 lt/ha | şəkər çuğunduru | birillik ikiləpəli alaq otları | alaq otlarının 2 sel yarpaq mərhələsində, çiləmə zamanı 200 mL/ha Şans-90J SAM ila qarışıqda mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 149 | Şantus, SHD | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Rimsulfuron | 250 | q/kq | 001213 | 19.10.2020 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,05 kq/ha<br>0,04 kq/ha<br>40-50 q/ha | kartof<br>qarğıdalı<br>pomidor | birillik, çoxillik taxıl fəsilasi və bazi ikiləpəli alaq otları | bitkilərin 2-6 yarpaq və alaqların böyümasinin erkən mərhələlərində akinlarda mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 150 | Alto Super 330 EC | Syngenta Agro AG | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyproconazole+Propiconazole | 8+25 | % | 001231 | 21.10.2020 | 21.10.2025 | | 0,5-0,75 | şəkər çuğunduru | serkosporoz<br>unlu şeh<br>fomoz<br>alternarioz | vegetasiya dövründə tətbiq edilir | 30(2) | 7(3) |
| 151 | Efdal Cantanim 50, WP | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 001240 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | | 0,3 | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya dövründə tətbiq edilir | 3(3) | 3(3) |
| 152 | Efdal Altrid 20 SP | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 001241 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | | 0,3 | pomidor (istixana) | mənanalar | vegetasiya dövründə tətbiq edilir | 3(7) | 3(3) |
| 153 | Efdal Malation 60 EM | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 001242 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | | 250 mL/ha | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə tətbiq edilir | 3(7) | 3(3) |
| 154 | Efdal İsofosat 48 SL | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate isopropylamin Duzu (IPA salt) | 480 | q/L | 001243 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | | 3,2 | üzüm | birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar | alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında tətbiq edilir (madani bitkini qorumaq şərtilə) | 3(1) | 3(3) |
| 155 | Alfa Life EC | AgroLife Science Corporation | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | q/L | 001248 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Hindistan Respublikası | 0,4 L/ha | alma | mənənə | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 156 | Agor EC | AgroLife Science Corporation | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 001249 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Hindistan Respublikası | 1,8 L/ha | alma | qırmızı meyvə gənəsi<br>kolifomiya qanaqlı yastıcası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 157 | Gale WP | AgroLife Science Corporation | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Hydroxide | 770 | q/kq | 001250 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Hindistan Respublikası | 1,85 kq/ha | alma | damğıl | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə bitkilərin çiçəklənməsindən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparmaq məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 158 | Hero 70 WG | AgroLife Science Corporation | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 700 | q/kq | 001251 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Hindistan Respublikası | 0,55 kq/ha | pomidor (istixana) | mənənə | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 159 | Klip SG | AgroLife Science Corporation | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 50 | q/kq | 001252 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Hindistan Respublikası | 0,6 kq/ha | alma | alma meyvəyeyəni | vegetasiya müddətində 1-ci nəsla qarşı çiçəklənədən sonra, 2-ci nəsla qarşı mübarizani isa meyvələrin formalaşmasından sonra aparmaq məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 160 | Relax WP | AgroLife Science Corporation | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb + Metalaxyl | 640+80 | q/kq | 001253 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Hindistan Respublikası | 2,7 kq/ha | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni bitkilərin çiçəklənməsindən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparmaq məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 161 | Super Star SC | AgroLife Science Corporation | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole + Azoxystrobin | 200+120 | q/L | 001254 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Hindistan Respublikası | 1,0 L/ha | günəbaxan | alternarioz | vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni bitkilərin çiçəklənməsindən əvvəl, 2-ci çiləməni meyvələrin formalaşması dövründə aparmaq məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 162 | Win WDG | AgroLife Science Corporation | Hindistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron Methyl | 750 | q/kq | 001255 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Hindistan Respublikası | 0,015 kq/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində bitinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur | 25(1) | 7(3) |
| 163 | Lock-5 EC | AgroLife Science Corporation | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | q/L | 001257 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Hindistan Respublikası | 0,15 L/ha | kartof | kolarado böcəyi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 164 | Hekpak Ultra | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Dezinfektant | Active chlorine released from sodium hypochlorite | 5 | % | 001260 | 26.10.2020 | 26.10.2025 | Türkiya Respublikası | 1 m^2/200 ml | istixana (dezinfeksiya) | virus və digər mənşəli xəstəliklər | istixanada xəstəliklərə qarşı dezinfeksiya işlərində profilaktiki mübarizə olaraq tətbiq edilir | 20(1) | 1(1) |
| 165 | Tuta absoluta pheromone lure | Biobest group N.V | Belçika Krallığı | Pestisid | Feromon lələ | (E,Z) - 3,8 - tetradecadienyl, 95% (E,Z,Z) - 3,8,11-tetradecadienylacetate | 5 | % | 001262 | 02.11.2020 | 02.11.2025 | Birləşmiş Krallıq | 1-2 lələ/ha | pomidor | pomidor güvəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübariza aparılması üçün tətbiq edilir | 20(4) | 0(0) |
| 166 | PS Perfect Pro | Kwizda Agro Hungary KFT | Macarıstan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Trichoderma asperellum fungus strain T34 ( EP1400B1, CECT No.20417) + starter fertilizer 9N+40 P2O5+12n ( 96.5 w/w% ) 5% Perlit, pH 5%\ | 1,0x107 + 3 | CFU/q + w/w% | 001264 | 16.11.2020 | 16.11.2025 | Macarıstan Respublikası | 22 kq/ha | pomidor | unlu şeh | vegetasiya müddətində preparat toxum sapinindan və ya şitilların əkilmasindan əvvəl torpağa tətbiq edilir | 20(2) | 0(0) |
| 167 | Trifender Pro | Kwizda Agro Hungary KFT | Macarıstan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Trichoderma asperellum fungus strain T34 (EP1400 B1, CECT No.20417)+Perlit, pH-7,3) | 1x108 + 88 | CFU/q + m/m% | 001265 | 16.11.2020 | 16.11.2025 | Macarıstan Respublikası | 2,2 kq/ha | pomidor | fitoftora | vegetasiya müddətində preparat toxum sapinindan və ya şitilların əkilmasindan əvvəl torpağa tətbiq edilir | 20(2) | 0(0) |
| 168 | Xilon GR | Kwizda Agro Hungary KFT | Macarıstan Respublikası | Pestisid | Fungisid | 1x107 CFU/q Trichoderma asperellum fungus strain T34 (EP1400 B1,CECT No.20417) | | | 001266 | 16.11.2020 | 16.11.2025 | Macarıstan Respublikası | 11,0 kq/ha | pomidor | kök çürümə | vegetasiya müddətində preparat toxum sapinindan və ya şitilların əkilmasindan əvvəl torpağa tətbiq edilir | 20(2) | 0(0) |
| 169 | Effect 70% WP | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate methyl | 700 | q/kq | 001283 | 10.12.2020 | 10.12.2025 | ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD | 0,1<br>0,1 | alma<br>üzüm | damğıl<br>oidium | vegetasiya marhaləsində çiləmə | 20(3) | 10(3) |
| 170 | Korus WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 750 | q/kq | 001284 | 10.12.2020 | 10.12.2025 | ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD | 0,2 | alma | damğıl | vegetasiya marhaləsində çiləmə | 28(3) | 10(3) |
| 171 | Perfecto 17,5% SC | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid+Lambda cyhalothrin | 125+50 | q/L | 001285 | 10.12.2020 | 10.12.2025 | ÇXR-DVA (Shanghai) Chemicals Co., LTD Hindistan Respublikası Dva İndia Chemicals PVT.LTD | 0,3-0,4<br>0,3-0,4<br>0,3-0,4 | alma<br>pambıq<br>üzüm | gənələr, yarpaqbükənlər, meyvəyeyənlər<br>gənələr, mənənələr,pambıq sovkası<br>gənələr, yarpaqbükənlər | vegetasiya marhaləsində çiləmə | 20(3) | 10(3) |
| 172 | Indox 30 WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb, WG | 300 | q/kq | 001290 | 11.12.2020 | 11.12.2025 | Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası | 0,4 kq/ha 400 lt suya (tək mərhul) | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya marhaləsində bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşma fazasında çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur | 30(2) | 7(3) |
| 173 | Karathane Gold 350 EC | Dow Agrosciences | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Meptyldinocap | 350 | q/L | 001291 | 18.12.2020 | 18.12.2025 | | 0,6 | üzüm | oidium | vegetasiya müddətində çiləmə | 20(2) | 7(3) |
| 174 | Grenade 50 EC | Piochem Pioneers Chemicals Factory Co. | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Lambda-Cyhalomethrin | 5 | % | 001314 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 50 ml/ha | xiyar | mənənə | vegetasiya dövründə har yarpaqda 6-8 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə preparatın tətbiqi məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 175 | Musk 200 WP | Piochem Pioneers Chemicals Factory Co. | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 001315 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 50 qr/100 lt suya | pomidor | istixana ağqanadlı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 176 | Laminar 18 EC | Piochem Pioneers Chemicals Factory Co. | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 1.8 | % | 001316 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 50 ml/100 lt suya | pomidor | hörümçək gənəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 177 | NEOFIDOR 350 SC | Piochem Pioneers Chemicals Factory Co. | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 35 | % | 001317 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 0,40 lt/ha | qarğıdalı | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 178 | Piocklem 57 WG | Piochem Pioneers Chemicals Factory Co. | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5.7 | % | 001318 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 250 qr/ha | kartof | kolorado böcəyi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 179 | GREEN OIL 930 EC | Piochem Pioneers Chemicals Factory Co. | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Paraffin Oil (CAS 8042-47-5) | 93 | % | 001319 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 1,7 lt/ha | alma | yastıcalar gənələr | erkən yazda zərərli orqanizmlərin çoğalma fazalarına qarsı istifadə edilməsi məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 180 | Cloragen 200 SC | Piochem Pioneers Chemicals Factory Co. | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole (Coragen) | 20 | % | 001320 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 75 mL/ha | kələm | kələm ağ kəpənəyi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 181 | Till Master 480 SL | Piochem Pioneers Chemicals Factory Co. | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 48 | % | 001321 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 3,0 lt/ha | alma | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 10-12 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizanin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 182 | SUPERACIDE 570 EC | Piochem Pioneers Chemicals Factory Co. | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 57 | % | 001322 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 1,2 lt/ha | üzüm | üzüm salxım yarpaqbükəni | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 183 | Superacide 570 EC | Tagros Chemicals India Ltd | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 5 | % | 001323 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Hindistan Respublikası | 0,60 lt/ha | pomidor | istixana ağqanadlı | vegetasiya dövründə bitkilərin çiçəklənməsindən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 184 | Alfarubi 50 EC | Tagros Chemicals India Ltd | Hindislan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 20 | % | 001324 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Hindistan Respublikası | 1,35 lt/ha | üzüm | üzüm salxım yarpaqbükəni | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 185 | Delros 25 EC | Tagros Chemicals India Ltd | Hindislan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 2.5 | % | 001325 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Hindistan Respublikası | 0,40 lt/ha | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 186 | Cypros 250 EC | Tagros Chemicals India Ltd | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 25 | % | 001326 | 06.01.2021 | 06.01.2026 | Hindistan Respublikası | 150 mL/ha | pomidor | pomidor güvəsi | çiçəklənədən sonra meyvələrin formalaşması dövründə 100 ədəd yarpaq və meyvədə 1-2 ədəd zərərli orqanizim müşahidə edildikdə kimyavi mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 187 | Deltamethrin Aria 2.5% EC | Ariashimi | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 001327 | 14.01.2021 | 14.01.2026 | | 0,5 | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 188 | Abamectin Aria 1.8% EC | Ariashimi | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Abamectin | 18 | q/L | 001328 | 14.01.2021 | 14.01.2026 | | 0,4 | pambıq | gənələr | vegetasiya dövründə zərərli orqanizim iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 189 | Mac Volck 80% L | Melli Agrochemical Company PJS | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emulsifiable Oil | 80 | % | 001329 | 14.01.2021 | 14.01.2026 | İran İslam Respublikası | 2,5 l/100 lt suya | alma | alma meyvəyeyəni qırmızı meyvə gənəsi yastıcalar | erkən yazda zərərli orqanizmin çoğalma fazasına qarşı mübarizanin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Mac Tan 50% Wp | Melli Agrochemical Company PJS | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 001330 | 14.01.2021 | 14.01.2026 | İran İslam Respublikası | 3,0 kq/ha | alma | damğıl | vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 191 | Mac Ravit 35% WP | Melli Agrochemical Company PJS | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Oxychloride | 35 | % | 001331 | 14.01.2021 | 14.01.2026 | İran İslam Respublikası | 2,2 kq/ha | xiyar | yalançı şeh | vegetasiya müddətində 1-ci çiləməni çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləməni xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 192 | Mac Hyde 6% B | Melli Agrochemical Company PJS | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Metaldehyde | 6 | % | 001332 | 14.01.2021 | 14.01.2026 | İran İslam Respublikası | 25,0 kq/ha | pomidor | çılpaq ilbizlər | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 193 | Mac İmida 35% SC | Melli Agrochemical Company PJS | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 35 | % | 001333 | 14.01.2021 | 14.01.2026 | İran İslam Respublikası | 25 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 194 | Quadrant | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Sti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob -p-ethyl | 50 | q/L | 001387 | 04.02.2021 | 04.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 30 mL/ha | soğan | alaq otları | mədən bitkinin 3 yarpaq, alaqların 2-3 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 195 | Crompton SC | Agrikem Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 480 | q/L | 001388 | 04.02.2021 | 04.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 200 mL/ha | bibər | tripslər | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(2) | 7(3) |
| 196 | Deltaplan EC | Meghmani Organics Limited | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 001389 | 04.02.2021 | 04.02.2026 | Hindistan Respublikası | 300 mL/ha | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 35(2) | 7(3) |
| 197 | Acrobat Mz 90/600 Wg | Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Dimethomorf+Mancozeb | 90+600 | q/kq | 001391 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | İtaliya Respublikası | 2,0 | kartof<br>üzüm | fitoftora<br>mildiu | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 40(3) | 7(3) |
| 198 | Fastac 100 EC | Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | alfa-cypermethrin | 100 | q/L | 001392 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | Fransa Respublikası | 0,1-0,15<br>0,2-0,3<br><br>0,15 | taxıllar<br>alma<br><br>otlaqlar | ziyankar böcəklər<br>meyvəyeyənlər, yarpaqbükənlər<br><br>çəyirtəkəkimilər | vegetasiya mərhələsində çiləmə<br>sürfələrin inkişafı mərhələsində çiləmə | 20(2)<br>30(2)<br><br>0(1) | 7(3) |
| 199 | Fendona 15 SC | Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | alfa-cypermethrin | 15 | q/L | 001393 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | Fransa Respublikası | 25 ml/5 lt suya | meşələrdə istifadə üçün | müxtəlif zərərvericilərə qarşı | zərərvericilər aşkar edildikdə çiləmə | 0(2) | 7(3) |
| 200 | Inscute Perform EC | BASF SE | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyraclostrobin+ Tebuconazole | 40+80 | q/l | 001394 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | Fransa Respublikası | 0,4-0,6 | taxıllar | kök çürümələri, kor və bərk sürmə, fuzarioz | sənədlərdən nəzərə alınmışdır dəyişdirilməsi | 0(1) | 7(3) |
| 201 | Kumulus DF | BASF SE | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kükürd | 800 | q/kq | 001395 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | Almaniya Federativ Respublikası | 6,0-8,0 | üzüm | oidium | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 1(3) | 7(3) |
| 202 | Pulsar 40 SL | Basf Agrochemical Products B.V | Puerto-Riko | Pestisid | Herbisid | Imazamox | 40 | q/L | 001396 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | | 0,75-1,0 lt/ha | soya | birillik ikiləpəli alaqlar | alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında və mədəni bitkinin 1-3 yarpaq mərhələsində çiləmə əsasən | 0(1) | 7(3) |
| 203 | Polyram WG | BASF SE | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metiram | 700 | q/kq | 001397 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | Almaniya Federativ Respublikası | 1,5-2,5<br>1,5-2,5 | üzüm<br>kartof | mildiu,antraknoz<br>fitoftora | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 20(4)<br>20(4) | 7(3) |
| 204 | Rex Duo SC | BASF SE | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Epoxiconazole+Thiophanate-methyl | 187+310 | q/L | 001398 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | İspaniya Krallığı | 0,6-0,8 | şəkər çuğunduru | unlu şeh | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 30(1) | 7(3) |
| 205 | Stroby WG | BASF SE | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-methyl | 500 | q/kq | 001399 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | Almaniya Federativ Respublikası | 0,15-0,2<br>0,14-0,2 | üzüm<br>alma | oidium, mildiu<br>damıl unlu şeh | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 10(3)<br>35(3) | 7(3) |
| 206 | Vivando SC | BASF SE | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metrafenone | 500 | q/L | 001400 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | Fransa Respublikası | 0,2-0,25 | üzüm | oidium | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 30(3) | 7(3) |
| 207 | Collis SC | BASF SE | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxil-methyl+Boscalid | 100+200 | q/L | 001401 | 10.02.2021 | 10.02.2026 | İspaniya Krallığı | 0,4 lt/ha | buğda | unlu şeh, septorioz | vegetasiya mərhələsində çiləmə | 24(2) | 7(3) |
| 208 | Delete 25 EC | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamehrin | 25 | q/L | 001411 | 12.02.2021 | 12.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 30 ml/100 lt suya | alma | minalayıcı güvə<br>alma meyvəyeyəni | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 209 | Devaplan 20 SP | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 200 | q/kq | 001412 | 12.02.2021 | 12.02.2026 | | 0,32<br><br>0,15<br><br>0,15 | pomidor (istixana)<br><br>taxıl<br><br>kartof | mənənə<br><br>taxıl böcəyi<br><br>kolorado kartof böcəyi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2)<br>28(1)<br><br>14(1) | 7(3) |
| 210 | Cyperhard 20 EC | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 200 | q/L | 001413 | 12.02.2021 | 12.02.2026 | | 0,1<br><br>0,3<br><br>0,1-0,15 | pomidor (istixana)<br><br>taxıl<br><br>otlaqlar | pomidor güvəsi<br><br>taxıl böcəyi<br><br>çəyirtəkəkimilər | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2)<br>20(1)<br><br>14(1) | 7(3) |
| 211 | Granite Ultra 10% EC | Montajat Veterniary Pharmceuticals | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 100 | q/L | 001424 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 25,0 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 212 | Pendico 33 EC | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | q/L | 001425 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası | 5,5 lt/ha | pomidor | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 213 | Baris WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid+Pyraclostrobin | 252+128 | q/kq | 001426 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası | 450 qr/100 lt suya | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə tövdicinin ilkin inkişaf mərhələsində,2-ci çiləmə meyvaların formalaşmasından sonra xəstəliyin kütləvi inkişaf dövründə aparılması mənasında uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 214 | Finito WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tribenuron methyl | 750 | q/kq | 001427 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası | 0,45 kq/ha | pomidor | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 215 | Nicofuron SC | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Herbisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | q/L | 001428 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası | 1,6 lt/ha | qarğıdalı | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 216 | Extra 24 EC | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Herbisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | q/L | 001429 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Hindistan Respublikası,Çin Xalq Respublikası | 0,6 lt/ha | pomidor | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 217 | Heliosoufre S | Action Pin | Fransa Respublikası | Pestisid | Fungisid | Sulphur (S) | 700 | q/L | 001430 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Fransa Respublikası | 8,5 lt/ha | üzüm | oidium | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 12(3) | 7(3) |
| 218 | Heliocuivre | Action Pin | Fransa Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cu (Copper Metal) | 400 | q/L | 001431 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Fransa Respublikası | 1,8 lt/ha | üzüm | mildium | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(3) | 7(3) |
| 219 | Nazatem Top | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin+Difenoconazole | 200+125 | q/L | 001432 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,7 kq/ha | üzüm | oidium | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(3) | 7(3) |
| 220 | K-Othrine SC 50 | Bayer Türk Kimya San. LTD. STI. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 50 | q/L | 001433 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Fransa Respublikası | 55 ml/5lt<br>1 m^2-sahəyə | taxıl anbarları | anbar zərərvericiləri | taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 221 | Pybuthrin EW | Bayer Türk Kimya San. LTD. STI. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | PYRETHRINS, Piperonyl butoxide | 3+13.5 | % | 001434 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Fransa Respublikası | 5,5 lt/100 m^2 | taxıl anbarları | anbar zərərvericiləri | taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 222 | K-Obiol EC 25 | Bayer Türk Kimya San. LTD. STI. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin+Piperonyl butoxide | 25+250 | q/L | 001435 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Fransa Respublikası | 1 lt/25 ml 1 ton taxıla | taxıl anbarları | anbar zərərvericiləri | taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 223 | Maxforce Fly Bait | Bayer Türk Kimya San. LTD. STI. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 10 | % | 001436 | 18.02.2021 | 18.02.2026 | Avstriya Respublikası | 55 ml/5lt<br>1 m^2-sahəyə | taxıl anbarları | anbar zərərvericiləri | taxıl anbarlarında zərərvericilər müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 224 | Super Kordant | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Haloxyfob-P-methyl (ester) | 108 | q/L | 001437 | 22.02.2021 | 22.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,5-1,0 | şəkər çuğunduru | birillik və çoxillik birləpəli alaq otları | alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 225 | Cobra Süper EW | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-P-ethyl | 50 | q/L | 001480 | 26.02.2021 | 26.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 2,0 lt/ha | soğan | alaq otları | soğan əkinlərində alaq otlarına qarşı istifadəsi məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 226 | Dagro Exxo | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spiromesifen | 240 | q/L | 001481 | 26.02.2021 | 26.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 30,0 ml/100 lt | pomidor (istixana) | iki nöqtəli qırmızı hörümçək | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 227 | Dagronorm | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 001482 | 26.02.2021 | 26.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 300,0 mL/ha | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 228 | Lorely | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 240 | q/L | 001483 | 26.02.2021 | 26.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 300,0 mL/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 229 | Torino | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin+ Thiamethoxam | 106+ 141 | q/L | 001484 | 26.02.2021 | 26.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 300,0 mL/ha | qarğıdalı | mənənə | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 230 | Maritima Max | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin+Difenoconazole | 200+125 | q/L | 001485 | 26.02.2021 | 26.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 60,0 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 231 | Truemill Mz 72 WP | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+ Metalaxyl | 64+ 8 | % | 001486 | 26.02.2021 | 26.02.2026 | Türkiyə Respublikası | 200,0 qr/100 lt suya | xiyar | yalançı unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 232 | Safconil 500 FL | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 500 | q/L | 001494 | 10.03.2021 | 10.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,5 kq/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 233 | Helicoverpa Armigera | Russel Ipm Integrated Pest Management | Böyük Britaniya Krallığı | Pestisid | Feromon tələ | Z-11-Hexadecen-1-Al, Z-9-Hexadecen-Al | . | % | 001524 | 11.03.2021 | 11.03.2026 | Böyük Britaniya Krallığı | 3 ad/ha | pambıq | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübariza aparılması üçün tətbiq edilir | 0(1) | 0(0) |
| 234 | Rofatoks Q | TPK Rosti MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | İmidoclopid | 0.5+-0.01 | % | 001545 | 15.03.2021 | 15.03.2026 | Rusiya Federasiyası | 30,0 qr/10 m^2 | kartof | kolorado böcəyi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 235 | Suprakal | Supersol Biyoteknoloji A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kalsium polisulfid | 380 | q/L | 001548 | 17.03.2021 | 17.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 500,0 ml/100 lt suya | fındıq | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(4) | 7(3) |
| 236 | Buffoon SC | Tan Tarim Ziraat İlaclari San. Ve Tic.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cu(metallik Cu ekvivalent Cu(OH)2) | 361.1 | q/L | 001558 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kq/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 237 | Boredom Fix | Tan Tarim Ziraat İlaclari San. Ve Tic.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+ Cu(bordo bulamacı) | 30-+0,5+12-+0.5 | % | 001559 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,2 kq/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 238 | Blue Drop 20Wp | Uniagro Tarim Ziraat İlaçlari San.Ve Tic. Lim. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cu(bordo bulamacı) | 20 | % | 001560 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 700,0-1300,0 qr/100 lt suya | üzüm | mildiu | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 239 | Valsaqlif | İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V | Meksika | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 360+-24 | q/L | 001561 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Çin Xalq Respublikası | 2,0-8,0 | meyvə, üzüm | birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi, ikiləpəli alaqlar | yazda alaqların vegetasiyası dövründə çiləmə (mədəni bitkiləri qorumaq şərtilə) aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 240 | Basagran Solo | BASF SE | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone | 480 | q/L | 001562 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Almaniya Federativ Respublikası | 2,0-4,0 | taxıllar | birillik ikiləpəli alaqlar | yazda bitkilərin kollanma dövründə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 241 | Oread | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 480 | q/L | 001564 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 30,0 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Hektaş Ceremony | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prochloraz+ prothiconazole | 150+ 42 | q/L | 001565 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 2,2 l/ha | buğda | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 243 | Miracle 25 WP | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 250 | q/L | 001566 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 55,0 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 244 | Hektaş Zenon | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cloquintocet-mexyl+Pinoxaden | 20+45 | q/L | 001567 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,0 lt/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 245 | Hektaş Albedo | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Buprofezin+Deltamethrin | 50+6.2 | q/L | 001568 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,7 lt/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 246 | Hektaş Crash | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cu(metalik Cu ekvivalent Cu(OH)2) | 361.1 | q/L | 001569 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 2,2 lt/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 247 | Hektaş Brio | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Metaflumizone | 240 | q/L | 001570 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 110 ml/1000 m^2 | pambıq | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 248 | Hektaş Zodiac | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat | 100 | q/L | 001571 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 110 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 249 | Hektaş Volon | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cu (metalik Cu ekvivalent Cu(OH)2) | 35 | % | 001574 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kq/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 250 | Click | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 70 | % | 001575 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,5 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 251 | Malinois | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Tau-Fluvalinate | 240 | q/L | 001576 | 19.03.2021 | 19.03.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,22 lt/ha | xiyar (istixana) | mənənə | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 252 | Polenza | AMC-TR Tarim San.Ve Tic.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 5 | % | 001585 | 29.03.2021 | 29.03.2026 | Hindistan Respublikası | 35,0 qr/100 lt suya | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 253 | Dicarzol 50 SP | Gowan Crop Protection Limited | Birləşmiş Krallıq | Pestisid | İnsektisid | Formetanate | 500 | q/kq | 001586 | 29.03.2021 | 29.03.2026 | Fransa Respublikası | 110,0 qr/100 lt suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 254 | Inqavit | Kemilayn Aqro | Ukrayna | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 200 | q/L | 001587 | 06.04.2021 | 06.04.2026 | Ukrayna | 0,2 l/100l lt suya | alma | alma yaşıl mənənəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 255 | Kemistar | Kemilayn Aqro | Ukrayna | Pestisid | Fungisid | Penconazol | 100 | q/L | 001588 | 06.04.2021 | 06.04.2026 | Ukrayna | 500,0 ml/1000 lt suya | alma | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(3) | 7(3) |
| 256 | Bordotan 20 WP | Tan Tarim Ziraat İlaclari San. Ve Tic.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cu(bordo bulamac) | 20 | % | 001590 | 06.04.2021 | 06.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kq/100 lt suya | alma | qara leke | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 12(2) | 7(3) |
| 257 | Valsazeb 80 WP | İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V | Meksika | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 800 | q/kq | 001592 | 07.04.2021 | 07.04.2026 | Çin Xalq Respublikası | 2,0-3,0<br>0,8-1,0 | alma<br>üzüm<br>pomidor<br>kartof | damğıl<br>mildiu<br>fitoftora | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 30(4)<br>20(3) | 7(3) |
| 258 | Almaz 100 EC | İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V | Meksika | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | q/L | 001593 | 07.04.2021 | 07.04.2026 | Çin Xalq Respublikası | 0,3-0,4<br>0,4 | alma<br>armud<br>üzüm | unlu şeh<br>oidium | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 7(4)<br>21(4) | 7(3) |
| 259 | Sambo 20 WP | İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V | Meksika | Pestisid | İnsektisid | Pyridaben | 200 | q/kq | 001594 | 07.04.2021 | 07.04.2026 | Çin Xalq Respublikası | 0,5-0,9 | alma | gənələr | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 30(1) | 7(3) |
| 260 | Valsabuzin 700 WP | İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V | Meksika | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 700 | q/kq | 001595 | 07.04.2021 | 07.04.2026 | Çin Xalq Respublikası | 0,7-1,4<br>1,0 | kartof(tez yetişən sortlardan başqa),<br>pomidor | birillik ikilləpalı və taxıl fəsiləsi alaqları | Cücərtilər əmələ gələnə qədər torpağa çilənə, Şitil akınından 15-20 gün əvvəl alaq otlarına qarşı mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 261 | Valsamosp RP 20% | İnternational Quimica De Cobre S.A De C.V | Meksika | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 200 | q/kq | 001596 | 07.04.2021 | 07.04.2026 | Çin Xalq Respublikası | 0,06<br>0,15 | kartof<br>meyvə | kolorado kartof böcəyi<br>mənənələr, minalayıcı güvə | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(1) | 7(3) |
| 262 | Algamek 1.8 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Albamectin | 18 | q/L | 001598 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,25 | pomidor meyvə ağacları pambıq | gənələr meyvayeyənlər tor gənəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2) | 7(3) |
| 263 | Alpgor 40 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 001599 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,0-2,5<br>1,5-2,0 | meyvə ağacları<br>pambıq | mənənələr gənələr yasticalar<br>mənənələr gənələr | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 40(2) | 10(4) |
| 264 | Best Captan 50 WP | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 500 | q/kq | 001600 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 2,5-3,0 | üzüm | mildiu | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(4) | 7(3) |
| 265 | Best Amin 500 SL | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4D acid | 500 | q/L | 001601 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 2,5 | taxıl fəsiləsi bitkiləri | birillik ikilləpalı alaqlar | vegetasiya müddətində alaq otlarının 6-8 sm, 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 266 | Best Bakir 50 WP | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik mis | 500 | q/kq | 001602 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 4,8-8,0 | meyvə ağacları | damğıl | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 21(2) | 7(3) |
| 267 | Best Mekab 20 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Nematosid | Ethoprophos | 200 | q/L | 001603 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 50 | pomidor | kök ur- nematodu | şitil basdırılmazdan 1-2 gün önca mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 268 | Best Siper 25 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 001604 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,2<br>0,3<br>0,4 | üzüm<br>alma<br>taxıl fəsiləsi | yarpaqbükənlər meyvayeyənlər,balıca çəyirtkələr | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2)<br>20(2) | 7(3) |
| 269 | Goldplan 20 SP | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 200 | q/kq | 001607 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,06<br>0,1 | kartof<br>pambıq | koloroda kartof böcəyi<br>mənənə | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(1) | 7(3) |
| 270 | Jetsis 2.5 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 001608 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,3<br>0,25 | kartof<br>pambıq | koloroda kartof böcəyi<br>pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 30(2) | 7(3) |
| 271 | Melintos 30 SC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimmethanil | 300 | q/L | 001609 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,5 | meyvə bitkiləri | damğıl | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 21(2) | 10(4) |
| 272 | Patamil 72 WP | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 640+ 80 | q/kq | 001610 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 2,5 | kartof<br>pomidor<br>üzüm<br>xiyar<br>yemiş | fitoftora<br>mildiu<br>yalançı unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2) | 7(3) |
| 273 | Petra 5 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 50 | q/L | 001611 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,4<br>0,5 | üzüm<br>pambıq | salxım yarpaqbükən<br>pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 10(4) |
| 274 | Sonfix 1 DS | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Diniconazole | 10 | q/kq | 001612 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,7 | taxıl fəsiləsi | sürmə | səpindən əvvəl zərərli orqanizmə qarşı toxum materialının preparatla islanması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 275 | Surrender 5SG | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 50 | q/kq | 001613 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,3 | üzüm<br>pambıq | salxım güvəsi<br>pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2) | 7(3) |
| 276 | Mangrif 75 WG | UPL Limited | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 750 | q/kq | 001615 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Hindistan Respublikası | 0,3<br>0,15<br>0,2 | pomidor<br>üzüm<br>meyvə ağacları | altemarioz<br>mildiu<br>damğıl | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(3)<br>21(3)<br>21(3) | 7(3) |
| 277 | Fist 330 EC | UPL Limited | Hindistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | q/L | 001616 | 09.04.2021 | 09.04.2026 | Hindistan Respublikası | 3,0-6,0 | çüməbaxan | birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpalı alaqlar | madani bitkilər əmələ gələnə qədər çiləmə aparılmalıdır | 0(1) | 7(3) |
| 278 | Rambler 50 WP | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil+Mancozeb | 5+45 | % | 001619 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 3,0<br>3,0 | pomidor<br>kartof | fitoftora<br>fitoftora | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2) | 7(3) |
| 279 | Supercozeb M 45 WP | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 001620 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 2,2 | xiyar | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2) | 7(3) |
| 280 | Supervin SP 90 | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 90 | % | 001621 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,7 | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(3) | 10(4) |
| 281 | Calamity | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron-methyl | 75 | % | 001622 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,015 | taxıl | birillik ikilləpalı alaqlar | bitkilərin kollanma mərhələsinin əvvəlində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(4) |
| 282 | Sword 240 SL | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Oxamyl | 240 | q/L | 001624 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 3,2 lt/1000 m^2 | pomidor | nematod | şitil akınından 2-3 gün əvvəl mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 283 | Montozol 10% EC | Montajat Veterniary Pharmceuticals | Saudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | Fungisid | Penoconazole | 10 | % | 001626 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 40,0 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 284 | Cythrin Pro 25% EC | Montajat Veterniary Pharmceuticals | Saudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 25 | % | 001627 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 25,0 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 285 | Mebracy 20% SP | Montajat Veterniary Pharmceuticals | Saudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 001628 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Saudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 40,0 q/100 lt suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Abamec 18 EC | Montajat Veterinary Pharmceuticals | Səudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 1.8 | % | 001629 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı | 50,0 q/100 lt suya | pomidor (istixana) | tütün tripsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 287 | Gladius 10% SC | Summit Agro International LTD. | Yaponiya | Pestisid | İnsektisid | Flometoquin | 10 | % | 001631 | 12.04.2021 | 12.04.2026 | Yaponiya | 0,75 lt/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 288 | Ersorin 5 EC | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | q/L | 001634 | 13.04.2021 | 13.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,55 | alma, armud | gənələr | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2) | 7(3) |
| 289 | Dagro Palm Star | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat | 100 | q/L | 001640 | 16.04.2021 | 16.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 50,0 ml/100 lt suya | alma | alma yaşıl mənənəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(3) | 7(3) |
| 290 | Deva Bordo | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cu(72.7% bordo bulamacı) | 20 | % | 001641 | 16.04.2021 | 16.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 125,0 ml/100 lt suya | alma | damğıl | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 291 | Eumidan Captan | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 001642 | 16.04.2021 | 16.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 300,0 qr/100 lt suya | şaftalı | moniliоz | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 292 | Woprosulf 80 WG | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | S | 80 | % | 001643 | 16.04.2021 | 16.04.2026 | Türkiyə Respublikası | 400,0 qr/100 lt suya | nektarin | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 293 | Hot-Amin | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2.4-D Acid-a ekvivalent Dimethyl Amin Duzu | 500 | q/L | 001702 | 08.05.2021 | 08.05.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,6-3,0 | taxıl fəsiləsi bitkiləri | birillik ikiləpəli alaqlar | bitkinin kollanma mərhələsində çiləmə | 0(1) | 7(3) |
| 294 | Panzher | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pirimicarb | 50 | % | 001703 | 08.05.2021 | 08.05.2026 | Türkiyə Respublikası | 32,0 qr/100 lt suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 295 | Cartel 45 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cloquintocet-mexyl(safener)+Pinoxaden | 20+45 | q/L | 001704 | 08.05.2021 | 08.05.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,0 lt/ha | taxıl | birləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 1-2 yarpaq, alaq otlarının boyu 2-3 sm olanda mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 296 | Azir 400 EW | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prochloraz+Tebuconazole | 267+133 | q/L | 001705 | 08.05.2021 | 08.05.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,5 lt/ha | qarğıdalı | pas xəstəlikləri | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 297 | Quars 325 SC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin+Difenoconazole | 200+125 | q/L | 001706 | 08.05.2021 | 08.05.2026 | Türkiyə Respublikası | 110,0 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 298 | Taras SC 240 | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Spirodiclofen | 240 | q/L | 001707 | 08.05.2021 | 08.05.2026 | Türkiyə Respublikası | 40,0 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | tor gənəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 299 | Clayton Metropolis | Clayton Plant Protection LTD | İrlandiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesosulfuron-methyl+ İodosulfuron-methyl+ Mefenpyr-diethyl | 10+ 2+ 30 | q/L | 001708 | 08.05.2021 | 08.05.2026 | İrlandiya Respublikası | 1,2 lt/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 300 | Clayton Comply | Clayton Plant Protection LTD | İrlandiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Prosulfocarb | 800 | q/L | 001709 | 08.05.2021 | 08.05.2026 | İrlandiya Respublikası | 5,2 lt/ha | kartof | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm olmaqla 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 301 | Clayton Glacier | Clayton Plant Protection LTD | İrlandiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin+Flufenacet | 300+ 60 | q/L | 001710 | 08.05.2021 | 08.05.2026 | İrlandiya Respublikası | 2,5 lt/ha | pomidor | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyu 6-8 sm olmaqla 3-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 302 | Bankol 500 SC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 500 | q/L | 001711 | 17.05.2021 | 17.05.2026 | Çin Xalq Respublikası | 0,3 lt/100 lt suya | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 303 | Dodine 500 FW | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 500 | q/L | 001712 | 17.05.2021 | 17.05.2026 | Çin Xalq Respublikası | 175,0 ml/100 lt suya | şaftalı | yarpaq qıvrıqlığı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 304 | Efal | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | fosetyl aluminium | 80 | % | 001713 | 17.05.2021 | 17.05.2026 | Çin Xalq Respublikası | 170,0 qr/100 lt suya | soğan | yalançı unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 305 | Strobin 50 WG | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Trifloxystrobin | 50 | % | 001714 | 17.05.2021 | 17.05.2026 | Çin Xalq Respublikası | 15,0 qr/100 lt suya | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 306 | Topaz 100 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | q/L | 001715 | 17.05.2021 | 17.05.2026 | Çin Xalq Respublikası | 50,0 ml/100 lt suya | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 307 | Versal 50 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | İmazalil | 500 | q/L | 001716 | 17.05.2021 | 17.05.2026 | Çin Xalq Respublikası | 0,6 lt/ha | şəkər çuğunduru | serkosporioz | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 25(2) | 7(3) |
| 308 | Cansasiper | Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob -P-ethyl | 50 | q/L | 001733 | 04.06.2021 | 04.06.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,10 lt/ha | soğan | alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 309 | Cansa Goliaht 2E | Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | q/L | 001734 | 04.06.2021 | 04.06.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,75 lt/ha | soğan | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının 1-3 sm bitkinin 1-2 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 310 | Ethonn | Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | q/L | 001735 | 04.06.2021 | 04.06.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,3 lt/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otlarının 4-6 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 311 | Savant SL 50 | Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | q/L | 001736 | 04.06.2021 | 04.06.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,45 lt/ha | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 312 | Cartasuper SP | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cartap | 50 | % | 001750 | 16.06.2021 | 16.06.2026 | Çin Xalq Respublikası | 0,4-1,0 | pomidor | kolorado kartof böcəyi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2) | 7(3) |
| 313 | Baktofit SC (Бактофит Ск) | Sibbiofarm ІВ ММС | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Bacilus subtilis, ştamm ІPM 215(BA-10000 EA/ml, titr 2 mil spor/ml) | . | % | 001793 | 09.07.2021 | 09.07.2026 | Rusiya Federasiyası | 1000,0 ml 100,0 lt/suya | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 314 | Lepidosid SC(Лепидосид СК) | Sibbiofarm ІВ ММС | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Bacilus Thuringiensis subsp. Kurstaki Z-52(BA-2000 EA/mq, titr10 milyard Spor/ml) | . | % | 001795 | 09.07.2021 | 09.07.2026 | Rusiya Federasiyası | 250,0 ml 100,0 lt/suya | pomidor | pomidor ləğmiyaycı güvəsi (Tuta absoluta) | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 315 | Ephtal 48 SL | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Defoliant | Ethephon | 480 | q/L | 001797 | 14.07.2021 | 14.07.2026 | Türkiyə Respublikası | 3,5 | pambıq | defoliasiya | pambıq bitkisinin qozaları 50-55% açıldıqda tətbiq edilməsi daha səmərəlidir | 20(2) | 0(0) |
| 316 | Helmacide | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Molyuskosid | Metaldehyde | 4 | % | 001798 | 12.07.2021 | 12.07.2026 | Türkiyə Respublikası | 50,0 kq/ha | tarəvəz | ilbiz | vegetasiya dövründə cərgələrarası torpaq üzərinə səpilir | 0(1) | 10(3) |
| 317 | Athletic 25 EC | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 001814 | 02.08.2021 | 02.08.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,25 | bostan bitkiləri | payızlıq sovka | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(1) | 7(3) |
| 318 | Pascal 20 SP | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acethamiprid | 20 | % | 001815 | 02.08.2021 | 02.08.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,1-0,4 | pambıq | mənənə, trips | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(3) | 7(3) |
| 319 | Sicorin 25 EC | The Scientific Fertiliser Company Private Ltd | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 25 | % | 001816 | 04.08.2021 | 04.08.2026 | Hindistan Respublikası | 150,0 mL/ha | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 320 | Acclaim 5 SG | The Scientific Fertiliser Company Private Ltd | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 001817 | 04.08.2021 | 04.08.2026 | Hindistan Respublikası | 2,20 lt/ha | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 321 | Indox 15 SC | The Scientific Fertiliser Company Private Ltd | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 15 | % | 001818 | 04.08.2021 | 04.08.2026 | Hindistan Respublikası | 0,6 lt/ha | pambıq | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 322 | King 5 EC | The Scientific Fertiliser Company Private Ltd | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 5 | % | 001819 | 04.08.2021 | 04.08.2026 | Hindistan Respublikası | 320,0 mL/ha | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 323 | Action 25 WDG | The Scientific Fertiliser Company Private Ltd | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 25 | % | 001820 | 04.08.2021 | 04.08.2026 | Hindistan Respublikası | 210,0 qr/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15(2) | 7(3) |
| 324 | Smite 34 EC | The Scientific Fertiliser Company Private Ltd | Hindistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 34 | % | 001821 | 04.08.2021 | 04.08.2026 | Hindistan Respublikası | 3,5 L/ha | soğan | alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 325 | Topstar 23 SC | The Scientific Fertiliser Company Private Ltd | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 23 | % | 001822 | 04.08.2021 | 04.08.2026 | Hindistan Respublikası | 520,0 mL/ha | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 326 | Entometrin 25 % EC(Энтометрин 25 % К.Э) | OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 25+-2 | % | 001829 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 0,4 L/ha | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 327 | Dalate 5 % EC ( Далата 5% К.Э) | OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 5+-0.2 | % | 001830 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 0,3 L/ha | üzüm | saxım yarpaqbükəni | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 328 | Ekvador 35 SC (Эквадор 35 К.С) | OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidaclоprid | 350+-10 | q/L | 001831 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 250,0 mL/ha | pomidor (istixana) | istixana (ağqanadlısı) | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 329 | Demafos 40 EC (Демафос 40 % К.Э) | OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Dimethoate | 40+-2 | % | 001832 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 2,0 L/ha | xiyar (istixana) | tor gənəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 330 | Entospilan 20 SP(Энтоспилан 20% С.П.) | OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20+-1.5 | % | 001834 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 320,0 qr/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 331 | Protekt 50 q/kq (Протект 50 Г/Кг В.Р.Г) | OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 50+-2.5 | q/kq | 001835 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 0,4 kq/ha | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 332 | Spirometktin 24 SC (Спирометктин 24 % К.Э.) | OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Akarisid | Abamectin+Spirodiclofen | 18+-0.5+222+ 5 | q/L | 001836 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 0,30 L/ha | xiyar (istixana) | tor gənəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 333 | Entomektin 1.8 EC (Энтомектин 1.8 К.Э) | OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Akarisid | Abamectin | 18+-0.2 | q/L | 001837 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 0,6 L/ha | pomidor (istixana) | tor gənəsi | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 334 | Kapitoks 50 WP (Капитокс 50 % С.П) | OOO İlɵda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50+-2 | % | 001838 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 1,5 kq/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Entoxlorok Ekstra 72 WP(Ентохлорок Экстра С.П) | OOO İlöda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb, Cymoxanil | 64+-1.5, 8+-0.3 | %, % | 001839 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 1,6 kq/ha | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 336 | Ifosera 72 SC (Ифосера 72% К.С.) | OOO İlöda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kükürd (S) | 72+-3 | % | 001840 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 4,2 L/ha | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 20(2) | 7(3) |
| 337 | Entoglifos 50 SL(Энтоглифос 50% В.Р) | OOO İlöda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 500+-20 | q/L | 001842 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 6,0 L/ha | üzüm | alaq otları | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ziyan vurma həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 338 | Entostop 33 EC(Энтостоп 33% К.Э.) | OOO İlöda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 33+-2 | % | 001843 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 3,5 L/ha | soğan | birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 2-3, alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 339 | Enterra 40 EC (Интерра Г Л К.З.) | OOO İlöda Agro Kimyo Himoya | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob-p- tefuryl | 40 | q/L | 001844 | 12.08.2021 | 12.08.2026 | Özbəkistan Respublikası | 1,5 L/ha | şəkər çuğunduru | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 340 | Miclothane 24 E | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Myclobutanil | 245 | q/L | 001871 | 19.08.2021 | 19.08.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,15-0,225 | alma | damğıl, unlu şeh | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(3) | 7(3) |
| 341 | Korbett 250 EC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | q/L | 001872 | 19.08.2021 | 19.08.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,1 | alma, armud | damğıl | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 14(2) | 7(3) |
| 342 | Lastik Top, EM(Ластик Топ) | Avqust SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Cladinafob-propargyl+ Fenoxaprop P-ethyl+ Cloquintocet-mexyl(antidote) | 60+90+40 | q/L | 001873 | 26.08.2021 | 26.08.2026 | Rusiya Federasiyası | 0,5 L/ha | payızlıq taxıl | ikiləpəli alaq otları | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 343 | Lastik Extra, EC (Ластик Экстра, КЭ) | Avqust SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-P ethyl + Cloquintocet-mexyl(antidote) | 70+40 | q/L | 001874 | 17.12.2021 | 26.08.2026 | Rusiya Federasiyası | 1,2 L/ha | payızlıq taxıl | birillik alaq otlarına qarşı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 344 | Triceps, WG (Трицепс) | Avqust SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Trifllusulfuron-methyl | 750 | q/kq | 001875 | 26.08.2021 | 26.08.2026 | Rusiya Federasiyası | 22 q/ha | şəkər çuğunduru | ikiləpəli alaq otlarına qarşı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 345 | Pilot SC (Пилот) | Avqust SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Metamitron | 700 | q/L | 001876 | 26.08.2021 | 26.08.2026 | Rusiya Federasiyası | 2 kq/ha | şəkər çuğunduru | ikiləpəli alaq otlarına qarşı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 346 | Hacker WSG (Хакер) | Avqust SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Chlopyralid | 750 | q/kq | 001877 | 26.08.2021 | 26.08.2026 | Rusiya Federasiyası | 120,0 qr/ha | payızlıq taxıl | ikiləpəli alaq otlarına qarşı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 347 | Oplot Trio, SC (Оплот Трио) | Avqust SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole+Azoxystrobin+ Difenoconazole | 45+40+90 | q/L | 001878 | 26.08.2021 | 26.08.2026 | Rusiya Federasiyası | 0,5 L/ha | buğda toxumu | bark sürmə xəstəliyinə | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 348 | Escudo WG(Эскудо) | Avqust SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Rimsulfuron | 500 | q/kq | 001879 | 26.08.2021 | 26.08.2026 | Rusiya Federasiyası | 0,3 kq/ha | kartof əkinlərində | alaq otlarına qarşı | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 349 | Hat-Trick, SC (Хет-Трик) | Avqust SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid / Fungisid | Tebuconazole + Difenoconazole+ Imidacloprid | 17+67+333 | q/L | 001880 | 26.08.2021 | 26.08.2026 | Rusiya Federasiyası | 0,5 L/ha | payızlıq buğda toxumu | bark sürmə, toz sürmə, fuzarioz, helmintasporioz kök çürümələri | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 350 | Polycup Blue | Aven Kimya San. ve Tic. LTD. ŞTİ | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik misə ekvivalent Tetracopper Tricalcium Sulphate- Bordo bulaması | 20 | % | 001921 | 05.11.2021 | 05.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 200 q/100 l suya 1000 m^2 | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh (mildiu) | bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazalarında (məhsul yığımından 14 gün öncəsinə qədər olmaqla) tətbiq edilə bilər | 15/2 | 0(0) |
| 351 | Fastkill 10 ULV | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 10 | q/L | 001923 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,0 | 1,Pomidor (istixana) 2.Xıyar (istixana) 3. Otlaqlar, çəyirtəkəkimilərlə sirayətlənmiş sahələr | 1,Pomidor güvası, istixana ağqanadlısı 2, istixana ağqanadlısı, manənalar 3,çəyirtəkəkimilər | 1,Vegetasiya marhələsində çiləmə 2,Vegetasiya marhələsində çiləmə 3,Sürfələrin inkişaf marhələsinə uyğun çiləmə | 1,14/2 2,14/2 3,14/1 | 1,7(3) 2,7(3) 3,7(3) |
| 352 | Cyperkiller 250 EC | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 001925 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1, 0,15-0,34 | meyvə | meyvəyeyənlər | vegetasiya marhələsində çiləmə | 20(2) | 7(3) |
| 353 | Com-Pass 50 WP | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 001926 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,4-0,5 | meyvə | damğıl, meyvə çürüməsi | vegetasiya marhələsində çiləmə | 15(2) | 7(3) |
| 354 | Nissol-Ultra 5 EC | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | q/L | 001927 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,2 | pambıq | qanalar | vegetasiya marhələsində çiləmə | 20(2) | 10(4) |
| 355 | Dimiron SC 48 | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 480 | q/L | 001928 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,2-0,35 | meyvə | meyvəyeyənlər, ballıca | vegetasiya marhələsində çiləmə | 20(2) | 10(4) |
| 356 | Abamec EC | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 001929 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 2,5-3,0 | alma | qanalar, minaçanalar | vegetasiya marhələsində çiləmə | 28(2) | 7(3) |
| 357 | Mospilate 20 SP | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 200 | q/L | 001930 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,3-0,4 | alma | manənalar | vegetasiya marhələsində çiləmə | 14/1 | 7(3) |
| 358 | Satellite 20 WP | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Pyridaben | 20 | % | 001931 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,5 | 1,meyvə 2.pomidor (ərtüü sahə) | qanalar | vegetasiya marhələsində çiləmə | 30(1) 3(1) | 10(3) 7(3) |
| 359 | Aekido 5 EC | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | q/L | 001932 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,25-0,4 | pambıq | pambıq soxası | vegetasiya marhələsində çiləmə | 30(2) | 10(4) |
| 360 | Bentagoran | Agrofarm Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone | 480 | q/L | 001933 | 22.11.2021 | 22.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,5-2,0 | soğan | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya marhələsində çiləmə | 60(1) | 7(3) |
| 361 | Leimay | Nissan Chemical Corporation | Yaponiya | Pestisid | Fungisid | Amisulbrom | 200 | q/L | 001937 | 25.11.2021 | 25.11.2026 | Yaponiya | 1, 0,4 L/ha-1000 l su 2, 0,5 L/ha-600 l su | 1,üzüm 2 kartof | 1,yalançı unlu şeh, unlu şeh 2,boz çürümə | vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin müşhidə edildiyi zamanda tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur | 15/2 | 7(3) |
| 362 | Abone Süper 5 EC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob -P-ethyl | 50 | q/L | 001950 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,0 lt/ha | üzüm | birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları | qilələrin yetişməsi fazasında çiləmə | 60/1 | 7(3) |
| 363 | No-Fly 20 SP | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 001951 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 250 qr/ha | üzüm | salxım yarpabükəni | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 20/1 | 7(3) |
| 364 | Bethrin 2,5 EC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 001952 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 300 qr/ha | üzüm | salxım yarpabükəni | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 20-30 / 2 | 7(3) |
| 365 | Boreas | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Imazamox | 40 | q/L | 001953 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,25 lt/ha | üzüm | birillik birləpəli və bəzi ikiləpəli alaq otları | qilələrin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər | 60/1 | 7(3) |
| 366 | Cilia | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | q/L | 001954 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,0 lt/ha | üzüm | oidium | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 21 / 3-4 | 7(3) |
| 367 | Cupcol | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 001955 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,5 lt/ha | üzüm | salxım yarpabükəni | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 21/2 | 10(4) |
| 368 | Evander | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fenhexamid | 500 | q/L | 001956 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1 lt/ha | üzüm | boz çürümə | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 20/2 | 7(3) |
| 369 | Evander | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 001957 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 250 qr/l | üzüm | salxım yarpabükəni | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 25/2 | 7(3) |
| 370 | Fnamec | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-d 2-ethylhexyl ester+Florasulam | 452.42+ 6.25 | q/L, q/L | 001958 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,5 lt/ha | üzüm | birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları | qilələrin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər | 60/1 | 7(3) |
| 371 | Curcio 50 WP | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik bakıra əsələğər bakır oksiklorid | 50 | % | 001959 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 5 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 21 / 3-4 | 7(3) |
| 372 | Giant 330 EC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | q/L | 001960 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 5 kq/ha | üzüm | birillik birləpəli və ikiləpəli alaq otları | qilələrin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər | 60/1 | 7(3) |
| 373 | Hawy SC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methoxyfenozide | 240 | q/L | 001961 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,4 lt/ha | üzüm | salxım yarpabükəni | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 25/2 | 7(3) |
| 374 | Jargon 116,2 EC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 116,2 | q/L | 001962 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,7 lt/ha | üzüm | birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları | qilələrin yetişmə dövründə tətbiq edilə bilər | 60/1 | 7(3) |
| 375 | Leeric | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 350 | q/L | 001963 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1 lt/ha | üzüm | salxım yarpabükəni | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 21/2 | 7(3) |
| 376 | Mespachlorid | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Mepiquat-Chloride | 50 | q/L | 001964 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,5-2,0 lt/ha | üzüm | salxım yarpabükəni | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 14/2 | 3(3) |
| 377 | Ammonyul | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate isopropylamin duzu | 480 | q/L | 001965 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 5,0 lt/ha | üzüm | birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları | qilələrin yetişmə fazasında çiləmə tətbiq edilə bilər | 60/1 | 7(3) |
| 378 | Missile | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | q/L | 001966 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,7 lt/ha | üzüm | salxım yarpabükəni | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 14/1 | 7(3) |
| 379 | Passat | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda cyhalothrin | 50 | q/L | 001967 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,2 L/ha | üzüm | salxım yarpabükəni | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 10/2 | 7(3) |
| 380 | Pixallus | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin+ Difenoconazole | 200+125 | q/L | 001968 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,0 lt/ha | üzüm | oidium | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 21/2 | 7(3) |
| 381 | Praxis | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 001969 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,25 lt/ha | üzüm | iki nöqtəli qırmızı hörümcək | vegetasiya dövründə tətbiq edilə bilər | 28/2 | 7(3) |
| 382 | Ramto 240 EC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet- mexyl (Safener) | 240+ 60 | q/L | 001970 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,2 lt/ha | üzüm | birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları | qilələrin yetişməsi dövründə tətbiq edilə bilər | 60/1 | 7(3) |
| 383 | Teleste | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 100 | q/L | 001971 | 26.11.2021 | 26.11.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,0 lt/ha | üzüm | birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları | qilələrin yetişməsi dövründə tətbiq edilə bilər | 60/1 | 7(3) |
| 384 | Emadox SC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | İnsektisid | 53q/L-Emamectin benzoate+106g/l -Indoxacarb | 53+106 | q/L | 001997 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,3 lt/ha | pomidor (istixana) | pambıq soxası | vegetasiya arzində bitkinin meyvəsinin formalaşdığı dövrdə tətbiq olunur | 20/2 | 7(3) |
| 385 | Ninjitsu CS | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | İnsektisid | Lambda - cyhalothrin | 50 | q/L | 001998 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,25 lt/ha | alma | alma meyvəyeyəni | vegetasiya dövründə tətbiq | 20/2 | 10(4) |
| 386 | Arselit 100 EC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | q/L | 001999 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,45 lt/ha | qarğıdalı | pambıq soxası | vegetasiya dövründə tətbiqi | 14/2 | 15(3) |
| 387 | Invut 150 SC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | q/L | 002000 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,3 lt/ha | üzüm | üzüm salxım yarpaqbükəni | salxımlarda qilələrin formalaması və yetişməsindən sonra | 10/2 | 10(4) |
| 388 | Jasoy 050 EC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | İnsektisid | 50q/L-Lufenuron | 50 | q/L | 002001 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,35 lt/ha | bibər (istixana) | trips | 1-ci çiləmə yumruların ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiləmə yumruların orta yetişgən dövründə aparılması məqsədə uyğun hesab edilir | 14/2 | 7(3) |
| 389 | Oncaplan 20 SP | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 002002 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,32 kq/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | ilk meyvə yumrularının əmələ gəldiyi dövrdə çiləmənin aparılması məqsədə uyğundur | 14/1 | 7(3) |
| 390 | Toloy 40 EC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 002003 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,2 lt/ha | alma | yaşıl mənənə | çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşmasından sonrakı dövrdə, vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur | 40/1 | 10(4) |
| 391 | Fantos 10 SC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Akarisid | 110g/L-Etoxazole | 110 | q/L | 002004 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,4 lt/1 ton suya | pomidor (istixana) | hörümçək gənəsi | vegetasiya dövründə meyvə yumrularının formalaşması fazasında tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 392 | Oncamectin 1.8 EC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 002005 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,3 lt/1 ton suya | xiyar (istixana) | tor gənəsi | çiçəklənədən sonra hər yarpaqda orta hesabla, 5-6 ədəd tor gənəsi müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1 | 7(3) |
| 393 | Onrat 320 SC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Fungisid | Tebuconazole+Azoxystrobin | 200+120 | q/L | 002006 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,3 lt/1 ton suya | pomidor (istixana) | unlu şeh | çiçəklənədən əvvəl və çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa marhələsində tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir | 14/2 | 7(3) |
| 394 | Onadris SC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | q/L | 002007 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,65 lt/1 ton suya | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | çiçəklənədən əvvəl və çiçəklənədən sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başlaması marhələsində tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir | 14/2 | 7(3) |
| 395 | Selodim 240 EC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Herbisid | Clethodim | 240 | q/L | 002008 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,2 lt/ 1 ton suya | pambıq | birillik və çoxillik alaq otları | alaq otlarının 6-8 sm, bitkilərin əsas yarpaqlarının əmələ gəlmə marhələsində tətbiqi məqsədə uyğundur | 60/1 | 7(3) |
| 396 | Jintis WG | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Herbisid | Mesosulfuron-methyl+Iodosulfuron-methyl-sodium+Mefenpyyr diethyl(safener) | 3+0.6+9 | % | 002009 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,28 kq/ha | taxıl | birillik ikiləpəli alaq otları | vegetasiya dövründə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 397 | Bantor Ultra | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Herbisid | 40q/L-Imazamox | 40 | q/L | 002010 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,3 lt/ha | yonca | sarı sarmaşıq | vegetasiya dövründə (biçindən sonra) tətbiqi tövsiyə olunur | 60/1 | 7(3) |
| 398 | Eratis 48 SL | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Herbisid | 480q/L-Glyphosate isopropylamin duzu | 480 | q/L | 002011 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 3,0 lt/ha | alma | birillik alaq otları | alaq otlarının boyunun 10-12 sm, inkişafının 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğundur | 30/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | Meskip 240 EC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- mexyl (Safener) | 240+60 | q/L | 002012 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 2,2 lt/ha | buğda | birillik dar yarpaqlı alaq otları | bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğundur | 30/1 | 7(3) |
| 400 | Sino 5 EC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob -p-ethyl | 50 | q/L | 002013 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,0 lt/ha | şəkər çuğunduru | birillik və çoxillik alaq otları | alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir | 60/1 | 7(3) |
| 401 | Perfantis 45 EC | Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cloquintocet mexyl (safener)+Pinoxaden | 20+45 | q/L | 002014 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 1,2 lt/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaq otları | bitkinin 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir | 60/1 | 7(3) |
| 402 | Pirana 5 SG | Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 5 | % | 002015 | 23.12.2021 | 23.12.2026 | Türkiyə Respublikası | 0,35 kq/ 1 ton suya | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | meyvə başlanğıclarının formalaşması dövründə tətbiqi məqsədə uyğun hesab edilir | 14/2 | 7(3) |
| 403 | Dynam | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tanzimləyici | 6-Benzyladenin+Giberelin A4/A7 | 18.8+18.5 | q/L+q/L | 002031 | 08.02.2022 | 08.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,75 L/ha | alma | damgil<br>xestəliyi | çiçəklənməden əvvəl kiklden kənar 1-ci yemləmə, çiçəklənməden sonra 2-ci yemləmə kimi yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiq edilir | 15-20/2 | 3(3) |
| 404 | Amaranth | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik bakıra əsaslanan bakır oksiklorid | 50 | % | 002032 | 08.02.2022 | 08.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 350 qr/100 L suya | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya arzində 1-ci çiləmanın tövsiyə olunduğu müddətdə, 2-ci çiləmanın xəstəliyin kütləvi yayıldığı dövrdə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 405 | Benvol 50 WG | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-methyl | 50 | % | 002033 | 08.02.2022 | 08.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 30 qr/100 L suya | xiyar (istixana) | unlu şeh | 1-ci çiləmanın çiçəklənməden əvvəl, tövdicinin ilk inkişaf dövründə, 2-ci çiləmanın çiçəklənməden sonra, meyvələrin formalaşması dövründə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 3(3) |
| 406 | Effector | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | q/L | 002034 | 08.02.2022 | 08.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/ha | pomidor | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində çiçəklənməden sonra meyvələrin formalaşması dövründə çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 407 | Tackle | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 240 | q/L | 002035 | 08.02.2022 | 08.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 45 ml/100 L suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya dövründə çiçəklənməden sonra hər yarpaqda orta hesabla 2-4 ədəd zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 408 | Trinity | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | q/L | 002036 | 08.02.2022 | 08.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,5 L/ha | pomidor | birillik ikiləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının 6-8 sm olan mərhələsində (2-4 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 409 | Vector 50 WG | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 002037 | 08.02.2022 | 08.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,45 kq/ha | alma | damgil | vegetasiya dövründə 1-ci çiləmə çiçəklənməden əvvəl, 2-ci çiləmə meyvələrin formalaşdığı və xəstəliyin intensiv yayıldığı dövrdə tətbiqi tövsiyə olunur | 25-30/2 | 7(3) |
| 410 | Dagro Cure 25 WP | Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 002062 | 09.02.2022 | 09.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 250 q/ha / 1 ton su (0,025%-li işçi məhlul halında) | alma | damgil, unlu şeh | vegetasiya müddətində bitkinin xəstəlik törədicilərı ilə 15%-lik yoluxmasının müşahidə olunduğu müddətdən başlayaraq fasilə ilə istifadə olunması məqsədəuyğun hesab edilir | 7-10/2-3 | 7(3) |
| 411 | Fumişans, Həb (Фумишанс, Таб) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fumiqant | Aluminium phosphide | 560 | q/kq | 002068 | 11.02.2022 | 11.02.2027 | Hindistan Respublikası | 10 q/m^3 | qurudulmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları | anbarlarda rast gəlinən bütün zərərvericilər | qapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarşı tətbiqi məqsədə uyğundur | 0/1 | 7(3) |
| 412 | Exirel 100 SE | FMC İnternational Switzland Sarl | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Cyantraniliprole | 100 | q/L | 002073 | 16.02.2022 | 16.02.2027 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 1, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)<br>2, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul)<br>3, 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul)<br>4, 0,5 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul)<br>5, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul)<br>6, 1,0 L/ha (1000 L/ha işçi məhlul) | 1, pomidor açıq sahədə<br>2, pomidor istixanalarda<br>3, kartof<br>4, soğan<br>5, üzüm<br>6 alma | 1, pomidor güvəsi (Tuta absoluta)<br>2, pomidor güvəsi (Tuta absoluta)<br>3, kolarado böcəyi (Leptinotarsa desemlineata)<br>4, tütün tripsi (thrips tabaci)<br>5, yarpaqbükən (lobesia botrana)<br>6, alma meyvəyeyəni (cydia pomonella) | darmanlama zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/2 | 7(3) |
| 413 | Atlantic 500 SC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Akarisid | Clofentezine | 500 | q/L | 002074 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,6 L/ha | pambıq | hörümçək gənəsi | filiqa yarpaqlarının əmələ gəlməsindən sonra iqtisadi ziyanlı hədd səviyyəsində (orta hesabla bir yarpaqda 4-5 ədəd olduqda) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 10(3) |
| 414 | Aytap 20 EC | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid/Nematisid | Ethoprophos | 200 | q/L | 002075 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Hindistan Respublikası | 50 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul) | xiyar (istixana) | kök fir nematodları | darmanlamanın şitillər əkilməmişdən 1-2 gün əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 415 | Baston 400 EC | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Nematosid | Fenamiphos | 400 | q/L | 002076 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Hindistan Respublikası | 25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul) | pomidor | kök fir nematodları | darmanlamanın şitillər sahəyə köçürülməzdən əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 416 | Dogaman 250 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | q/L | 002077 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,2 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) | şəkər çuğunduru | unlu şeh (Erysiphe betae) | zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 417 | Doris | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | q/L | 002078 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 80 ml/100 L su | pomidor (istixana) | fitoftora | çiçəklənməden əvvəl tövdicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyin intensiv inkişaf mərhələsində 2-ci çiləmanın aparılması tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 418 | Judo 5 EC | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 50 | q/L | 002079 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Hindistan Respublikası | 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) | kartof | kolorado böcəyi | zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 419 | Pole 500 SC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Clofentezine | 500 | q/L | 002080 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 35 ml/100 l su | xiyar (istixana) | tor gənəsi | çiçəklənməden sonra hər yarpaqda orta hesabla, 5-6 ədəd tor gənəsi müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 420 | Sapho | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 480 | q/L | 002081 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L/ha (500 L/ha işçi məhlul) | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | zərərvericinin 2%-dən çox bitkilərdə yayıldığı dövrdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 421 | Sezox | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Fenpyroximate | 50 | q/L | 002082 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 80 ml/100 L su | üzüm | hörümçək gənəsi | vegetasiya müddətində zərərvericinin iqtisadi-ziyanlı hədd nəzərə alınmaqla, satıcılarda gilələrin yetişməyə başladığı dövrdə, çiləmaların aparılması tövsiyə edilir | 10/2 | 7(3) |
| 422 | Smerch 240 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl+ Cloquintocet-mexyl(safener) | 240+60 | q/L+q/L | 002083 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Çin Xalq Respublikası | 220 mL/ha | buğda | birillik dar yarpaqlı alaq otları | vegetasiya müddətində bitkinin 2-4, alaq otunun isə 4-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 10(3) |
| 423 | Sword 240 SL | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid/Nematisid | Oxamyl | 240 | q/L | 002084 | 17.02.2022 | 17.02.2027 | Çin Xalq Respublikası | 25 L/ha (3000 L/ha işçi məhlul) | pomidor (istixana) | kök fir nematodları | darmanlamanın şitillər sahəyə köçürülməzdən əvvəl damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 424 | Amarok 565 SC | Adama Agan LTD | İsrail Dövləti | Pestisid | Herbisid | Metamitron+Quinmerac | 525+40 | q/L+q/L | 002086 | 18.02.2022 | 18.02.2027 | İsrail Dövləti | 1,5 L/ha | payızlıq taxıl | birillik ikiləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının boyunun 2-3 sm olan mərhələsi və payızlıq taxılın 1-2 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 425 | Cinder 400 CS | Adama Agan LTD | İsrail Dövləti | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 400 | q/L | 002087 | 18.02.2022 | 18.02.2027 | İsrail Dövləti | 3,5 L/ha | soğan | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otunun 3-5, soğanın isə 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 426 | Reflect 125 EC | Adama Makhteshim Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Isopyrazam | 125 | q/L | 002088 | 18.02.2022 | 18.02.2027 | İsrail Dövləti | 110 ml/100 L su | pomidor (istixana) | unlu şeh | çiçəklənməden əvvəl, tövdicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, çiçəklənməden sonra, meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başladığı dövrdə 2-ci çiləmanın aparılması tövsiyə edilir | 7-10/2 | 7(3) |
| 427 | Merpan 80 WG | Adama Makhteshim Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Captan | 80 | % | 002089 | 18.02.2022 | 18.02.2027 | İsrail Dövləti | 200 q/100 L su | pomidor (istixana) | fitoftora xəstəliyi | çiçəklənməden əvvəl, tövdicinin ilk inkişafı dövründə 1-ci, xəstəliyin kütləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra 2-ci çiləmanın aparılması tövsiyə edilir | 7-10/2 | 7(3) |
| 428 | Action MZ | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dimethomorph+Mancozeb | 9+60 | %+% | 002090 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 200 q/100 L su | üzüm | mildiu | vegetasiya dövründə məhsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 40/3 | 7(3) |
| 429 | Alpac 100 EC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | q/L | 002091 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 200 ml/100 L su<br>150 ml/100 L su | alma | alma meyvəyeyəni<br>alma güvəsi | vegetasiya dövründə məhsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1-2 | 10(4) |
| 430 | Carpaz 50 WG | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 002092 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 40 q/100 L su | alma | damgil | vegetasiya dövründə məhsul yığımına 28 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 28/2 | 7(3) |
| 431 | Defender 70 WG | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 70 | % | 002093 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 40 q/100 L su<br>40 q/100 L su | üzüm<br>alma | mildiu<br>damgil | vegetasiya dövründə məhsul yığımına 14 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3<br>30/3 | 7(3) |
| 432 | Demond EC 2.5 | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 002094 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 5 ml/100 L su<br>15 ml/100 L su | alma | alma güvəsi,<br>alma meyvəyeyəni | vegetasiya dövründə məhsul yığımına 3 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 433 | Knockdown 48 SL | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate isopropylamin duzu | 480 | q/L | 002095 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/1000 m^2 | üzüm | birillik taxıl fəsilələrinin ikiləpəli alaq otları | alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 434 | Metam Fluid | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fumiqant | Metam-sodium | 500 | q/L | 002096 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 60-125 ml/m^2<br>100 L/1000 m^2 | pomidor (istixana) | kök fir nematodları,fuzarioz soluxması və kök çürüməsi,alaq otlarının toxumları | torpağın fumiqasiyası məqsədilə 20-25 sm dərinliyinə çatacaq şəkildə damlama suyu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | -/- |
| 435 | Piricarb 50 WG | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pirimicarb | 50 | % | 002097 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 30-50 q/100 L su | alma | alma yaşıl mənanası | vegetasiya dövründə məhsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 436 | Safa Bakir 50 WP | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | 50 %-lik metallik misə ekvivalent olan mis oksixlorid | . | % | 002098 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 400-800 q/100 L su<br>300 q/100 L su (I)<br>500 q/100 L su (II) | alma, armud<br>üzüm | damgil<br>mildiu | vegetasiya dövründə məhsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2-3 | 3(1) |
| 437 | Taldex | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Molyuskosid | Metaldehyde | 4 | % | 002099 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 50 q/1 m^2<br>5-6 kq/1000 m^2 | müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri | ilbizlər | zərərvericilərə kütləvi təsir etməsi məqsədilə sahədə görüldüyü zaman ələ və ya mexaniki yolla suvarılmış torpaq səthinə səpilməsi tövsiyə olunur | -/- | 10(-) |
| 438 | Tebicur 25 WP | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 002100 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 25 q/100 L su | alma<br>armud | unlu şeh,<br>damgil | vegetasiya dövründə məhsul yığımına 21 gün qalana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 439 | Tokta Süper | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob -P-ethyl | 50 | q/L | 002101 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/1000 m^2<br>75 ml/1000 m^2<br>100 ml/1000 m^2 | soğan<br>pambıq<br>pomidor | birillik və çoxillik taxıl fəsiləsi alaqları | vegetasiya dövründə bitki hündürlüyünün 15-20 sm, alaq otlarının 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | Primite 20 WP | Safa Tarım A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Akarisid | Pyridaben | 20 | % | 002102 | 21.02.2022 | 21.02.2027 | Türkiyə Respublikası | 50-90 q/100 L su | alma | tor gənələri | mayın əvvəlindən etibarən mahsul yığımına 21 gün qalana qədər 1 yarpaqda orta hesabla 8-10 ədəd zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 30(30) |
| 441 | İMİDOR PRO, KS | Ao Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 200 | q/L | 002106 | 02.03.2022 | 02.03.2027 | Rusiya Federasiyası | 1, 0,30 L/1 ton<br>2, 16 L/1 ton<br>3, 16 L/1 ton | 1, kartof (toxumluq)<br>2, günəbaxan (toxumluq)<br>3, qarğıdalı (toxumluq)<br>4, buğda (toxumluq) | 1, kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata Say)<br>2, mafil qurdları (Elateridae)<br>3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L)<br>2, 1, mafil qurdları (Elateridae)<br>2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L)<br>3, 1, mafil qurdları (Elateridae)<br>2, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L)<br>4, 1, taxıl böcəyi ( Zabrus tenebrioides Goeze)<br>2, mafil qurdları (Elateridae)<br>3, danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L) | 1, toxumluq kartof yumrularının sapından əvvəl zərərvericilərə qarşı dərmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir<br>2, toxumların sapından əvvəl zərərvericilərə qarşı dərmanlanması üçün tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 442 | BERETTA, MD | Ao Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin+ Thiamethoxam+Bifenthrin | 30+40+60 | q/L+q/L+q/L | 002107 | 03.03.2022 | 03.03.2027 | Rusiya Federasiyası | 1, 0,55 L/ha<br>2, 0,45 L/ha<br>3, 0,35 L/ha<br>4, 0,5 L/ha | 1, pomidor (istixana)<br>2, qarğıdalı<br>3, pambıq<br>4, üzüm | 1, istixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum)<br>2, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)<br>3, pambıq sovkası (Helicoverpa armigera)<br>4, salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana) | 1,vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir<br>2, vegetasiya müddətində dənələrin ilk formalaşdığı və süd-mum yetişmə fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir<br>3, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir<br>4, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1, 0/1<br>2, 25-30/2<br>3, 20-30/2-3 | 1, 7(3)<br>2, 7(3)<br>3, 10(4)<br>4, 7(3) |
| 443 | KARAÇAR, KE | Ao Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Lambda cyhalothrin | 50 | q/L | 002108 | 03.03.2022 | 03.03.2027 | Rusiya Federasiyası | 1, 0,5 L/ha<br>2, 0,20 L/ha<br>3, 3,6 L/ha<br>4, 0,50 L/ha | 1, çiyələk (istixana)<br>2, alma<br>3, payızlıq buğda<br>4, üzüm | 1, mənənə (Aphididae)<br>2, alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella)<br>3, mənənə (Aphididae)<br>4,salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana) | 1, vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir<br>2, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir<br>3, vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir<br>4, vegetasiya müddətində hər nəsla qarşı bir dəfə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1, 0/1<br>2, 20-30/2<br>3, 0/1 | 7(3) |
| 444 | Mysteria ME | Ao Щелково Агрохим (Şelkovo Aqroxim Səhdmar Cəmiyyəti) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazol+ Piraklostrobin+Tebuconazol | 40+80+80 | q/L+q/L+q/L | 002109 | 03.03.2022 | 03.03.2027 | Rusiya Federasiyası | 1, 1,28 L/ha<br>2, 1,25 L/ha<br>3, 1,30 L/ha<br>4, 1,28 L/ha | 1, şəkər çuğunduru<br>2, üzüm<br>3, soğan | 1, serkosporioz<br>2, oidium (Uncinulla necator)<br>3, yalançı unlu şeh (Peronospora destruktor.)<br>4, yarpaq qıvrılması (Taphirina deformans) | 1, vegetasiya müddətində çiçəklənədən əvvəl və sonra töradıcının ilk inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir<br>2, vegetasiya müddətində çiçəklənədən əvvəl və salxımda gilələr formalaşdıqdan sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir<br>3, vegetasiya müddətində çiçəklənədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir<br>4, vegetasiya müddətində çiçəklənədən əvvəl və meyvələrin formalaşmasından sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-30/2 | 7(3) |
| 445 | Fruitfog-P | Fomesa Fruitech, S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fumiqant | Orthophenylphenol | 25 | % | 002116 | 04.03.2022 | 04.03.2027 | İspaniya Krallığı | 120 q/200 m^3<br>300 q/500 m^3<br>600 q/1000 m^3 | tumlu,çəyirdəkli, sitrus meyvələri | göbələk, bakteriya və virus mənşəli xəstəliklər | boş saxlama kameralarında dezinfeksiya məqsədilə tüstü-qaz şəklində fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 446 | Fruitfog-PYR | Fomesa Fruitech, S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fumiqant | Pyrimethanil | 25 | % | 002118 | 04.03.2022 | 04.03.2027 | İspaniya Krallığı | 70 m^3 arəziyə/<br>24 q/1 ton meyvə | tumlu meyvələr (alma) | mavi çürümə, boz çürümə | yığımdan sonra saxlama kamerasında olan mahsulları göbələk xəstəliklərindən qorumaq üçün 1 gün tüstüsü ilə fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 447 | Alfoseil 80 WP | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-Al | 80 | % | 002129 | 05.03.2022 | 05.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0-1,25 kq/ha<br>0,8-1,0 kq/ha | pomidor<br>xiyar, vemiş | fitoftora<br>yalançı unlu şeh | vegetasiya marhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21(2) | 7(3) |
| 448 | Ally 80 WP | Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-al | 80 | % | 002133 | 09.03.2022 | 09.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 4,0 kq/ha<br>(1000 L su (0,4%) işçi məhlulu) | armud | meyvə ağaclarının yanığı | yarpaqların,zoğ və meyvələrin formalaşma marhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 28/2 | 7(3) |
| 449 | Dagro Pollo | Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | q/L | 002134 | 09.03.2022 | 09.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 350 mL/ha<br>(1000 L su (0,035%) işçi məhlulu) | alma | alma meyvəyeyəni | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 450 | Dagrozoom | Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş | Türkiye Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | q/L | 002135 | 09.03.2022 | 09.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 250 q/ha<br>(1000 L su (0,025%) işçi məhlulu) | alma | qırmızı meyvə gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə olunduğu zaman çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2-3 | 7(3) |
| 451 | Fluxia | Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | q/L | 002136 | 09.03.2022 | 09.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 500 mL/ha<br>(1000 L su (0,05%) işçi məhlulu) | alma | unlu şeh | vegetasiya müddətində xəstəliyə yoluxmanın müşahidə edildiyi vaxtdan başlayaraq çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/3 | 7(3) |
| 452 | Portico | Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Imazamox | 40 | q/L | 002137 | 09.03.2022 | 09.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/1000 m^2/ 50 L su<br>(məsarif norması) | günəbaxan | dar və geniş yarpaqlı alaq otları | vegetasiya ərzində alaq otlarının ilkin inkişaf marhələsində (2-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 453 | Sitilo | Deva Agro Kimya Tarım San. Ve Tic. A.Ş | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 480 | q/L | 002138 | 09.03.2022 | 09.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 20 ml/1000 m^2/ 100 L su | çiyələk | çiçək tripsi | zərərverici müşahidə olunduğu dövrdə yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2-3 | 7(3) |
| 454 | Morpheus 240 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spirodiclofen | 240 | q/L | 002139 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | üzüm | iki nöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində bitkidə zərərverici görüldükdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 14 gün olmalıdır, | 15/1-2 | 7(3) |
| 455 | Matrites | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cloquintocet mexyl (safener)+ Pinoxaden | 20+45 | q/L+q/L | 002140 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,95 L/ha | buğda | birillik dar yarpaqlı alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 3(3) |
| 456 | Massmethrin | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 002141 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,35 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 457 | Juke 36 SL | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Hymexazol | 360 | q/L | 002142 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,65 ml/1000 L suya | pomidor | kök çürüməsi | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 3(3) |
| 458 | Malcara 76 WG | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ziram | 76 | % | 002143 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 kq/1000 L suya | şaftalı | yarpaq qıvrılması | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 459 | Hestivas Ester 48 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | İsooctyl Ester | 480 | q/L | 002144 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,75 L/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (4-6 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 15(15) |
| 460 | Heraclia 240 OD | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 240 | q/L | 002145 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/1000 L suya | armud | armud bağacığı | vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 461 | Gift 48 SL | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Boy Tanzimleyici | Ethephon | 480 | q/L | 002146 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,2 L/ha | pomidor | - | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 3(2) |
| 462 | Fleksür 50 EW | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | triadimenol | 50 | q/L | 002147 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | üzüm | oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 21 gün olmalıdır | 10-15/4 | 7(3) |
| 463 | Façeta OD | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin+Thiacloprid | 20+150 | q/L+q/L | 002148 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | alma | mənənə | vegetasiya müddətində çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 464 | Erplant 100 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | q/L | 002149 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 250 qr/ha<br>(1 ton suya) | üzüm | oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. Son dərmanlama ilə məhsul yığımı arasında 21 gün olmalıdır | 15/4 | 7(3) |
| 465 | Comiser 50 WP | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil | 50 | % | 002150 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,6 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10-15/3-4 | 7(3) |
| 466 | Chita 500 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 500 | q/L | 002151 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,85 L/ha | alma | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 467 | Cambaz MZ | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dimethomorph+Mancozeb | 9+60 | %+% | 002152 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10-15/3-4 | 7(3) |
| 468 | Burjuva | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil+Famoxadone | 30+22.5 | %+% | 002153 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,4 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10-15/3-4 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469 | Anecdot EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Buprofezin+Lambda Cyhalothrin | 100+20 | q/L+q/L | 002154 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,6 L/ha | pambıq | manənə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 10(4) |
| 470 | Zenitomp 72 WP | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 64+8 | %+% | 002155 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,6 kq/1000 L suya | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 471 | Tycoon 50 WP | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil+Mancozeb | 5+45 | %+% | 002156 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,2 kq/1000 L su | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 472 | Themis | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiye Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | q/L | 002157 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/1000 L suya | alma | qırmızı meyvə gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-30/2 | 7(3) |
| 473 | Sunic 20 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Nematosid | Ethoprophos | 200 | q/L | 002158 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 52,0 L/ha | pomidor (istixana) | kök fır nematodu | şitilləri sahəyə köçürməzdən əvvəl darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 474 | Story 250 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazol | 250 | q/L | 002159 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,35 L/ha | şəkər çuğunduru | serkosporioz | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 475 | Senario 400 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Nematosid | Fenamiphos | 400 | q/L | 002160 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 27,0 L/ha | pomidor | kök fr nematodu | şitilləri sahəyə köçürməzdən əvvəl darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 15(15) |
| 476 | Screen 600 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Aclonifen | 600 | q/L | 002161 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,2 L/ha | günəbaxan | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 3(3) |
| 477 | Poseidon 80 WP | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl -Al | 80 | % | 002162 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,6 kq/1000 L suya | soğan | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 478 | Sunplus 350 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | q/L | 002163 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 479 | Paradise 5 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | q/L | 002164 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/1000 L suya | pambıq | qırmızı hörümçək | vegetasiya müddətində zərərverici görüldüyü vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 10(3) |
| 480 | Mozart 240 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | q/L | 002165 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,8 L/ha | soğan | birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (3-5 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 3(3) |
| 481 | Lavante 20 WP | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Pyridaben | 20 | % | 002166 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,8 kq/1000 L suya | pomidor (istixana) | tor gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildiyi vaxtdan etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 482 | Larissa WG | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyflufenamid+Triflumizole | 3.4+15 | %+% | 002167 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2 kq/1000 L suya | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 483 | Demeres SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen+Glyphosate isopropylamin tuzu | 30+360 | q/L+q/L | 002168 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 L/ha | alma | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30-35/2 | 3(3) |
| 484 | Agora 70 WS | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 70 | % | 002169 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,0 kq/ton | qarğıdalı | məftil qurdları, danadiş | sapından önce zərərvericilərə qarşı toxumların darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 485 | Zor-Bey 035 FS | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil+Metalaxyl-M | 25+10 | q/L+q/L | 002170 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/1 ton toxum | qarğıdalı | kök çürüməsi | sapın öncəsi toxumun darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 486 | Westgibb 20 SL | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Gibberellic acid | 20 | q/L | 002171 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,75 L/ha | alma | - | vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-30/2 | 3(3) |
| 487 | Tavanna 100 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | q/L | 002172 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,6 L/ha | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25-30/2-3 | 15(15) |
| 488 | Nervater | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 72 | % | 002173 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,7 kq/1000 L suya | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 489 | Chevita 30 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | q/L | 002174 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,3 L/1000 L suya | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 490 | Snotra 240 EC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | q/L | 002175 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 L/ha | alma | birillik dar və geniş yarpaqlı alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (2-4 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30-35/2 | 3(3) |
| 491 | Private 250 EC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | q/L | 002176 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,4 L/ha | şəkər çuğunduru | serkosporioz | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 492 | Offside 240 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Metaflumizone | 240 | q/L | 002177 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | pomidor (istixana) | pomidor bağımlayıcı güvəsi | vegetasiya müddətində çiçəkləmədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 3(3) |
| 493 | Sunviso WG | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil+Metiram | 4.8+57 | %+% | 002178 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,3 kq/1000 L suya | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 494 | Vechtor WG | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid+Pyraclostrobin | 26.7+6.7 | %+% | 002179 | 10.03.2022 | 10.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,7 L/1000 L suya | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində xəstəlik törədicisinin ilk inkişaf dövründən etibarən çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 495 | Hekplan 20 SP | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 002180 | 11.03.2022 | 11.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,06 kq/ha<br>0,1 kq/ha | kartof<br>pambıq | kolorado kartof böcəyi<br>mananələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 3(3) |
| 496 | Hektaş Bordo 20 WP | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordo qatışığı (20% metallik misə ekvivalent) | 740 | q/kq | 002181 | 11.03.2022 | 11.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 15 kq/ha | alma<br>şaftalı | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 497 | Dalton 5 SG | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectinc Benzoate | 5 | % | 002182 | 11.03.2022 | 11.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,35 kq/ha<br>0,3 kq/ha | pomidor<br>üzüm | pambıq sovkası<br>salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 498 | Reclame 330 EC | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | q/L | 002183 | 11.03.2022 | 11.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,2 kq/ha | soğan | birillik ikiləpəli alaqlar | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında (1-2 yarpaq) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 499 | Fire 48 SL | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate isopropylamine tuzu | 480 | q/L | 002184 | 11.03.2022 | 11.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 3 L/ha | meyvə bağları | birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin və aktiv inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 500 | Masscaptan 50 WP | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 002185 | 11.03.2022 | 11.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kq/ha | alma,<br>armud | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 501 | Mass Bakır 50 WP | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik misə ekvivalent mis oksixlorid | 50 | % | 002186 | 11.03.2022 | 11.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 4,0-8,0 kq/ha | alma | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 502 | Masstthiram | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiram | 80 | % | 002188 | 11.03.2022 | 11.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,2 kq/100 kq toxum | soğan | sürmə | sapından əvvəl toxumların darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 503 | Koropik 240 EC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl+Cloquintocent- mexyl (Safener) | 240+60 | q/L+q/L | 002189 | 11.03.2022 | 11.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | taxıllar | yabanı vələmir | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 504 | Fonis 350 SC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 350 | q/L | 002190 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 505 | Nolon 25 WP | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 002191 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 550 qr/1000 L suya | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 506 | Casoria 69 WP | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dimethomorph+Mancozeb | 9+60 | %+% | 002192 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,2 lt/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | 1-ci çiləmə törədicinin ilk inkişafı dövründə, çiçəkləmədən əvvəl, 2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin kütləvi inkişafı dövründə meyvələrin formalaşmasından sonra olmaqla çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20(3) | 7(3) |
| 507 | Abazole Sc | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole+ Abamectin | 104+52 | q/L+q/L | 002193 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | alma | qırmızı meyvə gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/2 | 7(3) |
| 508 | Rimil 72 Wp | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 64+8 | %+% | 002194 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/3 | 7(3) |
| 509 | Onstomp 450 Cs | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 450 | q/L | 002195 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,5 L/ha | günəbaxan | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otunun inkişaf mərhələsində (6-8 sm) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 510 | Onfoset 80 Wp | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-AL | 80 | % | 002196 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 160 qr/100 L suya | soğan | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 511 | Oncozeb M-45 | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 002197 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 260 q/100 L suya | alma | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 512 | Oncara 350 FS | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 350 | q/L | 002198 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/1 ton | toxumluq kartof | kolorado kartof böcəyi, məftil qurdları, danadişi | toxumluq kartof yumrularını zərərvericilərdən qorumaq üçün əkin öncəsi darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 513 | Oncara 240 SC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 240 | q/L | 002199 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 514 | Onphon 72 SL | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Ethephon | 720 | q/L | 002200 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,2 L/ha | pambıq | - | vegetasiya müddətində qozaların açılmasını sürətləndirmək məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 10(4) |
| 515 | Edor 240 SC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spirodiclofen | 240 | q/L | 002201 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,28 L/1000 L suya | üzüm | tor gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25-30/2 | 7(3) |
| 516 | Detrin 2.5 EC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 002202 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25-30/2-3 | 7(3) |
| 517 | Decars Ultra SC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Epoxiconazole+Thiophanate methyl | 187+310 | q/L+q/L | 002203 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/ha | şəkər çuğunduru | serkosporioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 518 | Oncasorty 5 EC | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | q/L | 002204 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | pambıq | tor gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 10(4) |
| 519 | Helim Pellet | Oncropscience Kim. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Molyuskosid | Metaldehyde | 6 | % | 002205 | 15.03.2022 | 15.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 15,0 kq/ha | pomidor (istixana) | ilbizlər | vegetasiya müddətində carga aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiq edilməsi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 520 | Hektaş Spica | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiye Respublikası | Pestisid | Herbisid | Propyzamide | 400 | q/L | 002206 | 17.03.2022 | 17.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/1000 m^2 | yem çuğunduru | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25-30/1-2 | 7(3) |
| 521 | Nimrod | Adama Makhteshim Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Bupirimate | 250 | q/L | 002207 | 17.03.2022 | 17.03.2027 | İsrail Dövləti | 40 ml/100 L su | şaftalı | unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/2 | 14(7) |
| 522 | Alumex WG | Mac Gmbh Agricultural Products | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | fosetyl aliminium | 800 | q/kq | 002242 | 28.03.2022 | 28.03.2027 | Almaniya Federativ Respublikası | 2,5 kq/ha<br>2000-4000 L/ha (işçi məhlulu) | üzüm | oidium | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-30/2-3 | 7(3) |
| 523 | Capmex 80 WG | Mac Gmbh Agricultural Products | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 800 | q/kq | 002243 | 28.03.2022 | 28.03.2027 | Almaniya Federativ Respublikası | 3,5 kq/ha<br>2000-4000 L/ha (işçi məhlulu) | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-30/4-7 | 7(3) |
| 524 | Emamex 50 SG | Mac Gmbh Agricultural Products | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 50 | q/kq | 002244 | 28.03.2022 | 28.03.2027 | Almaniya Federativ Respublikası | 0,4 kq/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3-4 | 7(3) |
| 525 | Aceplan | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiye Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 002245 | 28.03.2022 | 28.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,09 kq/ha | kartof | kolorado kartof böcəyi | vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 526 | Pilercil | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiye Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kükürd | 80 | % | 002246 | 28.03.2022 | 28.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 4,0 kq/1000 L su | üzüm | oidium | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 1/4 | 4(1) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Tarkor Super | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-p-ethyl | 50 | q/L | 002247 | 28.03.2022 | 28.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | soğan | birillik taxıl fəsilələrinə aid olan alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 528 | Kormix | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Mepiquat chloride | 50 | q/L | 002248 | 29.03.2022 | 29.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | pambıq | - | vegetasiya müddətində bitkinin inkişafını tənzimləmək məqsədilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 529 | Turop Ultra | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Defoliant | Diuron+Thidiazuron | 59.88+119.75 | q/L+q/L | 002249 | 29.03.2022 | 29.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,7 L/ha | pambıq | - | vegetasiya müddətində bitkinin yarpaqlarını tökmək məqsədilə çiləmə (reqlu) ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 530 | Chavus 240 SC | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 240 | q/L | 002257 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 110 ml/1000 m^2 sahəyə | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | bitkinin vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 531 | Genagro Sygon 10 SC | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | q/L | 002258 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,4 L/1000 L su | pomidor (istixana) | qırmızı tor gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/2 | 7(3) |
| 532 | Canaria 25 EC | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxadiazon | 250 | q/L | 002259 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 420 ml/1000 m^2 | qərənfil (istixana) | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 15(7) |
| 533 | Isabella 20 SP | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamaprid | 20 | % | 002260 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 35 q/100 L suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 534 | Lumpen 10 EC | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | q/L | 002261 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 55 ml/100 L suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 535 | Taczoate SC 240 | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spirodiclofen | 240 | q/L | 002262 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 30 ml/100 L su | alma | qırmızı meyvə gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25-30/2 | 7(3) |
| 536 | Genagro Topstar 240 Ec | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl+Cloquintocet mexyl (safener) | 240+60 | q/L+q/L | 002263 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | buğda | birillik ikilapalı alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 537 | Yankee Wg | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid+Pyraclostrobin | 26.7+6.7 | %+% | 002264 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,6 kq/1000 L suya | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 538 | Genagro Dober 40 EC | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Dimethoate | 400 | q/L | 002265 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 110 ml/100 L suya | alma | manənə | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 15(7) |
| 539 | Bandido 240 OD | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Tiacloprid | 240 | q/L | 002266 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 45 ml/100 L suya | alma | manənə | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 540 | Baronex 70 WG | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 70 | % | 002267 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 45 q/100 L suya | alma | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 541 | Genagro Tictang | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D EHE+Florasulam | 452.42+6.25 | q/L+q/L | 002268 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,75 L/ha | buğda | birillik ikilapalı alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 542 | Genagro Biocure 20 WP | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 002269 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,55 kq/1000 L suya | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 543 | Genagro Zapata | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 002270 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,35 kq/1000 L suya | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 544 | Casirga 035 FS | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxanil+Metalaxyl-M | 25+10 | q/L+q/L | 002271 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 12 ml/m^2 (4 L suya) | pomidor | kök çürüməsi | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 545 | Bioherb 200 EC | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cyhalofop-Butyl | 200 | q/L | 002272 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,6 L/ha | çəltik | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 546 | Robot Pelet | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Molyuskosid | meytaldehyde | 6 | % | 002273 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,5 kq/1000 m^2 | pomidor (istixana) | çılpaq ilbizlər | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə cərgə aralarına və bitkilərin ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 547 | Agronet 150 SC | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | q/L | 002274 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 250 mL/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2-3 | 7(3) |
| 548 | Genagro Bordo 20 WP | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik Bakıra Əsaslanmayan Bordo Bulaması | 20 | % | 002276 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 5 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2-3 | 7(3) |
| 549 | Genagro Patrol 62.5 WG | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxanil+Cyprodinil | 250+375 | q/kq+q/kq | 002277 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,5 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3-4 | 7(3) |
| 550 | Genagro Romell 80 WDG | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kükürd | 80 | % | 002278 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Hindistan Respublikası | 4 kq/ha | üzüm | oidium | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 7-10/2-3 | 7(3) |
| 551 | Genagro Cassandra WG | Genagro Tarim Mümessillik Çevre Sağliği San. Ve Tic. Ltd Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metiram+Pyraclostrobin | 55+5 | %+% | 002279 | 31.03.2022 | 31.03.2027 | Türkiyə Respublikası | 2 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/3-4 | 7(3) |
| 552 | Malathion 65 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 002288 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,5 | alma | yasticalar, mənənalər | vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 10(4) |
| 553 | Delphia SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid+Mineral yağ Cas № 74869-22-0 | 4+704 | q/L+q/L | 002289 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 25,0 L/ha | alma | zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı | ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dən yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20(2) | 7(3) |
| 554 | Sim Bakir 50 WP | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik bakıra əsaslanan bakroksiklorid | 50 | % | 002290 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 6,0 kq/ha | alma | damğıl | vegetasiya mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/4 | 7(3) |
| 555 | Chacha SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Clofentezine | 500 | q/L | 002291 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | üzüm | iki nöqtəli qırmızı hörümçək | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/2 | 7(3) |
| 556 | Miralav 100 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat | 100 | q/L | 002292 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1 L/1000 L suya | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/2 | 7(3) |
| 557 | Cutoff 50 WG | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Trifloxystrobin | 50 | % | 002293 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,1 kq/ha | üzüm | oidium | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 7(3) |
| 558 | Erfruit 50 WP | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil+Mancozeb | 5+45 | %+% | 002294 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 559 | Davilex 24 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 240 | q/L | 002295 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2 L/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 560 | Amorium 50 WG | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 002296 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,45 kq/1000 L suya | alma | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 28/2 | 7(3) |
| 561 | Daldio 50 EW | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob -P-ethyl | 50 | q/L | 002297 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,1 L/ha | soğan | birillik dar və enli yarpaqlı alaq otları | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 5(3) |
| 562 | Sunultra 400 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Buprofezin | 400 | q/L | 002298 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 3(3) |
| 563 | Yakuza 20 WP | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Tebufenpyrad | 20 | % | 002299 | 07.04.2022 | 07.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,8 kq/1000 L suya | pomidor (istixana) | qırmızı tor gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 3(3) |
| 564 | Bordo Aria 20 % SC | Ariashimi | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ca(OH)2+CuSO4 | 8+20 | %+% | 002300 | 08.04.2022 | 08.04.2027 | İran İslam Respublikası | 7-13 kq/1000 L su | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2-4 | 7(3) |
| 565 | Mac Miral 10 % EC | Melli Agrochemical Company PJS | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 10 | % | 002301 | 08.04.2022 | 08.04.2027 | İran İslam Respublikası | 0,75 L/ha | pambıq | mənənalər | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/2-3 | 10(4) |
| 566 | Oil Exir 90 % EC | Agroxir CO | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Mineral Oil (CasNr 8020-83-5) | 90 | % | 002302 | 08.04.2022 | 08.04.2027 | İran İslam Respublikası | 1,5 L/100 L suya | bibər | qırmızı tor gənəsi | vegetasiya müddətində zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 567 | Plato S80 | Agroxir CO | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Sulfur | 80 | % | 002303 | 08.04.2022 | 08.04.2027 | İran İslam Respublikası | 2 L/ha | xiyar | unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 568 | Exir Dox 75 % WP | Agroxir CO | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Oxychloride | 75 | % | 002304 | 08.04.2022 | 08.04.2027 | İran İslam Respublikası | 2 kq/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10-15/2 | 7(3) |
| 569 | Piler Con | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 002321 | 11.04.2022 | 11.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,24 L/ha | qarpız | antraknoz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 28/2 | 7(3) |
| 570 | Simround 48 SL | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate isopropylamin | 480 | q/L | 002322 | 11.04.2022 | 11.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 L/ha | üzüm | birillik taxıl fəsilləsi və ikilapalı alaqları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 571 | Taramectin 1,8 EC | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 002323 | 11.04.2022 | 11.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | pomidor | gənələr | vegetasiya müddətində zərərverici aşkar edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 7/2 | 7(3) |
| 572 | Dagro Fins | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D Acid (amin duzu) | 500 | q/L | 002324 | 12.04.2022 | 12.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 2 L/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 573 | Nicoleson | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | q/L | 002325 | 12.04.2022 | 12.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,25 L/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 574 | Dagro Stang | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4 D EHE+Florasulam | 452.42+6.25 | q/L+q/L | 002326 | 12.04.2022 | 12.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,7 L/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə (reqlu) ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 575 | Desolon | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione+Nicosulfuron | 75+30 | q/L+ q/L | 002327 | 12.04.2022 | 12.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 2 L/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 576 | Mirandes | Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | S-metolachlor+Terbuthylazine | 312.5+187.5 | q/L+q/L | 002328 | 12.04.2022 | 12.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 5 L/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının çıxış öncəsi çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 577 | Bifenstar 100 EC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Bifenthrin | 100 | q/L | 002335 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2-0,5 L/ha | alma | meyvəyeyən | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 578 | Korualpha 200 EC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Esfenvalerate | 200 | q/L | 002336 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,05 L/ha | alma | meyvəyeyən | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 579 | Pesos 100 EC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | q/L | 002337 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | üzüm | oidium | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 580 | Komore 300 EC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole+ Propiconazole | 150+150 | q/L+q/L | 002338 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | şəkər çuğunduru | unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 57/1-2 | 7(3) |
| 581 | Coperhid 50 WP | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik misa ekvivalent mis birləşmə | 50 | % | 002339 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,5 L/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 40/2 | 7(3) |
| 582 | Gothic 100 SL | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 100 | q/L | 002340 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | şəkər çuğunduru | birillik və çoxillik alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 583 | Kormilin 480 SC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 480 | q/L | 002341 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,22 L/ha | alma, armud | meyvəyeyən | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 584 | Nemaphos EC 400 | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Nematosid | Fenamiphos | 400 | q/L | 002342 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 25 L/ha | pomidor | kök fr nematodları | əkinqabağı torpağa damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 585 | Magmatil 500 EC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | İmazalil | 500 | q/L | 002343 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | üzüm | boz çürümə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 586 | Tebuji 060 FS | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 60 | q/L | 002344 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 kq toxuma | buğda, arpa | sürmə | toxumun əkinqabağı darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 587 | Gladius 10% SC | Nippon Kayaku CO., LTD | Yaponiya | Pestisid | İnsektisid | Flometoquin | 10 | % | 002345 | 13.04.2022 | 12.04.2026 | Yaponiya | 0,75 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 588 | Waterwax-2L | Fomesa Fruitech, S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | İmazalil | 0.2 | % | 002353 | 14.04.2022 | 14.04.2027 | İspaniya Krallığı | 1,0 L/ton | sitrus meyvələri | mavi çürümə, boz çürümə | yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulların çürüməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə püskürtmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 60/1 | 7(3) |
| 589 | Fruitfog-Cipc | Fomesa Fruitech, S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fumiqant | Chlorpropham | 25 | % | 002354 | 14.04.2022 | 14.04.2027 | İspaniya Krallığı | 60 q/ton | kartof | kartof yumrularının cücərməsinə | yığımdan sonra saxlama kamerasında olan məhsulların cücərməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə fumiqasiya etməklə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 590 | Alfatoks 100 EC | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermetrin | 100 | q/L | 002355 | 13.04.2022 | 13.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,22 L/ha | şəkər çuğunduru | çuğundur birəsi | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1 | 10(4) |
| 591 | Camuka SC | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 150 | q/L | 002356 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L/ha | pomidor | pambıq yarpaq qurdu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1 | 10(4) |
| 592 | Dualcom | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-P-ethyl | 50 | q/L | 002357 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | şəkər çuğunduru | birillik və çoxillik taxıl fəsilasi alaqları | alaq otunun 2-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 593 | İlma Captan WP | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 002358 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/3 | 7(3) |
| 594 | Lamd-tl T 5 EC | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lyambda cyhalothrin | 50 | q/L | 002360 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,1 L/ha | kələm | güvə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1 | 14(7) |
| 595 | Piler Ben | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik Bakıra Əsaslanmayan Bordo Bulaması | 20 | % | 002361 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,0-8,0 kq/ha/1000 l su | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 3/1 | 3(1) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | Pilermite | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Akarisid | Pyridaben | 20 | % | 002362 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,45 kq/ha/1000 l su | pomidor | qanəvər | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 10(4) |
| 597 | Pil-Ern | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 5 | % | 002363 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 kq/ha/1000 l su | xiyar | pambıq yarpaq qurdu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 598 | Piler Tos SC | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | q/L | 002364 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 125 mL/ha/100 l su | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 3/1 | 7(3) |
| 599 | Pirlana | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 002365 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | pambıq | manənə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 15(7) |
| 600 | Sim Siper 25 EC | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 002366 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | qarğıdalı | pambıq soxsası | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/3 | 7(3) |
| 601 | Simdonil 72 WP | Pileryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 64+8 | %+% | 002367 | 15.04.2022 | 15.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,5 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/3 | 7(3) |
| 602 | Captan'H | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 002368 | 18.04.2022 | 18.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kq/ha<br>3,0 kq/ha | alma, armud<br>üzüm | damğıl<br>mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/3-4 | 7(3) |
| 603 | Fragman 50 WG | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 002369 | 18.04.2022 | 18.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,4 kq/ha | alma | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/4 | 7(3) |
| 604 | Heksamyl SL | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Nematosid | Oxamyl | 240 | q/L | 002370 | 18.04.2022 | 18.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 30 L/ha | tərəvəz akinləri | kök fir nematodları | əkindən 1-3 gün əvvəl çiləmə üsulu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə edilir | 3/(1) | -(-) |
| 605 | Torpedo EC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 002371 | 18.04.2022 | 18.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | sitrus<br>pomidor | sitrus ağqanadlısı<br>qanəvər | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20(2) | 7(3) |
| 606 | Hektafermin SL | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4 D Asid | 500 | q/L | 002373 | 18.04.2022 | 18.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 2 L/ha | qarğıdalı | birillik ikiləpəli alaqlar | madəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/(1) | 14(5) |
| 607 | Artiste 240 SC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 240 | q/L | 002374 | 21.04.2022 | 21.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,15 L/ha | alma | manənələr | vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20(2) | 7(3) |
| 608 | Comprador Oil 004 | Safa Tarım A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid+mineral yağ | 4+704 | q/L+q/L | 002375 | 21.04.2022 | 21.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 25 L/ha | alma,<br>gilas,<br>şaftalı | zərərvericilərin qışlayan fazalarına qarşı | ilkin yazda havanın temperaturu +4 C-dən yuxarı olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/(1) | 7(3) |
| 609 | Gold Malathion 65 EC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 002376 | 21.04.2022 | 21.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,3 L/ha | üzüm | manənələr,<br>qanəvər,<br>yaşıcalar | vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20(2) | 7(3) |
| 610 | Hypnose 05 SG | Safa Tarım A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 002377 | 21.04.2022 | 21.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 kq/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20(2) | 7(3) |
| 611 | Mosetam 20 SP | Safa Tarım A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 002378 | 21.04.2022 | 21.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,06 kq/ha<br>0,4 kq/ha | kartof<br>pambıq | kolorado kartof böcəyi<br>manənələr | vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/(2)<br>20/(2) | 7(3) |
| 612 | Safa Captan 50 WP | Safa Tarım A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 002379 | 21.04.2022 | 21.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,5-3,0 kq/ha<br>1,5-2,0<br>2,0-2,5 kq/ha | üzüm<br>kartof<br>tərəvəz | mildiu,<br>fitoftora<br>şitilərdə kök çürüməsi,<br>fuzarioz | vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21(3) | 7(3) |
| 613 | Ziraflo WG | Safa Tarım A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ziram | 76 | % | 002380 | 21.04.2022 | 21.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2-0,25 kq/ha | alma,<br>şaftalı | yarpaq qıvrılması | vegetasiyanın sonu və tumurcuqlar şişənə qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 90(2) | 7(3) |
| 614 | Acetamplan 20 SP | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 002387 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 kq/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 615 | Asmition EC | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 002388 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | üzüm | çanaqlı yastıca | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/3 | 7(3) |
| 616 | Clash 10 SC | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | q/L | 002389 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | üzüm | çanaqlı yastıca | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/3 | 7(3) |
| 617 | Colt 20 EC | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Esfenvalerate | 200 | q/L | 002390 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 75 mL/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 618 | Frs Deham | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 002391 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-30/3-4 | 7(3) |
| 619 | Frs-Mancoz 80 WP | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 002392 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,0 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25-30/3-4 | 7(3) |
| 620 | Hula 25 EC | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 002393 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2 L/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 621 | Matrix 5 EC | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | q/L | 002394 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L/ha | üzüm | fir gənəciyi | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 622 | Persephone 100 EC | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | q/L | 002395 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,4 L/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 623 | Pyrecin 2.5 EC | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 002396 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 50 mL/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 624 | Samand 5 SG | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 002397 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 kq/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 625 | Setlick 50 WP | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pirimicarb | 50 | % | 002398 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,35 kq/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 626 | Zigzaver 150 SC | Feras Kimya Zirai İlaçlar Tarım ve Hayvancılık Nakliye San. İç ve Dış Tic. LTD STİ | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | q/L | 002399 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 627 | Hektaş Maestro 5 EC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 50 | q/L | 002400 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1, 0/4 L/ha<br>2, 1/5 L/ha | 1, kartof<br>2, pambıq | 1, kolorado kartof böcəyi<br>2, manənə, qanə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 10(4) |
| 628 | Formula Super 5 EC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob -P-ethyl | 50 | q/L | 002401 | 29.04.2022 | 29.04.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | alma | alaq otları | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 629 | Acidas | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Dicamba acid+2,4-D acid | 120+344 | q/L+q/L | 002403 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,3 L/ha | qarğıdalı | birillik ikiləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 630 | Dilex-Cyp | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole+cyprodinazole | 30+6.25 | q/L+q/L | 002404 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 5 kq/1 ton toxuma | pomidor | fitoftora | sapından əvvəl toxumlarla təlhisi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 631 | Diflux | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 480 | q/L | 002405 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 320 qr/ha | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 632 | Emery | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | EMAMECTIN | 5 | % | 002406 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,30 kq/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 633 | Ester-D | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D Acid+Dicamba acid | 552+60 | q/L+q/L | 002407 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,80 L/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 634 | Ester-F | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4 D 2- Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam | 425+6.25 | q/L+q/L | 002408 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,30 L/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 635 | Fenox | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-P ethyl+Antidot-Cloquintocet-Mexyl | 69+34.5 | q/L+q/L | 002410 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,32 L/ha | soya | alaq otları | alaq olunun boyunun 10-12 sm fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 636 | Flu-Teb | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazol+Clothianidin+ Flutriafol | 337+73+117 | q/L+q/L+q/L | 002411 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,3 L/1 ton | pomidor | fitoftora | sapından əvvəl toxumların darmanlanması tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 637 | Glyphos | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 480 | q/L | 002412 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 3,0 kq/ha | pomidor | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 638 | Imidac-2 | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | İnsektisid | İmidacloprid | 200 | q/L | 002413 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,30 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | çiçəklənədən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 639 | Imidac-6 | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | İnsektisid | İmidacloprid | 600 | q/L | 002414 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 75 m L/ha | kələm | kələm ağ kəpənəyi | vegetasiya müddətində bitkilərin baş bağlaması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 640 | Imidaz | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | İmidacloprid+Thiabendazole | 280+80 | q/L+q/L | 002415 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 2,5 kq/ton | pomidor toxumu | kök çürüməsi | sapından əvvəl toxumlarda darmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 641 | Iz-Mox | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Imazamox | 40 | q/L | 002416 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,32 L/ha | soya | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 642 | King-M | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 64+8 | %+% | 002417 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 220 qr/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | çiçəklənədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 643 | King | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 002418 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 3,8 kq/ha | pomidor (istixana) | boz çürümə | çiçəklənədən önce və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 644 | Kres | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-methyl | 500 | q/kq | 002419 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 55 qr/100 L su | pomidor (istixana) | unlu şeh | çiçəklənədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 645 | M-Buzin SC | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 600 | q/L | 002420 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,32 L/ha | soya | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 646 | Mix-Clod | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl+ Tribenuron -Methyl+ Cloquintocet mexyl+ Florasulam | 150+48+37.5 +16 | q/kq+q/kq+ q/L+ q/kq | 002423 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,40 L/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 647 | Mix-Fen | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl+ Fenoxaprop-P ethyl+ Cloquintocet mexyl | 90+140+60 | q/L+q/L+q/L | 002424 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,80 L/ha | buğda | birillik ikiləpəli alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 648 | Oxyflor | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | q/L | 002425 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 8 L/ha | soğan | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 649 | Pro-Teb | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole+Propiconazole | 200+200 | q/L+q/L | 002426 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 50 mL/ha | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 650 | Pyr-Teb | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazol+Pyraciostrobin | 400+97 | q/L+q/L | 002427 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,4 L/ha | pomidor (istixana) | unlu şeh | çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 651 | Quizala | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob -P-ethyl | 125 | q/L | 002428 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,85 L/ha | alma | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 652 | Spir-Teb | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole+Spiroxamine+ Tioxifenevil | 167+250+43 | q/L+q/L+q/L | 002429 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,45 L/ha | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 653 | Sulf Plus | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Rimsulfuron+Tifensulfuron-methyl | 500+250 | q/kq+q/kq | 002430 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 110 qr/ha | pomidor | alaq otları | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 654 | Sulphur Wdg | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Sulphur | 800 | q/kq | 002431 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 550 qr/ha | xiyar | unlu şeh | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 655 | Tebuc | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 120 | q/L | 002432 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,95 kq/ha | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 656 | Thiomate | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate methyl | 70 | % | 002433 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 45 mL/ha | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 657 | Tiam | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 350 | q/L | 002434 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 5 L/ton | pambıq | 1,Payızlıq akin sovkası<br>2,Mahlı qurdları<br>3,Donuzlıq | sapından önce toxumların darmanlanması tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 658 | Tit | Ningbo Generic Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole+İmazalil+ Thiabendazole | 60+40+60 | q/L+q/L+q/L | 002435 | 04.05.2022 | 04.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 75 qr/100 l su | pomidor | boz çürümə | vegetasiya müddətində alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 659 | Echo 5 EC | Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob -P-ethyl | 50 | q/L | 002440 | 05.05.2022 | 05.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha<br>1,0 L/ha | soğan<br>pomidor | birillik ikiləpəli alaqlar | madəni bitki 15-20 sm boyunda, alaq olunun isə 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 660 | Massfiks | Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Boy Tanzimləyici | Mepiquat chloride | 50 | q/L | 002441 | 05.05.2022 | 05.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 35,0 ml/100 m^2 sahəyə | pambıq | bitkinin inkişafını tənzimlayir | çiçəklənmə mərhələsinin sonunda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | -(-) |
| 661 | Massmectin | Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 002442 | 05.05.2022 | 05.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | pomidor | qanəvər | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | Best Alfa 100 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | q/L | 002443 | 06.05.2022 | 06.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2 L/ha | alma | meyvəyeyənlər | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir | 30/2 | 15(7) |
| 663 | Koritus | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 002444 | 06.05.2022 | 06.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,4 kq/ha<br>0,3 kq/ha | alma<br>ərik | damğil<br>monilioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir | 25/2<br>25/2 | 7(3) |
| 664 | Mayceb M-45 | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 002445 | 06.05.2022 | 06.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,0 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyyə edilir | 30/3 | 7(3) |
| 665 | Sonround 48 SL | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate Asite ekvivalent Glyphosate isopropylamin duzu | 480 | q/L | 002446 | 06.05.2022 | 06.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 L/ha | alma | birillik taxıl fəsiləsi və ikilapəli alaqlar | alaq otlarının aktiv inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 666 | Amiral 10% EC | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxifen | 100 | q/L | 002455 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,2 L/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 667 | Bolaar 22.5% SC | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole+trademinol | 125+100 | q/L+q/L | 002456 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,45 L/ha | alma | unlu şeh | vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 668 | Excel 1.9 % | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Boy Tənzimləyici | 6-Benzylaminopurine SL | 1.9 | % | 002458 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 3,2 L/ha | alma | damğil | vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/2-3 | 3(1) |
| 669 | Factor 28 % SC | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid+Lambda Cyhalothrin | 200+80 | q/L+q/L | 002459 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,5 L/ha | alma | yaşıl mənənə | vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 670 | Fix 1 % | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Boy Tənzimləyici | 1-Naphthylacetic acid; ethyl ester | 1 | % | 002460 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,6 L/ha | alma | damğil | vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/2 | 3(1) |
| 671 | Index 15 % KC | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | q/L | 002461 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,32 L/ha | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | çiçəklənədən sonra tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 672 | Maxi Super 25% | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Paclobutrazol SC | 250 | q/L | 002462 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,2 kq/ha | alma | damğil | vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 60/2 | 3(1) |
| 673 | Praline 4 % SG | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Giberellic acid | 4 | % | 002463 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,2 kq/ha | üzüm | xoroz | vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 3(1) |
| 674 | Perimetr 55 % SC | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam + DIFENICONAZOLE | 350+200 | q/L+q/L | 002464 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,55 L/ha | üzüm | oidium | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 675 | Quadrat 247 SC | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin+ Thiamethoxam | 106+141 | q/L+q/L | 002465 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,50 L/ha | armud | armud bağacığı | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 676 | Satelit 48%SC | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 480 | q/L | 002466 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,50 L/ha | alma | alma meyvəyeyəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 677 | Storm 75% WDG | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 750 | q/kq | 002467 | 10.05.2022 | 10.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,25 kq/ha | alma | damğil | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 7(3) |
| 678 | Bingo 20 WP | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux mixture | 200 | q/kq | 002468 | 17.05.2022 | 17.05.2027 | Hindistan Respublikası | 15,0 L/ha | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 3(1) |
| 679 | Danon 700 WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 700 | q/kq | 002469 | 17.05.2022 | 17.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,7 L/ha | alma | damğil | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 680 | Elan WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 57 | q/kq | 002470 | 17.05.2022 | 17.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,3 L/ha | xiyar (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 3(1) |
| 681 | Felix WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 757 | q/kq | 002471 | 17.05.2022 | 17.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 2,2 L/ha | üzüm bağları | birillik taxıl fəsiləsi və ikilapəli alaqlar | yazda alaqların ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 682 | Duet Forte 650 WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dimethomorph+Folpet | 150+500 | q/kq+q/kq | 002472 | 17.05.2022 | 17.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 2,5 L/ha | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 3(-) |
| 683 | Concord 80 WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | captan | 800 | q/kq | 002473 | 18.05.2022 | 18.05.2027 | Hindistan Respublikası | 2,2 L/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 684 | Arbalet 75 WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 750 | q/kq | 002474 | 17.05.2022 | 17.05.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,3 L/ha | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 7(3) |
| 685 | Isit | Ecosafer MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Ca+S | 12.3+11.4 | %+% | 002493 | 19.05.2022 | 19.05.2027 | Azərbaycan Respublikası | 7 L/ha | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/2 | 7(3) |
| 686 | Tuta Absoluta Lure(Sinaq Üçün) | Mezhtrans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feromon tələ | B-Tocopherol+Mixture of(e.z.z)-3.8.11-Tetradecatrienyl acetate and(e.z)-3.8-Tetradecatrienyl acetate+digər komponentlər | 0.5+95+4.5 | %+%+% | 002497 | 19.05.2022 | 19.05.2027 | Moldova Respublikası | 3 tələ/ha | pomidor | pomidor bağımlayıcı güvəsi | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 0(0) |
| 687 | Helicoverpa Armigera Lure | Mezhtrans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feromon tələ | B--tocopherol+digər komponentlər+z-9-hexadecenal | 0.5+4.5+95 | %+%+% | 002498 | 19.05.2022 | 19.05.2027 | Moldova Respublikası | 3 tələ/ha | pomidor | pomidor sovkası | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 0(0) |
| 688 | Ips Dublicatus Lure | Mezhtrans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feromon tələ | B-Tocopherol+digər komponentlər+mixture of 2-methyl-3-buten-2-ol;Ipsdienol;E-myrcenol | 0.5+4.5+95 | %+%+% | 002499 | 19.05.2022 | 19.05.2027 | Moldova Respublikası | 4 tələ/ha | küknar | qabıqyeyən böcəklər | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin 1-ci və 2-ci nəsle qarşı və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir | 20/1-2 | 0(0) |
| 689 | Pantry Pure Moth Trap | Mezhtrans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feromon tələ | B-Tocopherol+Z9E12-14AC+ digər komponentlər | 0.5+95+4.5 | %+%+% | 002500 | 19.05.2022 | 19.05.2027 | Moldova Respublikası | 3 tələ/50 m^2 | taxıl anbarlarına | anbar odlucası | zərərli orqanizmin ilk uçuşunu müəyyən etmək və bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir | 20/1-2 | 0(0) |
| 690 | Takumi | Nihon Nohyaki Co LTD | Yaponiya | Pestisid | İnsektisid | FLUBENDIAMIDE | 20 | % | 002516 | 26.05.2022 | 27.03.2025 | Yaponiya | 15 q/100 L suya | pomidor | pomidor güvəsi | istixanada zərərverici iqtisadi zərərvemə həddinə çatdıqda preparatla 2 dəfə mübarizə aparılması mənsədə uyğundur | 17/2 | 7(3) |
| 691 | Bayomca | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | triadimenol | 250 | q/L | 002523 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.0 L/ha 1000 l su | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 3(0) |
| 692 | Bestkur 25 EG | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 250 | q/L | 002524 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L/ha 1000 L su | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 3(0) |
| 693 | Bestkur 25 WP | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 002525 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L/ha 1000 L su | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 3(0) |
| 694 | Bestmilyn | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 480 | q/L | 002526 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.32 L/ha 1000 l su | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 3(0) |
| 695 | Broader 30 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole+ Propiconazole | 150+150 | q/L+q/L | 002527 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L/ha 1000 L su | pomidor (istixana) | alternarioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 3(0) |
| 696 | Canolex 50 WP | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tolclofos methyl | 500 | q/kq | 002528 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 kq/ha 1000 l su | cəfəri (istixana) | kök çürüməsi | əkindən sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 3(0) |
| 697 | Changer | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid | 50 | % | 002529 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha 1000 L su | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 3(0) |
| 698 | Fulipas 100 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | q/L | 002530 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L/ha 1000 L su | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 699 | Karzep 50 WP | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil+Mancozeb | 5+45 | %+% | 002531 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 kq/ha 1000 l su | pomidor | erkən yarpaq yanığlığı | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 3(0) |
| 700 | Külhane Gold 24 E | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Myclobutanil | 245 | q/L | 002532 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2 L/ha | xiyar (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 3(0) |
| 701 | Nemasat 400 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Nematosid | Fenamiphos | 400 | q/L | 002533 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 25 L/ha | pomidor (istixana) | kök fir nematodları | əkin öncəsi torpağa tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 3(0) |
| 702 | Nemasat 10 G | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Nematosid | Fenamiphos | 10 | % | 002534 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 100 kq/ha | pomidor (istixana) | kök fir nematodları | əkin öncəsi torpaqda tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 703 | Rotundis | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | q/L | 002535 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | pomidor | fitoftora | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 5/2 | -(3) |
| 704 | Aktinara 240 SC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 240 | q/L | 002537 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | -(3) |
| 705 | Awacant SC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | q/L | 002538 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,42/100 L su | pomidor (istixana) | mənənələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | -(3) |
| 706 | Bestgard 75 WP | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cyromazine | 75 | % | 002539 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | -(3) |
| 707 | Borecaf | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik misa ekvivalent Bordo Bulamacı | 20 | % | 002540 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,9/100 L su | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | -(3) |
| 708 | Contier | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spirodiclofen | 240 | q/L | 002541 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,03/100 L su | xiyar (istixana) | gənələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | -(3) |
| 709 | Coremiks | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid+Kresoxim methyl | 200+100 | q/L+q/L | 002542 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,035/100 L su | pomidor (istixana) | unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | -(3) |
| 710 | Evakur | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propamocarb HCl | 722 | q/L | 002543 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,28/100 L su | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | -(3) |
| 711 | Famoso | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metiram+Pyraclostrobin | 55+5 | %+% | 002544 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,28/100 L su | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | -(3) |
| 712 | Gurador | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Trifloxystrobin | 50 | % | 002545 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2 | xiyar (istixana) | erkən yarpaq yanışlığı | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | 7(3) |
| 713 | Helga Süper | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-P-ethyl | 50 | q/L | 002547 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | soğan | birillik taxıl fəsiləsi alaqları | alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 714 | Moonmite | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Pyridaben | 20 | % | 002548 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | alma | gənələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 0(3) |
| 715 | Nimbecidine | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Azadirachtin | 0.3 | q/L | 002549 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,0 | bibər (istixana) | trips | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | 0(3) |
| 716 | Pertrak Mz | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dimethomorph+Mancozeb | 9+60 | %+% | 002550 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,5 | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | 0(3) |
| 717 | Rizoclean | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid+Pyraclostrobin | 26.7+6.7 | %+% | 002551 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,5 | pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | 0(3) |
| 718 | Veliyette | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-Al | 80 | % | 002552 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 | pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/2 | 10(4) |
| 719 | Sanomyl 90 SP | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 90 | % | 002553 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,6 L/ha<br>0,8 L/ha | üzüm<br>pomidor | qiləquruducu<br>pambıq sovkası | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3 | 7(3) |
| 720 | Scort 25 % EC | Arysta LifeScience Benelux SPRL | Belçika Krallığı | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | q/L | 002554 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Belçika Krallığı | 0,2-0,25 L/ha<br>0,2 L/ha | alma, armud<br>nar | damğil, unlu şeh<br>kələmkökü | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 721 | Sitrin 50 EC | Arysta LifeScience Benelux SPRL | Belçika Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Cypermetrin | 500 | q/L | 002555 | 27.05.2022 | 27.05.2027 | Belçika Krallığı | 0,5 L/ha<br>0,08 L/ha<br>0,1 L/ha | alma<br>kartof<br>üzüm | meyvəyeyən, yarpaqbükənlər<br>kolorado kartof böcəyi<br>yarpaqbükənlər | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 722 | Dellek Forte 240 EC | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Haloxyphop-p-Methyl | 240 | q/L | 002565 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0.8 L/ha | şəkər çuğunduru | alaq otları | Vegetasiya müddətində alaq otu 6-8 sm olduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 723 | Komutator WG | DVA Agro GmbH | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxanil, Cyprodinil | 250, 375 | q/kq, q/kq | 002566 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1.0 L/ha | üzüm | boz çürümə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 724 | Imidachloprid Aria 35 SC | Ariashimi | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidachloprid | 350 | q/L | 002567 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | İran İslam Respublikası | 0.07 L/ha | bibər | Trips | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 725 | Propiconazole Aria 25 % EC | Ariashimi | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole | 250 | q/L | 002568 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | İran İslam Respublikası | 200 mL/ha 100 L suya | pomidor (istixana) | Alternarioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 726 | Thiram Forte | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiram | 80 | % | 002571 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 100 kq-toxuma 220 qr<br>0,2 kq/ha 100 l suya | pomidor (istixana) | kök çürüməsi | əkindən öncətoxumların dərmanlanması və ya bitişdən sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | Ziram 76 WP | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ziram | 76 | % | 002572 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 220 qr/ha 100 L suya | şaftalı | yarpaq qıvrılması | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 728 | Supercozeb M 45 | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 002573 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 210 qr/ha 100 L suya | Xiyar (istixana) | Altemarioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/2 | 7(3) |
| 729 | Planet 72 WP | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb, Metalaxyl | 64, 8 | %, % | 002574 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 220 qr/ha 100 L suya | Xiyar (istixana) | Yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 730 | Dumble 400 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 002575 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1.2 L/ha | alma | yaşıl mənənə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 731 | Benuron 75 DF | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron -methyl | 75 | % | 002576 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 120 qr/ha | buğda | bir illik geniş yarpaqlı alaq otları | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 732 | Bakir Plus 50 WP | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalik bakir | 50 | % | 002577 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 520 qr/ha 100 L suya | pomidor (istixana) | Altemarioz | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/2 | 7(3) |
| 733 | Malathion 650 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Malathion | 650 | q/L | 002578 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 2.2 L/ha | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 734 | Boxer 48 SL | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA | 480 | q/L | 002579 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 3.0 L/ha | alma | alaq otları | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 735 | Aminosalt 2.4 D | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2.4 D Acid-ə barabər Dimethyl amin duzu | 500 | q/L | 002580 | 03.06.2022 | 03.06.2027 | Çin Xalq Respublikası | 2.2 L/ha | qarğıdalı | alaq otları | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 736 | Armanty 20 SL | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Gibberellic acid | 20 | q/L | 002583 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.5 L/ha | üzüm | - | Zoğların inkişafa başladığı və boyatma mərhələsi, tingiliklərdə isə aktiv boyalma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 737 | Camot 100 EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | q/L | 002584 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.5 L/ha | üzüm | Bağ maymuncuğu | Erkən yazda gözcüklərininkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/2 | 7(3) |
| 738 | Gandeco 65 EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 002585 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.5 L/ha | üzüm | unlu bit | vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi | 14/2 | 10(4) |
| 739 | Lenavlina 25 EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 250 | q/L | 002586 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.4 L/ha | üzüm | oidium | vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi | 21/2-3 | 7(3) |
| 740 | Noucamp 10 SC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Etoxazole | 110 | q/L | 002587 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.25 L/ha | üzüm | iki nöqtəli qırmızı hörümçək | Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi | 10-15/2 | 7(3) |
| 741 | Tanchon 100 EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | q/L | 002588 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.25 L/ha | üzüm | oidium | Çiçəklənədən əvvəl və sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi | 21/4 | 7(3) |
| 742 | Figuran 2.5 EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 002589 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.3 L/ha | üzüm | Salxım yarpaqbükəni | vegetasiya dövründə zərərverici müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi | 30/2 | 7(3) |
| 743 | Lenamagic | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate isopropylamin tuzu | 480 | q/L | 002590 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.3 L/ha | üzüm | Birillik birləpəli və və ikiləpəli alaq otları | alaq otlarının aktiv inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi | 60/1 | 7(3) |
| 744 | Lenapasof | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb, Metalaxyl | 64, 8 | %, % | 002591 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 2.5 kq/ha | üzüm | mildiu | vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi | 14/3 | 7(3) |
| 745 | Lenatwister | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | q/L | 002592 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.2 L/ha | üzüm | salxım yarpaqbükəni | vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi | 10/2-3 | 7(3) |
| 746 | Sun Süper 25 WG | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 25 | % | 002593 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.27 kq/ha 1000 l suya | armud | armud bağacığı | Meyvələrin formalaşması mərhələsində hər yarpaqda 5-6 ədəd zərərverici müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25-30/1 | 7(3) |
| 747 | Husky 5 SG | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 5 | % | 002594 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.4 kq/ha 1000 l suya | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | Meyvələrin ilkin formalaşması dövründə (100 bitkidə orta hesabla 5-6 tırtıl, 20 yumurta müşahidə edildikdə) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 748 | Imperative 250 EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 002595 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.35 L/ha 1000 l suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | 100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağqanadlı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1 | 7(3) |
| 749 | Lenaplan 20 SP | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 002596 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.35 kq/ha | pomidor (istixana) | yaşıl mənənə | Çiçəklənədən sonra hər yarpaqda 2-4 ədəd mənənə müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1 | 3(3) |
| 750 | Petrus 1.8 EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 002597 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.35 L/ha 1000 l suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | 100 yarpaqda, 5-6 ədəd ağqanadlı müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1 | 3(3) |
| 751 | Virtuar 40 EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 002598 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.2 L/ha 1000 l suya | alma | mənənə | Çiçəklənədən sonra meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22/1 | 7(3) |
| 752 | Zor-Ya SC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione, Nicosulfuron | 37.5, 15 | q/L, q/L | 002599 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 2.2 L/ha | Qarğıdalı | Dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 753 | Aquero 80 WP | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-AL | 80 | % | 002600 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 270 qr/ha 100 L suya | pomidor (istixana) | fitoftora | Çiçəklənədən əvvəl, töradicinin ilkin inkişafı dövründə və meyvələrin formalaşmasından sonra xəstəliyinkütləvi inkişafı mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 754 | Camdale 5 EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lufenuron | 50 | q/L | 002601 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.35 L/ha | bibər (istixana) | trips | Bibər meyvələrinin ilk formalaşması və orta yetişgən dövrlərində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 755 | Cubels | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Molyuskosid | Metaldehyde | 6 | % | 002602 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 16 kq/ha | pomidor (istixana) | Çılpaq ilbizlər | Çərgə aralarına və bitkilərin ətrafına sapılmaklə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/2 | 7(0) |
| 756 | Dolce Vita 330 SC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | q/L | 002603 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 5.2 L/ha | soğan | alaq otları | Alaq otunun 1-3 sm, bitkinin 1-2 yarpaq inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/1 | 7(3) |
| 757 | Huysuz EC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 116.2 | q/L | 002604 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.0 L/ha | şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Alaq otunun 6-8 sm, bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqitövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 758 | Rouen EW | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cloquintocet mexyl , Fenoxaprop-p-ethyl | 34.5, 69 | q/L, q/L | 002605 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.2 L/ha | buğda | birillik dar yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində (bitki 2-4, alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında) çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 759 | Telstar 20 WP | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Pyridaben | 20 | % | 002606 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 110 qr/ha 100 L suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | Meyvələrin ilkin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1 | 7(3) |
| 760 | Vallene 400 EW | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prochloraz, Tebuconazole | 267, 133 | q/L, q/L | 002607 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.7 L/ha | buğda | Unlu şeh | Bitkinin kollanma fazasında xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 42/1 | 7(3) |
| 761 | Vigone 600 SC | Agromia Kimya Tarım Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Aclonifen | 600 | q/L | 002608 | 08.06.2022 | 08.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.35 L/ha | günəbaxan | alaq otları | Alaq otunun 6-8 sm olan inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 762 | Divago | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metal misə barabər bordo bulaması | 20 | % | 002611 | 14.06.2022 | 14.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 15 kq/ha/1000 L suya | alma | damgil | Erkən yazda tumurcuqların şişkinləşdiyi dövrdə qələ çürüməsinə qarşı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-12/3 | 7(3) |
| 763 | Takcaptan | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 002612 | 14.06.2022 | 14.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.5-2.0kq/ha 1000 L suya | Armud | Damgil | Meyvələrin formalaşması mərhələsində 15 %-dan çox və 15 %-lik yoluxma baş verdikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10-12/3 | 7(3) |
| 764 | Tak-Gibb | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Giberellic acid | 20 | q/L | 002613 | 14.06.2022 | 14.06.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.75-1.0 L/ha /1000 L | Armud | - | Çiçəklərin 30 % açdığı və meyvələrin (diametri 1-2 sm dan çox olduqda) formalaşdığı mərhələdə çiləmə üsulu ilə yanaşaraq tətbiqi tövsiyə olunur | 10-15/4 | 3(1) |
| 765 | Kontador Duo SC | Peters & Burg KFT | Macarıstan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid , Lambda-Cyhalothrin | 300, 100 | q/L, q/L | 002614 | 14.06.2022 | 06.05.2027 | Macarıstan Respublikası | 0.075 L/ha | qarğıdalı | pambıq sovkası | Yerüstü əqreqatla, zərərvericinin inkişafının iqtisadi əyanti hədd səviyyəsində (1-ci çiləmə dənin ilk formalaşan dövründə, 2-ci çiləmə dənlərin süd-mum yetişkənliyi dövründə) olduğu vaxtda | 20-22/2 | 7(3) |
| 766 | Skorazol EC | Peters & Burg KFT | Macarıstan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | q/L | 002615 | 14.06.2022 | 06.05.2027 | Macarıstan Respublikası | 0.22 L/ha | alma | damgil xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 767 | Tiara WG | Peters & Burg KFT | Macarıstan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 250 | q/L | 002616 | 14.06.2022 | 06.05.2027 | Macarıstan Respublikası | 0.085 q/ha | kələm | kələm ağkəpənəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/2 | 7(3) |
| 768 | Bimmer EC | Peters & Burg KFT | Macarıstan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 002617 | 14.06.2022 | 06.05.2027 | Macarıstan Respublikası | 0.8 L/ha | alma | Qırmızı meyvə gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/2 | 7(3) |
| 769 | Dozor WP | Peters & Burg KFT | Macarıstan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | fenoxycarb | 250 | q/kq | 002618 | 14.06.2022 | 06.05.2027 | Macarıstan Respublikası | 0.65 kq/ha | alma | alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-22/2 | 7(3) |
| 770 | Şansilin, SPD(Шансилин, Вдг) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 800 | q/kq | 002619 | 17.06.2022 | 17.06.2027 | Rusiya Federasiyası | 1.0.044 kq/ha<br>2.0.0156 kq/ha | Çəyirtkəkimilərin məskunlaşdığı torpaqlar | Çəyirtkəkimilər | 1.Sürfələrin inkişafı dövründə çiləmə. İşçi mayenin sərfiyyatı 25-50 L/ha<br>2.Sürfələrin inkişafı dövründə baryeri 80-120 m və barıyerarası məsafə 300 m eni boyu lent şəklində çiləmə | 0/1 | 7(3) |
| 771 | Şanslar, SPD (Шанстар, Вдг) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron-metil | 750 | q/kq | 002620 | 17.06.2022 | 17.06.2027 | Rusiya Federasiyası | 0.02-0.025 kq/ha<br>200-300 L su | buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı | Birillik ikiləpəli alaqlar | bitkilərin kollanma mərhələsində və əvvəlində mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0/1 | 7(3) |
| 772 | Şansti , SPD (Шанстй, Вдг) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Tifensulfuron-metil | 750 | q/kq | 002621 | 17.06.2022 | 17.06.2027 | Rusiya Federasiyası | 0.015-0.02 kq/ha 200-300 l su | payızlıq buğda | Birillik iki ləpəli alaqlar, o cümlədən 2.4 D herbisitinə qarşı davamlı alaqlar | yazda bitkilərin kollanma mərhələsində əkinlərin çilənməsi | 0/1 | 7(3) |
| 773 | Aktofit EC | Ukrzooveteprompostach Eib | Ukrayna | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Aversektin C | 0.2 | % | 002622 | 04.07.2022 | 04.07.2027 | Ukrayna | 2.0 L/ha<br>1.6 L/ha<br>4.0-8.0 L/ha | Kartof, badımcan<br>kələm<br>Pomidor (istixana) | Kolorado kartof böcəyi, mənənə<br>Kələm ağ kəpənəyi<br>Mənənə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2<br>14/2<br>6/3 | 3(1)<br>3(1)<br>3(1) |
| 774 | Aluminium Phosphide-56 % | Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd. | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fumiqant | Aluminium phosphide | 56 | % | 002623 | 05.07.2022 | 05.07.2027 | Hindistan Respublikası | 2.5-3 q/m^3 | anbarlar,Eelvatorlar | anbar zərərvericiləri | havanın temperaturu 15 dərəcədən yüksək olduqda fumiqasiya edilməsi tövsiyə edilir | -(-) | 5/5 |
| 775 | Cydia Pomonella Lure | Mezhirans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feromon tələ | B--tocopherol, E8E10OH-12OH, digər komponentlər | 0.5, 95, 4.5 | %, %, % | 002627 | 08.07.2022 | 08.07.2027 | Moldova Respublikası | 3 tələ/5 ha | alma | alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində zərarlı orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 776 | Grapholita Funebrana Lure | Mezhirans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feromon tələ | 8 dodecen-1-ol, acetate,(8Z)-dodecen-1-ol, acetate, (8E)-, 8-dodecen-1-ol,(8Z), B--tocopherol, digər komponentlər | 95, 0.5, 4.5 | %, %, % | 002628 | 08.07.2022 | 08.07.2027 | Moldova Respublikası | 3 tələ/5 ha | albalı | albalı meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində zərarlı orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 777 | Pantera EC | Arysta LifeScience Benelux SPRL | Belçika Krallığı | Pestisid | Herbisid | Quizalofob-p- tefuryl | 40 | q/L | 002630 | 08.07.2022 | 08.07.2027 | Belçika Krallığı | 0.75-1 L/ha | Pomidor, soğan,kələm,çuğundur,kartof, günəbaxan pambıq | birillik taxıl fasiləsi alaqları | alaq otlarının 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1 | 7(3) |
| 778 | Lobesia Botrana Lure | Mezhirans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feromon tələ | (E,Z)-7,9-dodecadienyl acetate, B--tocopherol, Other ingredients | 95, 0.5, 4.5 | %, %, % | 002631 | 08.07.2022 | 08.07.2027 | Moldova Respublikası | 3 tələ/5 ha | üzüm | üzüm salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində zərarlı orqanizmin inkişafa başlamazdan əvvəl bioloji mübarizə aparılması üçün tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 779 | Dikotan M-45 WP | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 002635 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 200 q/100 L | alma<br>xiyar,soğan<br>üzüm | damgil<br>yalançı unlu şeh<br>mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 780 | Pyricose 300 SC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | q/L | 002636 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 L | alma | damgil | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/1 | 7(3) |
| 781 | Kung-Fu 5 EC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | q/L | 002637 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.4 ml/ 100 L | alma | Meyvəyeyən gənə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 782 | Dentis 25 EC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | q/L | 002638 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 20 ml/100 L<br>30 ml/100 L | meyvə<br>kartof | meyvəyeyən yastıca<br>kolorodo kartof böcəyi | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3 | 7(3) |
| 783 | Emarebeno 05 SG | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 002639 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 30 q/100 L | meyvə | minalayıcı güvələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1 | 7(3) |
| 784 | Kortiram Forte 80 WP | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiram | 80 | % | 002640 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 150 q/100 L su | alma | damgil | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 | Siperkor 25 EC | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 002641 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 20-30 ml/100 L | Üzüm<br>alma | yarpaqbükənlər<br>meyvəyeyən yarpaqbükənlər | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 786 | Korphanate 70 WP | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate methyl | 70 | % | 002642 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 60 q/100 L su | meyvə | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3 | 7(3) |
| 787 | Korfosat 48 SL | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate asilə barabər Glyphosate isopropylamin duzu | 480 | q/L | 002643 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 3 L/ha | meyvə, üzüm | birillik alaqlar | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 788 | Ridozeb Mz 72 WP | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb, Metalaxyl | 64, 8 | %, % | 002644 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 250 q/100 L | kartof<br>üzüm | fitoftora<br>mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3 | 7(3) |
| 789 | Pyramite | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Pyridaben | 20 | % | 002645 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 75 q/100 L | alma | adi tor və çırmızı meyvə gənələri | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1 | 7(3) |
| 790 | Avirmec EC | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Abamectin | 18 | q/L | 002646 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 25 ml/100 L | meyvə<br>pambıq | gənə,güvə<br>tor gənəsi | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7/2 | 7(3) |
| 791 | Kor-Miltox WP | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb, Metallik misə barabər mis duzları | 20, 21 | %, % | 002647 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 250 q/ 100 L<br>300 q/100 L<br><br>üzüm | xiyar,kartof<br><br>yalançı unlu şeh,fitoftora<br>mildiu | yalançı unlu şeh,fitoftora<br>mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3 | 7(3) |
| 792 | Mostar 20 SP | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 002648 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 60 q/100 L | kartof | kolorodo kartof böcəyi | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1 | 7(3) |
| 793 | Baystar SC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. Şan. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Defoliant | Diuron, Thidiazuron | 60, 120 | q/L, q/L | 002671 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 600 mL/ha | pambıq | bitkinin yarpaqlarının tökülməsi üçün | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 794 | Nivathion 60 EC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. Şan. ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 002672 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 150 ml/100 L su | alma | yarpaqbükənlər | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 10/4 |
| 795 | Apofen SC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Clofentezine | 500 | q/L | 002674 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 20-30 ml/100 L su | alma | gənələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 796 | Avanti SC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 150 | q/L | 002675 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 35 ml/ 100 L | alma | alma meyvəyeyəni | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10/2 | 10/4 |
| 797 | Arvilmec EC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | q/L | 002676 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 750 ml / 1000 L su<br>250 mL/ha | alma<br>pomidor | gənələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 28/2 | 7(3) |
| 798 | Casnox H 2 F | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallik misə ekvivalent mis hidroksit | 361.1 | q/L | 002677 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/ 100 L su | alma | damğıl | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 3(1) |
| 799 | Conrad SC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | q/L | 002678 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 80 ml/ 100 L su | pomidor | fitoftora | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 28/2 | 7(3) |
| 800 | Kral 250 EC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chypermethrin | 250 | q/L | 002679 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 20ml/ 100 L su<br>150 ml/100 L su<br>30 ml/100 L su | alma, armud<br>kartof<br>fındıq | meyvəyeyən, yarpaqbükən<br>kolorodo kartof böcəyi<br>kəmələk, yarpaqarılar | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/2<br>20/2<br>20/2 | 7(3) |
| 801 | Penthium DF | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metiram | 70 | % | 002680 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 220 q/100 L su | alma | gənələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 802 | Raider 240 EC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spirodiclofen | 240 | q/L | 002681 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 30 ml/100 L su | alma | gənələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 803 | Safa Yazlık Yağ | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Mineral Yağ | 850 | q/L | 002682 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 1500 ml/100 L su | alma | yastıcalar | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 804 | Tomquin 200 SC | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Fenazaquin | 200 | q/L | 002684 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 L su | alma | gənələr | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 805 | Trinol-2 | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Mineral yağ | 700 | q/L | 002685 | 15.07.2022 | 15.07.2027 | Türkiyə Respublikası | 1500 ml/100 L su | alma | yastıcalar | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 806 | Zinc Phosphide Technical | Sandhya Organic Chemicals Pvt.Ltd. | Hindistan Respublikası | Pestisid | Rodentisid | Zn3P2 | 80 | % | 002707 | 20.07.2022 | 20.07.2027 | Hindistan Respublikası | 100 kq toxuma 2.5 kq preparat | açıq və örtülü sahələrin | Sıçanabənzər | Hazırlanmış aldadıcı yemlərin yuvalara qoyulması ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/0 | 0/0 |
| 807 | Asia | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil, Cyprodinil | 25, 37.5 | %, % | 002725 | 20.07.2022 | 20.07.2027 | Çin Xalq Respublikası | 60 q/100 L suya | Pomidor (istixana) | boz çürümə | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 808 | Dron 110 Sc | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | q/L | 002726 | 20.07.2022 | 20.07.2027 | Çin Xalq Respublikası | 300 mL/ha | pambıq | hörümçək gənəsi | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 10/3 |
| 809 | Efal 80 Wp | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl -Al | 80 | % | 002727 | 20.07.2022 | 20.07.2027 | Hindistan Respublikası | 220 q/100 L suya | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 810 | Ramezin | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb, Metallik misə ekvivalent mis duzları | 20, 21 | %, % | 002728 | 20.07.2022 | 20.07.2027 | Çin Xalq Respublikası | 320 q/100 L suya | Pomidor (istixana) | fitoftora | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 811 | Rodis | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | q/L | 002729 | 20.07.2022 | 20.07.2027 | Çin Xalq Respublikası | 80 ml/100 L suya | üzüm | mildiu | vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 812 | Fourmen 70 WG | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate methyl | 70 | % | 002760 | 02.09.2022 | 02.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 60 qr/100 Lsuya | alma | damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3 | 7(3) |
| 813 | Katsumi 24 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafob-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener) | 240, 60 | q/L, q/L | 002761 | 02.09.2022 | 02.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 2 L/ha | alma | birillik və ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 814 | Lenaef Super 5 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob-p-ethyl | 50 | q/L | 002762 | 02.09.2022 | 02.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,0-2,4 L/ha | alma | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1-2 | 7(3) |
| 815 | Sunstar 330 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | q/L | 002763 | 02.09.2022 | 02.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 5 L/ha | alma | Alaq otları | Mahsul yığımından sonra torpağa verilməsi tövsiyə olunur | 60/1-2 | 7(3) |
| 816 | Armada 250 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | fungisid | Bupirimate | 250 | q/L | 002767 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1.0 L/ha | pomidor (istixana) | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 817 | Avatar 48 SC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 480 | q/L | 002768 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0.3 L/ha | pambıq | yaşıl mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 818 | Everest 5 SC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Akarisid | Fenpyroximate | 50 | q/L | 002769 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0.5 L/ha | Alma | Qırmızı meyvə gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/2 | 7(3) |
| 819 | Vegas 240 OD | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 240 | q/L | 002772 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0.45 L/ha | Alma | yaşıl mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 820 | Solizol 250 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | fungisid | Tebuconazole | 250 | q/L | 002773 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.55 L/ha | pomidor (istixana) | Alternarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 821 | Supermen 250 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 002774 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 32 ml/1000 m^2 | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/1-2 | 5(3) |
| 822 | Galactic 240 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | q/L | 002775 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 78 ml/1000 m^2 | Soğan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1-2 | 7(3) |
| 823 | Alprin 350 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl | 350 | q/L | 002777 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 110 ml/100 kq | pomidor (istixana) | Fitoftora | Torpağın sapından əvvəl dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | -(-) |
| 824 | Goldvin SP 90 | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 90 | % | 002778 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 60 qr ml/1000 m^2 | pomidor (istixana) | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 825 | Suprodinil 50 WG | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 002779 | 14.09.2022 | 14.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 42 qr ml/1000 m^2 | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 826 | Metalan G 6% B | CYAH Corporation | İran İslam Respublikası | Pestisid | Mələfəotu | Metsirtehyrte B | 6 | % | 002780 | 21.09.2022 | 21.09.2027 | İran İslam Respublikası | 20-25 kq/ha | pomidor (istixana) | ilbirlər | Cəmələrə səpma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 5(3) |
| 827 | Tribenuron-Methyl Aria 75% DF | Ariashimi | İran İslam Respublikası | Herbisid | | Tribenuron-Methyl | 750 | q/L | 002781 | 21.09.2022 | 21.09.2027 | İran İslam Respublikası | 0,02 kq/ha | buğda | ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1-2 | 7(3) |
| 828 | Delan SC | Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 500 | q/L | 002786 | 21.09.2022 | 21.09.2027 | Fransa Respublikası | 1 L/ha<br>(1000 L suya) | şaftalı | yarpaq qıvrılması | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 5-10/3-5 | 7(3) |
| 829 | Adalan Forte | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mis duzları, Mancozeb | 21, 20 | %, % | 002795 | 23.09.2022 | 23.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 kq/ha | pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 3(1) |
| 830 | Bekchi 5SG | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 5 | % | 002797 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 kq/ha | pomidor (istixana) | Mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 5/3 | 3(1) |
| 831 | Dogaman 250 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | q/L | 002799 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,1 L/ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 832 | Efalon 80 WP | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-AL | 800 | q/kq | 002800 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,0 kq/ha | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10-12/2-3 | 3(1) |
| 833 | Ekhon 50 WG | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 002801 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,4 kq/ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 834 | Festline Bakır 50 WP | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalik Bakır | 50 | % | 002802 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 kq/ha | pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 3(1) |
| 835 | Hockey XL 035 FS | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil,Metalaxyl-M | 25,10 | q/L, q/L | 002803 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,0 L/ha | pomidor (istixana) | Kök çürüməsi | Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 2/1 |
| 836 | HOOK 50 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | İmazalil | 500 | q/L | 002804 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,0 L/ha | pomidor (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 12/2 | 7(3) |
| 837 | Norat 50 WP | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 002807 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 2.5-3.0 kq/ha<br>1000 L su | pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 5/3 | 3(1) |
| 838 | Resort 33 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | q/L | 002809 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,0 L/ha | soğan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 839 | Sorli Super | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-p-ethyl | 50 | q/L | 002810 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0-1,2 L/ha | pomidor | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 840 | Tennis 360 SL | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Hymexazole | 360 | q/L | 002812 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,0 L/ha | pomidor (istixana) | Kök çürüməsi | Vegetasiya müddətində damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 3(1) |
| 841 | Tension 300 SC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | q/L | 002813 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,25 L/ha | pomidor (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 5(3) |
| 842 | Terason 350 SC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | q/L | 002814 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 12-15/1-2 | 5(3) |
| 843 | Goldvant 150 SC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 150 | q/L | 002815 | 26.09.2022 | 26.09.2027 | Çin Xalq Respublikası | 45 ml/1000 m^2 | pomidor | pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/2 | 7(3) |
| 844 | Benpelle 480 SL | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone | 480 | q/L | 002837 | 28.09.2022 | 28.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,2 L/ha | soğan | birillik ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/1-2 | 7(3) |
| 845 | Fono Super | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-p-ethyl, safener (Cloquintocet mexyl) | 69, 34.5 | q/L, q/L | 002838 | 28.09.2022 | 28.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.8 L/ha | buğda | birlapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 846 | Status 330 E | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | q/L | 002839 | 28.09.2022 | 28.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,2 L/ha | pomidor | birillik ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/1-2 | 7(3) |
| 847 | Korzamox 120 SL | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | İmazamox | 120 | q/L | 002840 | 28.09.2022 | 28.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,42 L/ha | yonca | ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 848 | Korzamide 50 WP | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Propyzamide | 50 | % | 002841 | 28.09.2022 | 28.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,2 kq/ha | yonca | sarı sarmaşıq | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 849 | Epthal 72 SL | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tanzimləyici | Ethephon | 720 | q/L | 002842 | 28.09.2022 | 28.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,5 L/ha | buğda | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1-2 | 7(3) |
| 850 | Metatolle Oil | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid, Mineral yağ CAS- 74869-22-0 | 4, 704 | q/L, q/L | 002843 | 28.09.2022 | 28.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,5 L/100 L<br>suya | alma | yastıcalar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 851 | Rubin 2DS | Koruma Kİor Alkali San. Ve Tİc. A.S. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Funqisid | Tebuconazole | 2 | % | 002844 | 28.09.2022 | 28.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.5 kq/ton | buğda | sürmə | Əkinəqədər toxumun dərmanlanması | 30/1-2 | 7(3) |
| 852 | ESTERAN 48 | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D Acid-ə barabər İsooctylester | 480 | q/L | 002845 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,75 L/ha | buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 853 | RAMTO 80 EC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl, Cloquintocet-mexyl (Safener) | 80, 20 | q/L, q/L | 002846 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.3 L/ha | buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 854 | TREFOKS | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D Acid-ə barabər Dimethyl amin duzu | 500 | q/L | 002847 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,6-3,0 L/ha | buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 855 | RODİX | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxadiazon | 250 | q/L | 002848 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,5 L/ha | çəltik | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 856 | ZENOT-A | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | q/L | 002849 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,15 L/ha | buğda | Ziyankar bağacıq | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | SİLTAN 25 EC | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 002850 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | noxud | pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 858 | MALATON 65 EM | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 002851 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 2 L/ha | qarğıdalı | sovkalar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 10(4) |
| 859 | WHEATMASTER DS 2 | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 2 | % | 002852 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kq/1 ton toxum | buğda | sürmə xəstəlikləri | Sapın qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur | 0/1 | 0(0) |
| 860 | TERLOSS M-45 | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 002853 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 3,5 kq/ha | buğda | sarı pas xəstəlikləri | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 28/2 | 7(3) |
| 861 | LAİOS | Ferbis Tarim Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone, MCPA | 250, 125 | q/L, q/L | 002854 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,0 L/ha | çaltik | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 862 | HARVEST 25 WP | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 002855 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,75 kq/ha | buğda | sarı pas xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 10(4) |
| 863 | SUNCOL 60 FS | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 60 | q/L | 002856 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.5 L/ha | buğda | sürmə xəstəlikləri | Sapın qabağı toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 864 | RAFAEL 400 EW | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prochloraz, Tebuconazole | 267, 133 | q/L, q/L | 002857 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.5 L/ha | buğda | pas xəstəlikləri | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 42/1-2 | 10(4) |
| 865 | Commando 35% SC | Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 35 | % | 002865 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 0.1 L/ha | kartof | koloradoo kartof böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 866 | Hadaf 24% EC | Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 24 | % | 002866 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 1.5-2.0 L/ha | soğan | birillik ikilapalı alaqlar | Bitkinin 3-4 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 867 | Metaldehyde 5% GR | Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | Molyuskosid | Metaldehyde | 5 | % | 002867 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 20,0 qr/10 kv.m | tərəvəz sahələri, meyvə bağları | ilbizlər | Qranulların torpaq səhasinə səpilməsi | -/1 | 10 (-) |
| 868 | Tachigazole 30% SL | Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | Fungisid | Hymexazole | 30 | % | 002869 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 0,3-0,6 L/ha | pomidor | fizaroz | Əkindən sonra damcı suvarma üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/3 | -(-) |
| 869 | Vacomil 35% WP | Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl | 35 | % | 002870 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 0,2-0,25 kq/ha | xiyar | perenosporoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/3 | 7(3) |
| 870 | Vapcomore 20% SP | Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.LTD | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 002871 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 0,025-0,04 kq/ha | kartof | koloradoo kartof böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 871 | Premio Zolfo 80 WG | Safa Tarım A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Sulphur | 80 | % | 002872 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Türkiyə Respublikası | 4,0-6,0 kq/ha<br>1,6-2,0 kq/ha | üzüm<br>xiyar<br>qarpız | oidium<br>gənə<br>unlu şeh<br>gənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/3 | 7(3) |
| 872 | Silit 40% SC | Arysta LifeScience Benelux SPRL | Belçika Krallığı | Pestisid | Fungisid | Dodine | 40 | % | 002873 | 30.09.2022 | 30.09.2027 | Belçika Krallığı | 1-1,5 L/ha | alma | damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 10(4) |
| 873 | Hekvidor 350 SC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | q/L | 002884 | 05.10.2022 | 05.10.2027 | Türkiyə Respublikası | 1. 0.2 L/ha<br>2. 0.5 L/ha<br>3. 1.0 L/ha | 1. meyvə<br>2. üzüm<br>3. pomidor | 1. Mənənələr<br>2. Tripslər, mənənələr<br>3. Mənənələr, ağcaqanadlı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1-2 | 7(3) |
| 874 | Arivo 25 EC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 002892 | 12.10.2022 | 12.10.2027 | Türkiyə Respublikası | 1. 0.4 L/ha<br>2. 0.3 L/ha | 1. pambıq<br>2. tərəvəzlər | 1. pambıq sovkası<br>2. kələm ağ kəpənəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 875 | Croshe (WP) | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Tebufenpyrad | 20 | % | 002893 | 12.10.2022 | 12.10.2027 | Türkiyə Respublikası | 1. 0,375-1,0 kq/ha<br>2. 0,5 kq/ha<br>3. 0,6 kq/ha | 1. alma, armud<br>2. üzüm<br>3. pambıq | 1. gənələr, armud ballıcası<br>2. gənələr<br>3. gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 876 | Bella 70 WP | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 002902 | 12.10.2022 | 12.10.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,75-1,0 kq/ha | pomidor | birillik ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 877 | Lenafruit 20 WP | Lena Tarım Ürünleri UR.Paz. ve Dış.Tic.LTD.ŞTİ | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalik Bakır eşdeğer Bordo bulamacı | 20 | % | 002903 | 12.10.2022 | 12.10.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,0 kq/ha | üzüm | mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 878 | Heliodar SC | "Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 350 | q/L | 002904 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.2 L/ha | badımcan (istixana) | pambıq yarpaq qurdu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 3/1-2 | 7(3) |
| 879 | %65 Malathion EM | "Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 002914 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Türkiyə Respublikası | 155 ml/100 L suya | üzüm | üzüm salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 880 | Koruma Yazlik Yağ | "Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Mineral Yağ CAS: 74869-22-0 | 850 | q/L | 002915 | 21.10.2022 | 10/21/2027 | Türkiyə Respublikası | 1.2-1.5 L/100 L suya | alma | Qırmızı meyvə gənəsi, Kolifornıya çənaqlı yastıcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/1-2 | 7(3) |
| 881 | Promise Ultra EC | "Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Abamectin, Imidacloprid | 5, 45 | q/L, q/L | 002916 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.6 L/ha | armud | balıca | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1-2 | 7(3) |
| 882 | Delan Pro | "Basf Agro B.V." Arnhem (Nl) Freienbach Branch | Fransa Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dithianon , Phosphorous acid (phosphonic acid) | 125, 375 | q/L, q/L | 002917 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Fransa Respublikası | 1.25 L/ha (1000 L suya) | armud | damğıl (qarələkə) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 5-10/3-5 | 7(3) |
| 883 | King Cliph 480 SL | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 480 | q/L | 002920 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Çin Xalq Respublikası | 4.0-8.0 L/ha | meyvə bağları | çoxillik taxıl fəsiləsi və ikilapalı alaqlar | Alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 884 | King Sunsay 20 EC | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Akarisid | Pyridaben , Hexythiazox | 160, 40 | q/L, q/L | 002921 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0.25 L/ha | pambıq | hörümçək gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 885 | Kingom EC | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | q/L | 002922 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0.5-0.9 L/ha | pomidor (istixana) | mənənələr, gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 10(4) |
| 886 | Terra 90 SP | Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 90 | % | 002924 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0.55 L/ha | pambıq | pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 887 | Alphamex 100 EC | Mac Gmbh Agricultural Products | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | q/L | 002936 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.15 L/ha | buğda | Ziyankar bağacıq | çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/1-2 | 7(3) |
| 888 | Clodimex Plus EC | Mac Gmbh Agricultural Products | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop propargyl, Cloquintocet mexyl, Fenoxaprop-p-ethyl | 45, 34.5, 90 | q/L, q/L, q/L | 002937 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.35 L/ha | buğda | birillik taxıl fəsiləsi alaq otları | Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 889 | Mesomex Plus WG | Mac Gmbh Agricultural Products | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | İodosulfuron metyl sodium, Mesosulfuron methyl | 6, 30 | g/kq, q/kq | 002938 | 21.10.2022 | 21.10.2027 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.4 kq/ha | buğda | birillik və çoxillik ikilapalı alaq otları | Alaqların 2-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 890 | Korgaren 360 SL (Maye) | "Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Hymexazole | 360 | g/L | 002950 | 18.11.2022 | 18.11.2027 | Türkiyə Respublikası | 1.5 L/ha | Pomidor | Kök çürüməsi | Əkindən sonra damcı suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 5(2) |
| 891 | Korpam (Maye) | "Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fumiqant | Metam-sodium | 500 | g/L | 002951 | 18.11.2022 | 18.11.2027 | Çin Xalq Respublikası | 65-125 ml/1 m^2 | Pomidor<br>Xiyar | Nematodlar | Əkin və sapından 15-20 gün öncə torpağa damla suvarma ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(7) |
| 892 | Koruma Captan 50 WP(Toz) | "Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 002952 | 18.11.2022 | 18.11.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.3 kq/ha | Pomidor | Alternarioz (qunu ləkəlilik) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10-15/1-2 | 7(3) |
| 893 | Malamala 150 SC | "Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 150 | g/L | 002953 | 18.11.2022 | 18.11.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.4 L/ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 894 | Rubin 25 WP (Toz) | "Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 002954 | 18.11.2022 | 18.11.2027 | Türkiyə Respublikası | 0.5 kq/ha | Pomidor | Alternarioz (qunu ləkəlilik) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10-15/1-2 | 7(3) |
| 895 | Funguran OH 50 WP | "Cosaco GmbH" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalic Copper | 50 | % | 002964 | 28.11.2022 | 16.07.2025 | Almaniya Federativ Respublikası | 1.5-2.0 kq/ha<br>2.4-3.4 kq/ha | Üzüm<br>Alma | Mildiu<br>Damğıl | Vegetasiya müddətində xəstəliyin simptomları müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 7(3) |
| 896 | Hekthion 65 Em (Maye) (EC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | g/L | 002967 | 09.12.2022 | 09.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,2 L/ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 897 | Aprol 48 SL | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Biostimulyator | Ethephon | 480 | g/L | 002968 | 13.12.2022 | 13.12.2027 | Çin Xalq Respublikası | 2,5 L/ha | Pomidor (istixana) | - | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-30/2 | -(-) |
| 898 | Contact Super 70 WG | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 70 | % | 002969 | 13.12.2022 | 13.12.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,5 kq/ha | Xiyar (istixana) | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 16/2 | 7(3) |
| 899 | Titan 600 FS | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 600 | g/L | 002970 | 13.12.2022 | 13.12.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,6 kq/100 kq toxuma | Qarğıdalı | Tel qurdu | Sapından əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materialının islanması | 0/1 | 7(3) |
| 900 | Megasil 35 DS | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl | 35 | % | 002971 | 13.12.2022 | 13.12.2027 | Çin Xalq Respublikası | 0,5 kq/100 kq toxuma | Günəbaxan | Mildiu | Sapından əvvəl zərərli orqanizmlərə qarşı toxum materialının islanması | 0/1 | 7(3) |
| 901 | Altay 100 SL | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 100 | g/L | 002972 | 13.12.2022 | 13.12.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,0 L/ha | Buğda | Birillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 902 | Cabare 75 WP | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cyromazine | 75 | % | 002973 | 13.12.2022 | 13.12.2027 | Çin Xalq Respublikası | 2,2 kq/ha | Pomidor (istixana) | İstixana ağcaqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 16/1-2 | 7(3) |
| 903 | Artonil SC | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Defoliant | Thidiazuron+Diuron | 120+60 | g/L+g/L | 002978 | 14.12.2022 | 14.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,7 lt/ha | Pambıq | - | Qozaların 25-30%-nin açılması dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 904 | Benpelle M-60 (SL) | "Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone+MCPA | 400+60 | g/L+g/L | 002986 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,5 L/ha | Çaltik | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 905 | Koranil 50 WG | "Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 002987 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 400 qr/1000 L suya | 1.Alma<br>2.Ərik | 1.Damğıl<br>2.Monilioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 24/2 | 7(3) |
| 906 | Korprex 500 SC | "Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 500 | g/L | 002988 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 1. 100 qr/100 L suya<br>2. 150 qr/100 L suya<br>3. 150 qr/100 L suya | 1. Alma<br>2. Gilas<br>3. Şaftalı | 1. Damğıl<br>2. Monilioz<br>3. Yarpaq qıvrılması | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26/1-2 | 7(3) |
| 907 | Korminex 400 SC | "Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bispyribac Sodium | 420 | g/L | 002989 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,06 L/ha | Çaltik | Birləpalı və ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 60/1-2 | 7(3) |
| 908 | Kormail Plus 10 EC | "Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 002990 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 52 ml/100 L suya | Pomidor (istixana) | İstixana ağcaqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 909 | Russo 200 EC | "Koruma Klor Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cyhalofop-Butyl | 200 | g/L | 002991 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,75-1,5 L/ha | Çaltik | Birləpalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 910 | Colosal Pro MEC | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole, Propiconazole | 200, 300 | g/L, g/L | 002996 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Rusiya Federasiyası | 0,2-0,3 L/ha | Payızlıq buğda<br>Ərik<br>Alma<br>Üzüm | Unlu şeh,<br>pas xəstəlikləri, septorioz<br>Unlu şeh, meyvə çürüməsi<br>Damğıl, unlu şeh<br>Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 38/1-2<br>30/2 | 7(3) |
| 911 | Poligor (EC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 002997 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,0 L/ha<br>0.7-1.5 L/ha | Alma<br>Tərəvəz bitkiləri (toxumluq sahələri) | Mənənələr, gənələr<br>Mənənələr, tripslər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/3 | 10(3) |
| 912 | Elpis (SL) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | İmazamox | 40 | g/L | 002998 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,3 L/ha | Soya | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 913 | Hekmilin 48 SC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 480 | g/L | 002999 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2-0,3 L/ha | Armud | Armud bağacığı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 28/1-2 | 7(3) |
| 914 | Valsaqlif Super 540 SL | "Internacional Quimica De Cobre S.A De C.V" | Meksika | Pestisid | Herbisid | Glyphosate potassium salt | 660 | g/L | 003000 | 23.12.2022 | 23.12.2027 | Çin Xalq Respublikası | 1,3-2,0 L/ha<br>2,0-4,0 L/ha | Alma<br>Alma | Birillik alaq otları<br>İkillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/1-2<br>25/1-2 | 7(3)<br>7(3) |
| 915 | Znatok, WDG (Знаток, ВДГ) | "Şans Enterprayz ( ООО Шанс Энтерпрайз)" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Trifloxystrobin | 500 | q/kq | 003001 | 26.12.2022 | 26.12.2027 | Rusiya Federasiyası | 0,14-0,15 kq/ha | Alma, armud | Damğıl, unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 7-10/2 | 7(3) |
| 916 | Xorist, WDG (Хорист, ВДГ) | "Şans Enterprayz ( ООО Шанс Энтерпрайз)" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 750 | q/kq | 003002 | 26.12.2022 | 26.12.2027 | Rusiya Federasiyası | 1. 0,2-0,25 kq/ha<br>2. 0,2-0,35 kq/ha | 1. Alma, armud<br>2. Ərik, gilas | 1. Damğıl, monilioz<br>2. Kokkomikoz, meyvə çürüməsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10--12/2-4 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Çistosad, SC (Чистосад, КС) | "Şans Enterprayz ( OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Tribasic copper sulphate | 345 | g/L | 003003 | 26.12.2022 | 26.12.2027 | Çin Xalq Respublikası | 5,0 L/ha | 1. Alma, armud<br>2. Şəkərqamışı | 1. Damğıl və unlu şeh<br>2. Meyvələrin lokkenkoz yanması | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 1. 7-10/3-4<br>2. 10-12/3-4 | 7(3) |
| 918 | Kalina, SC (Калина, КС) | "Şans Enterprayz ( OOO Шанс Энтерпрайз)" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 480 | g/L | 003004 | 26.12.2022 | 26.12.2027 | Rusiya Federasiyası | 1. 0,3 L/ha<br>2. 0,45 L/ha | Alma | 1.Alma meyvəyeyəni<br>2. Yarpaqbükənlər, Kaliforniya yastıcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 1. 7-10/3-4<br>2. 10-12/3-4 | 7(3) |
| 919 | Prevent (SL) | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propamocarb-HCl | 722 | g/L | 003005 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 2,7 L/ha | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 920 | Camada (WP) | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophonate-methyl | 70 | % | 003006 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,3 kq/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3 | 7(3) |
| 921 | Furina 6 (GB) | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Molyusksosid | Metaldehyde | 6 | % | 003007 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 15 kq/ha | Xiyar (istixana) | Çılpaq ilbizlər | Vegetasiya müddətində cərgələrə səpmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 7(3) |
| 922 | Karia 20 WP | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Tebufenpyrad | 20 | % | 003008 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,8 kq/ha | Xiyar (istixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 923 | Spironn (EC) | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 003009 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L/ha | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 924 | Pirene (SC) | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Bifenazate | 240 | g/L | 003010 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,65 L/ha | Xiyar (istixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 925 | Dumble 40 EC | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 003011 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | Pambıq | Gənələr, mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/3 | 7(3) |
| 926 | Doxin 100 EC | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | g/L | 003012 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,2 L/ha | Alma | Meyvəyeyənlər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/3 | 7(3) |
| 927 | Carmen Mz (WP) | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Dimethomorph | 60+ 9 | %+% | 003013 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 kq/ha | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 5/3 | 7(3) |
| 928 | Tripp 900 EC | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Nematosid | Fosthiazate | 900 | g/L | 003014 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 5,5 L/ha | Xiyar (istixana) | Fir nematodu | Şitillər aklimatizdən əvvəl aktiv qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 929 | Rocket 20 SP | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 003015 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,3 kq/ha | Pomidor | Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/1-2 | 7(3) |
| 930 | Judo 5 EC | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda cyhalothrin | 5 | % | 003016 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,5 L/ha | Pambıq | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/3 | 10(4) |
| 931 | Tazole (SC) | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 003018 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | Pambıq | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/1-2 | 7(3) |
| 932 | Jako 50 WG | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-methyl | 50 | % | 003019 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 0,25 kq/ha | Pomidor (istixana) | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 933 | Solizol 2 DS | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 2 | % | 003020 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 155 qr/100 kq toxuma | Xiyar | Unlu şeh | Səpindən əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 934 | Tayro (SC) | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 240 | g/L | 003021 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 935 | Superprex 500 Fw (SC) | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 500 | g/L | 003022 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 1,1 kq/ha | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 936 | Boxer 48 SL | "Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA duzu | 480 | g/L | 003023 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | Türkiyə Respublikası | 3-6 L/ha | Üzüm | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 937 | Cypermethrin-25 % EC | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 25 | % | 003024 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 0,12-0,2 L/ha | Meyvə bitkiləri | Yarpaqbükən, Meyvəyeyən | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 938 | Phoenix-5% EC | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 5 | % | 003025 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 0,25-0,4 L/ha | Meyvə bitkiləri | Yarpaqbükən, Meyvəyeyən | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 939 | Vap-Malathion-57% EC | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 57 | % | 003026 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 1,0-1,3 L/ha | Meyvə bitkiləri | Yarpaqbükən, Meyvəyeyən | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 10(4) |
| 940 | El-Toro 25 % SC | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 25 | % | 003027 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 42 ml/100 L suya | Xiyar (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 941 | P-Oxyride 50 % WP | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | Fungisid | Copper Oxychloride | 50 | % | 003028 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 2,6 kq/ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 18/2 | 7(3) |
| 942 | Conazole-25% EC | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 25 | % | 003029 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 42 ml/100 L suya | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 24/2 | 7(3) |
| 943 | Hanger 75% WDG | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 75 | % | 003030 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 7,5 qr/100 L suya | Alma | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 944 | Spideron 10 % WP | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 10 | % | 003031 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 0,5 L/ha | Alma | Qırmızı tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 945 | Vayomil-24% SL | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | İnsektisid-akarisid, nematosid | Oxamyl | 24 | % | 003032 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 260 ml/100 L | Pomidor (istixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 946 | Kratos-24%SC | "Veterinary&Agricultural Prod.Manu.Co.Ltd" | İordaniya Haşimi Krallığı | Pestisid | Akarisid | Spirodiclofen | 24 | % | 003033 | 27.12.2022 | 27.12.2027 | İordaniya Haşimi Krallığı | 0,4 L/ha | Alma | Qırmızı tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 28/2 | 7(3) |
| 947 | Lufox 105 EC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Lufenuron+Fenoxycarb | 30+75 | g/L+g/L | 003048 | 28.12.2022 | 06.04.2027 | Rusiya Federasiyası | 0,5-1,0 L/ha | 1. Üzüm<br>2. Pomidor<br>3. Meyvə<br>4. Pambıq | Gənələr, yarpaqbükənlər, meyvəyeyənlər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 35/2 | 10(4) |
| 948 | Emulsifiable Oil Aria 80% L | "Ariashimi" | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emulsifiable Oil L (Cas-8020-83-5) | 80 | % | 003049 | 29.12.2022 | 29.12.2027 | İran İslam Respublikası | 2.5 L/100 L suya | Alma | Yastıca və gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 949 | Süper Hektamethrin 100 (EC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | g/L | 003051 | 09.01.2023 | 09.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 2-3 L/ha<br>20 ml/100 L su<br>24-36 ml/100 L su<br>0,2 L/ha | 1.Pambıq<br>2.Alma<br>3.Üzüm<br>4.Şəkər çuğunduru | Pambıq sovkası<br>Meyvəyeyən<br>Salxım yarpaqbükəni<br>Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3 | 7(4) |
| 950 | Takimsan Knock-Out (SL) | "Ferbis Tarım Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate isopropylamine salt | 480 | g/L | 003052 | 09.01.2023 | 09.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 3,0-6,0 L/ha | Meyvə və üzüm bağları | Birillik və çoxillik alaq otları | Alaqların ilkin və fəal böyümə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | - /1 | 7(3) |
| 951 | Viaduct (SG) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 5 | % | 003055 | 12.01.2023 | 12.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 q/ 100 L su | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 24 / 2 | 7(3) |
| 952 | Diurex 80 WP | "Adama Agan LTD" | İsrail Dövləti | Pestisid | Herbisid | Diuron | 80 | % | 003066 | 17.01.2023 | 17.01.2028 | İsrail Dövləti | 1,3 kq/ha | Göl akinləri | Enli və dar yarpaqlı alaq otları | Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1 | 15(7) |
| 953 | Dagro Konfi Oil (SC) | "Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid + Mineral Oil (Cas-64742-55-8) | 4 + 704 | g/L+g/L | 003067 | 23.01.2023 | 23.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,5 L/100 L | Alma | Kaliforniya yastıcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/1-2 | 7(3) |
| 954 | Dagro Konfi SC 350 | "Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 003068 | 23.01.2023 | 23.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 1. 0,5 L/ha<br>2. 0,4l/ha | Alma | 1.Alma ballıcası<br>2. Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 26/2 | 7(3) |
| 955 | Dagro Mite 20 WP | "Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Pyridaben | 20 | % | 003069 | 23.01.2023 | 23.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,75 kq/ha | Alma | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 956 | Dagro Wena (EC) | "Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda cyhalothrin | 50 | g/L | 003070 | 23.01.2023 | 23.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,2 L/ha | Buğda | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 26/1-2 | 7(3) |
| 957 | Dagrolint (SG) | "Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 5 | % | 003071 | 23.01.2023 | 23.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,3 kq/ha | bibər (istixana) | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 958 | Devisa (EC) | "Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | g/L | 003072 | 23.01.2023 | 23.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 1. 0,2 L/ha<br>2. 0,3 L/ha | Alma | 1.Alma meyvəyeyəni<br>2. yarpaqbükənlər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 26/1-2 | 7(3) |
| 959 | Manzeb-M 45 (WP) | "Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 003073 | 23.01.2023 | 23.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,0 kq/ha | Pomidor (İstixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 960 | Wagner 48 SL | "Deva Agro Kimya Tarim San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate IPA | 480 | g/L | 003074 | 23.01.2023 | 23.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,6 L/ha | Yol və kənarları | Birillik və çoxillik alaq otları | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 961 | Bosfor EC, Босфор (KƏ) | "Şans Enterpraiz" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | q/L | 003075 | 25.01.2023 | 25.01.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,2 l/ha | Soğan | Alaq otlarına qarşı | Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 962 | Delaton (SQ), Делатон (ВГ | "Şans Enterpraiz" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 700 | g/kg | 003076 | 25.01.2023 | 25.01.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,7 kq/ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/3-4 | 7(3) |
| 963 | Feya EC, Фейа (KƏ) | "Şans Enterpraiz" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Prothioconazole, Tebuconazole | 125<br>125 | q/L<br>q/L | 003077 | 25.01.2023 | 25.01.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,2 L/ha | Qarğıdalı | Fuzarioz | Bitkinin yarpaq əmələgəlmə fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 964 | Polidok SHQ, Полидок (ВДГ) | "Şans Enterpraiz" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Metiram | 700 | g/kg | 003078 | 25.01.2023 | 25.01.2028 | Rusiya Federasiyası | 2,7 kq/ha | Üzüm | Mildyu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 12-15/3-4 | 7(3) |
| 965 | Propişans EK, Пропишанс (KƏ) | "Şans Enterpraiz" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole | 250 | q/L | 003079 | 25.01.2023 | 25.01.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,6 lt/ha | Buğda | Unlu şeh | Bitkinin kollanma fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 966 | Propişans Universal KME, Пропишанс Универсал (KMƏ) | "Şans Enterpraiz" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole, Tebuconazole | 300<br>200 | q/L<br>g/L | 003080 | 25.01.2023 | 25.01.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,6 lt/ha | Buğda | Unlu şeh | Bitkinin kollanma fazasında, xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. | 25/2 | 7(3) |
| 967 | Hektaş Göztaşı (CR) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Sulphate Equivalent to 25% Metallic Copper | 25 | % | 003081 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 2.0 kq/100 L su | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində tumurcuqlar açılana qədər çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. | 21/1-2 | 7(3) |
| 968 | Woamon 40 SL | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Imazamox | 40 | g/L | 003082 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,3 L/ha | Soya | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1-2 | 7(3) |
| 969 | Plamitin 48 SC | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 480 | g/L | 003083 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | Pomidor (İstixana) | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 970 | Galleon 24 EC | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 003084 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,8 L/ha | Soğan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/1-2 | 7(3) |
| 971 | Fendal 33 EC | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | g/L | 003085 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,52 L/ha | Soğan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 40/1-2 | 7(3) |
| 972 | Drama 50 EC | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tepraloxydim | 50 | g/L | 003086 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,1 L/ha | Soğan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 40/1-2 | 7(3) |
| 973 | Crax 60 DF | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bensulfuron-methyl | 60 | % | 003087 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,06 kq/ha | Çəltik | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 35/1-2 | 7(3) |
| 974 | Anaconda 600 (SC) | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Aclonifen | 600 | g/L | 003088 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,3 L/ha | Günəbaxan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 45/1-2 | 7(3) |
| 975 | Efsane 70 WP | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 003090 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,5 kq/ha | Pomidor | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 42/1-2 | 7(3) |
| 976 | Rizam WG | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ziram | 76 | % | 003091 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,20 kq/ha | Şaftalı | Yarpaq qıvrılması | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 24/2 | 7(3) |
| 977 | Sunpime 500 SC | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 500 | g/L | 003092 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,85 L/ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 26/2 | 7(3) |
| 978 | Suum 10 SC | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 003093 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,4 L/ha | Pomidor (İstixana) | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 979 | Gharlan OD 240 | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 240 | g/L | 003094 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,4 L/ha | Pomidor (İstixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 980 | Doncep (SG) | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Rimsulfuron | 25 | % | 003095 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,3 kq/ha | Qarğıdalı | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 35/1-2 | 7(3) |
| 981 | Geliyo 080 EC | "Platin Kimya Mümessillik ve Diş.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl | 80 | g/L | 003096 | 27.01.2023 | 27.01.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,3 L/ha | Buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 982 | Ampligo 150 ZC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole+ Lambda-cyhalothrin | 10 + 5.0 | % + % | 003102 | 31.01.2023 | 19.04.2026 | Fransa Respublikası | 0,2-0,3 | Üzüm, meyvə bitkiləri,tərəvəz bitkiləri | Yarpaq bükən, meyvəyeyən, mənənələr | Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədəuyğundur | 25/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | Topik 080 EC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | pestisid | herbisid | Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-mexyl | 80 + 20 | g/L + g/L | 003103 | 31.01.2023 | 05.03.2027 | Macarıstan Respublikası | 0,3 kq/ha | Taxıl əkinləri | Yabanı ələmlər | Erkən yazda alaq otlarının cücərtiləri çıxdığı zaman çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 984 | Thiophanate Methyl Aria 70% WP | "Ariashimi " | İran İslam Respublikası | pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl | 70 | % | 003105 | 31.01.2023 | 31.01.2028 | İran İslam Respublikası | 0,6-0,8 kq/ha | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 985 | Oxyfluorfen Aria 24 EC | "Ariashimi " | İran İslam Respublikası | pestisid | herbisid | Oxyfluorfen | 24 | % | 003106 | 31.01.2023 | 31.01.2028 | İran İslam Respublikası | 0,75 L/ha | Soğan | Birillik ikilapəli alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 18-20/1-2 | 7(3) |
| 986 | Fostokal (tablet) | "Shenzhen Yufull Industries Co.,Ltd" | Çin Xalq Respublikası | pestisid | Fumiqant | Aluminium phosphide | 56 | % | 003107 | 31.01.2023 | 31.01.2028 | Çin Xalq Respublikası | 4 tablet/1 ton toxuma | Toxum | Anbar zərərvericiləri | Anbar şəraitində toxumun dərmanlanması tövsiyyə olunur | - /1 | 7(3) |
| 987 | Sondelect (EC) | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş" | Türkiyə Respublikası | pestisid | herbisid | Clethodim | 116,2 | g/L | 003110 | 01.02.2023 | 01.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,65 L/ha | Soğan | Alaq otları | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | - /1 | 7(3) |
| 988 | Eurogold (SC) | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş" | Türkiyə Respublikası | pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 003111 | 01.02.2023 | 01.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,35 L/100 L suya | Pomidor (İstixana) | Hörümçək gənəciyi | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 989 | Cutteng (SE) | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş" | Türkiyə Respublikası | pestisid | herbisid | 2,4 D Ethylhexyl Ester (EHE)+Florasulam | 452,42+6,25 | g/L + g/L | 003112 | 01.02.2023 | 01.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/ha | Buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 990 | Beststok 330 E (EC) | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş" | Türkiyə Respublikası | pestisid | herbisid | Pendimethalin | 330 | g/L | 003113 | 01.02.2023 | 01.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 5,0 L/ha | Soğan | Birlapalı və ikilapalı alaq otlarına | Əkindən öncə və vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 991 | Pira Clean | "Pirakesht Chemical Co" | İran İslam Respublikası | Pestisid | herbisid | Bispyribac Sodium | 40 | % | 003114 | 02.02.2023 | 02.02.2028 | İran İslam Respublikası | 0,16 L/ha | Soya | Nazik və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 992 | Şansitek, EK (Шанситек, КЭ) | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Abamectin | 18 | g/L | 003115 | 03.02.2023 | 11.02.2027 | Rusiya Federasiyası | 0,25 L/ha | Pomidor (İstixana) | Tor gənəsi | vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 993 | Karişans , SPD (Каришанс, Вдг) | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | herbisid | Triflusulfuron-methyl | 500 | q/kq | 003116 | 03.02.2023 | 11.02.2027 | Rusiya Federasiyası | 30 q/ha (200-300 l/ha işçi məhlul) | Çuğundur | Alaq otları | bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 994 | Şansil EK | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | fungisid | Tebuconazole | 250 | g/L | 003117 | 03.02.2023 | 09.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,75-1,0<br>1,5 | Payızlıq buğda Qarğıdalı | Pirenoforoz, qonur pas, sarı pas, septarioz Pas | Vegetasiya dövründə bayraq yarpağın əmələ gəlməsi mərhələsində və ya sünbüllənmənin başlanğıcında İşçi məhlul sərfiyyatı 300 l/ha | 30/1-2 | 3( 0) |
| 995 | Betaşans Dabl, EK | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | herbisid | Desmedipham+Phenmedipham | 160+160 | g/L + g/L | 003118 | 03.02.2023 | 09.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,0<br>1,5<br>3 | Şəkər çuğunduru | Qara tərə növləri da daxil olmaqla birillik ikilapəli alaq otları | Alaq otlarının:<br>İlaşa mərhələsində (birinci, ikinci və üçüncü dalğa üzrə); 2-4 yarpaq mərhələsində (birinci və ikinci dalğa üzrə); 4 əsl yarpaq mərhələsində və ya alaqların böyüməsinin ilkin mərhələsində çiləmə. İşçi məhlul sərfiyyatı 100-200 l/ha | 60/3<br>60/2<br>60/1 | 3( 0) |
| 996 | Qaloşans, EK | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | herbisid | Haloxyphop-p-Methyl | 104 | g/L | 003119 | 03.02.2023 | 09.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,5<br>1 | Şəkər çuğunduru Günəbaxan | Birillik taxıl fasiləsi alaqları, (setariya növləri, toyuq darısı) Çoxillik taxıl fasiləsi alaqları (sürünən ayrıq) | Alaq otlarının: Aktiv böyüma dövründə (2-6 yarpaq mərhələsindən kollanmanın əvvəlinə qədər) çiləmə, Sürünən ayrığın 10-15 sm hündürlüyü zamanı çiləmə, İşçi məhlul sərfiyyatı 200-300 L/ha | 60/1 | 3( 0) |
| 997 | Şanstrel 300, SM | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | herbisid | Clopyralid | 300 | g/L | 003120 | 03.02.2023 | 04.12.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,5 l/ha<br>1,0 l/ha | Şəkər çuğunduru, buğda, qarğıdalı | Birlik və bazi çoxillik ikilapəli alaqlar | Madani bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizanin apanilmasi daha səmərəlidir. | 35/1 | 7(3) |
| 998 | Karatoşans , EK | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 003121 | 03.02.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,15 l/ha<br>0,2 l/ha<br>0,5 l/ha<br>0,3 l/ha<br>0,5 l/ha<br>0,4-0,8 l/ha | Şəkər çuğunduru<br>Buğda,arpa<br>Tut<br>Pambıq<br>Üzüm<br>Alma,nar | Mənənələr<br>Taxıl böcəyi<br>Tut odlucası<br>Mənənələr<br>Yarpaqbükənlər<br>Meyvəyeyənlər,yastıcalar | Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir | 18/2 | 7(3) |
| 999 | Şansügen, SE | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-P-ethyl+ Antidot-Cloquintocet-Mex | 69+34,5 | g/L + g/L | 003122 | 03.02.2023 | 04.12.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,9 l/ha | Buğda,arpa, çovdar, qarğıdalı | Birillik və bazi çoxillik ikilapəli alaqlar | Madani bitkinin 2-4 yarpaq,alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizanin apanilmasi daha səmərəlidir. | 35/1 | 7(3) |
| 1000 | İmidaşans, SHK | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 200 | g/L | 003123 | 03.02.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,15 l/ha<br>0,25 l/h<br>1,5 l/ha<br>0,2 l/ha<br>0,3 l/ha | Kartof<br>Buğda<br>Xiyar, pomidor<br>Pambıq<br>Nar | Kolarodo böcəyi<br>Taxıl böcəyi<br>Ağqanadlı<br>Mənənələr<br>Yastıcalar | Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir | 18/2 | 7(3) |
| 1001 | Acme 150 SC | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 150 | g/L | 003124 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,45 L/ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1002 | Daystar (EC) | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha cypermethrin | 100 | g/L | 003125 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1003 | Belair 2.5 EC | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 003126 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/ha | Xiyar (İstixana) | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1004 | Samuray 5 EC | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 003127 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1005 | Ekoprid 600 FS | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 600 | g/L | 003128 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 3,5 L/ton | Kartof | Məftil qurdu, danadiş | Səpindənqabaq toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 1006 | Ekoprid SC 350 | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 003129 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,1 L/ha | Pomidor | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1007 | Pacman 20 EC | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Nematosid | Ethoprophos | 200 | g/L | 003130 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 5,5 L/ha | Pomidor | Fir nematodu | Şitillər əkilməmişdən əvvəl dərmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 1008 | Ruler 70 WP | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 003131 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,7 kq/ha | Kartof | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 40/1-2 | 7(3) |
| 1009 | Mantrak (SE) | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) +Florasulam | 452,42+ 6,25 | g/L+g/L | 003132 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,7 L/ha | Buğda | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 1010 | Hercai (SC) | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | g/L | 003133 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | Pomidor (İstixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1011 | Massfoset (WP) | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-Al | 80 | % | 003134 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,2 kq/ha | Xiyar (İstixana) | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1012 | Masscan 79 (WP) | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 64+8 | %+% | 003135 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,6 kq/ha | Kartof | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1013 | Masscozeb (WP) | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 003136 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,2 kq/ha | Soğan | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 28/2 | 7(3) |
| 1014 | Dalia 400 SC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bispyribac-sodium | 420 | g/L | 003137 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 5-6 ml/10 L su | Çaltik | Alaq otları | Alaq otlarının 5-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 1015 | Hektanil (WP) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 75 | % | 003138 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 200 q/100 L su | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26/2 | 7(3) |
| 1016 | Titan EC | "Agria S.A" | Bolqarıstan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole | 250 | g/L | 003140 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Bolqarıstan Respublikası | 0,5 L/ha | Buğda | Pas<br>Unlu şeh<br>Septorioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 40/1-2 | 7(3) |
| 1017 | Biseps Qarant, EC (Бисепс Гарант, КЭ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Desmedipham<br>Phenmedipham<br>Ethodumesate | 70<br>90<br>110 | g/L<br>g/L<br>g/L | 003141 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,0 L/ha<br>1,5 L/ha | Çuğundur | Birillik ikilapəli alaqlar<br>Birillik taxıl fasiləsi alaqları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 60/3<br>60/2 | 7(3)<br>7(3) |
| 1018 | Borey, SC (Борей, СК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid<br>Lambda-cyhalothrin | 150<br>50 | g/L<br>g/L | 003142 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,08-0,12 L/ha<br>0,15-0,25 L/ha | Buğda<br>Kartof,pomidor<br>Alma<br>Gavalı, Üzüm | Taxıl böcəyi, böcəklər,manana,trips Kolorado böcəyi<br>Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər<br>Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 28/2<br>20/2<br>30/2<br>20/2<br>20/2<br>10/2 | 7(3) |
| 1019 | Herald, WSC (Геролд, ВСК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 240 | g/L | 003144 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,5-1,0 L/ha | Alma<br>Gavalı<br>Üzüm | Meyvəyeyənlər Yarpaqbükənlər<br>Meyvəyeyənlər<br>Yarpaqbükənlər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 1020 | Magnum, WDG (Магнум, ВДГ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Metsulfuron-methyl | 600 | g/kg | 003145 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 8q/ha | Taxıl | Birillik ikilapalı və 2,4 d-ya davamlı bazi ikilapalı alaqlar | Birillik alaqların 2-4 yarpaq, çoxillik alaqların rozet yarpaq mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 1021 | Metaxyl,WP (Метаксил, СП) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb<br>Metalaxyl | 640<br>80 | g/kg<br>g/kg | 003146 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 2,0-2,5 kq/ha | Soğan<br>Pomidor | Perenosporoz<br>Fitoftoroz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3<br>10/3 | 7(3) |
| 1022 | Miura, EC (Миура, КЭ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-p-ethyl | 125 | g/L | 003147 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,4-0,8 L/ha<br>0,8-1,2 L/ha | Soğan, çuğundur | Birillik taxıl fasiləsi alaqları<br>Çoxillik taxıl fasiləsi alaqları | Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 60/1 | 7(3) |
| 1023 | Ordan, WP (Ордан, СП) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Copper oxychloride<br>Cymoxanil | 689<br>42 | g/kq<br>g/kq | 003148 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 2,0-3,0 kq/ha | Soğan<br>Üzüm | Perenosporoz<br>Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 | Sharpey, ME (Шарпей, МЭ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 25 | % | 003149 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,4 L/ha | Otlaqlar<br>Kartof | Çayirtkakimilər<br>Kartof böcəyi | Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1 | 7(3) |
| 1025 | Tanrek, WSC (Танрек, ВРК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 200 | g/L | 003150 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,1 L/ha<br>0,05-0,075 L/ha | Kartof<br>Otlaqlar | Kolorado kartof böcəyi<br>Çayirtkakimilər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə<br>Zərərvericinin sürfə mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1<br>14/1 | 7(3) |
| 1026 | Vial TrusT, SC (Виал ТрасТ, ВСК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Thiabendazol<br>Tebuconazole | 80<br>60 | g/L<br>g/L | 003151 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,3-0,4 L/ton<br>0,3-0,4 L/ton<br>0,4-0,5 L/ton | Payızlıq buğda<br>Payızlıq covdar<br>Günəbaxan | Bark sürma, qonur pas, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri<br>Gövdə çürüməsi, helmintosporioz və fuzarioz kök çürümələri<br>Fomopsis, ağ və boz çürümə, toxumun kiflənməsi | Səpinə qədər toxumun dərmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 5(2) |
| 1027 | Tornado 500, SL (Торнадо 500, ВР) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate acid (isopropylamine salt) | 500 | g/L | 003152 | 07.02.2023 | 07.02.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,5-3,0 L/ha<br>3,0-5,5 L/ha<br>1,5-3,0 L/ha<br>2,0-5,0 L/ha | Meyvə, üzüm<br>Meyvə<br>Üzüm<br>Tərəvəz, kartof və digər bitkilərin akini üçün | Birillik taxıl fasiləsi və ikiləpəli alaqlar;<br>Çoxillik taxıl fasiləsi və ikiləpəli alaqlar;<br>Birillik və çoxillik taxıl fasiləsi və ikiləpəli alaqlar | Yazda və yayda alaq otunun vegetasiya mərhələsində;<br>Əkinçəbağı sahədəki alaq otlarına çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 1028 | Indox Super SC | "Shenzhen King Quenson Industry Co.Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate, Indoxacarb | 50, 150 | g/L, g/L | 003153 | 09.02.2023 | 09.02.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0.3-0.6 L/ ha | Pambıq | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 1029 | Previcur Energy SL 840 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl, Propamocarb | 310, 530 | g/L, g/L | 003156 | 09.02.2023 | 09.02.2028 | Almaniya Federativ Respublikası | 2 L/ ha | Pomidor | Fitoftoroz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 0(0) |
| 1030 | Hekvidor Oil (SC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Parafin Oil (Cas № 74869-22-0)+ Imidacloprid | 704+4 | g/L+g/L | 003164 | 13.02.2023 | 13.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2.5 L/ 100 L suya | Alma | Yastıcalar | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 90/1-2 | 7(3) |
| 1031 | Hek-Gibb (SL) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Giberellic Acid | 20 | g/L | 003165 | 13.02.2023 | 13.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 90 ml/ 100 L suya | Albalı | - | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/3 | 0(0) |
| 1032 | Hektaş Biella (SC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil+Tebuconazole | 200+125 | g/L+g/L | 003166 | 13.02.2023 | 13.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 40-50 qr/100 L | Alma, armud | Damğıl | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 26/2 | 7(3) |
| 1033 | Selest Top 312.5, FS ( Cenect Ton 312.5, K.C.) | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid / Fungisid | Difenoconazole+Fludioxonil+ Thiamethoxam | 25+25+262.5 | g/L+g/L+g/L | 003167 | 14.02.2023 | 14.02.2028 | Macarıstan Respublikası | 4 L/ 1 ton toxuma | Kartof | Rizoktonioz | Əkinçəbağı kök yumrularının dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/3 | -(-) |
| 1034 | Force 1,5 G | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Tefluthrin | 15 | q/kq | 003168 | 14.02.2023 | 14.02.2028 | İspaniya Krallığı | 10-15 | Kartof, qarğıdalı, tərəvəzlər | Rizoktonioz | Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 21/1-2 | 7(3) |
| 1035 | Bravo 500 SC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 500 | g/L | 003169 | 14.02.2023 | 14.02.2028 | Macarıstan Respublikası | 2.2-3.0 | Kartof, pomidor | Fitoftora | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3 | 10(3) |
| 1036 | İnsegar 25 WG | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Fenoxycarb | 250 | q/kq | 003170 | 14.02.2023 | 14.02.2028 | İtaliya Respublikası | 0.6 | Alma | Meyvəyeyənlər | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1037 | Arcade 880 EC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin+Prosulfocarb | 80+800 | g/L+g/L | 003171 | 14.02.2023 | 14.02.2028 | Belçika Krallığı | 4.0-5.0 | Kartof | Birillik bitkipəli və və ikiləpəli alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1038 | Maxim XL 035 FS | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil+Metalaxyl-M | 25+10 | g/L+g/L | 003172 | 14.02.2023 | 14.02.2028 | Fransa Respublikası | 2.0-2.5 | Tərəvəz | Kök çürüməsi | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 26/ 1-2 | 7(3) |
| 1039 | Ovipron 2000 (EC) | "Cerexagri S.A.S." | Fransa Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Paraffin Oil (Cas № 97862-82-3) | 800 | g/L | 003177 | 16.02.2023 | 09.04.2026 | Fransa Respublikası | 1,5-2,0 L/ 100 L suya | Meyvə ağacları | Qanalar<br>Mənanalar<br>Yaşıllar | Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərəvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 15/3 | 7(3) |
| 1040 | Karate Zeon 5 CS | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-Cyhalothrin | 5 | % | 003192 | 17.02.2023 | 21.10.2025 | Belçika Krallığı | 0,4<br>0,1-0,15<br>0,1 | Alma<br>Alma<br>Pomidor | Meyvəyeyən Yarpaqbükən<br>Alma çiçəkyeyəni<br>Kolorado kartof böcəyi | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20(2)<br>20(1)<br>30(2) | 7(3) |
| 1041 | Cidely Top 140 DC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyflufenamid+Difenoconazole | 1.5+12.5 | %+% | 003193 | 17.02.2023 | 21.10.2025 | Fransa Respublikası | 0,6 | Alma | Damğıl | Vegelasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20(2) | 7(3) |
| 1042 | Alto Super 330 EC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyproconazole+Propiconazole (Propikonazol) | 8+25 | %+% | 003194 | 17.02.2023 | 21.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,5-0,75 | Şəkər çuğunduru | Serkosporoz<br>Unlu şeh<br>Fomoz<br>Altemarioz | Vegelasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30(2) | 7(3) |
| 1043 | Topas 100 EC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 10 | % | 003195 | 17.02.2023 | 21.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,3-0,4<br>0,15-0,25 | Alma<br>Üzüm | Unlu şeh<br>Oidium | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 20(4) | 7(3) |
| 1044 | Switch 62.5 WG | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil+Fludioxonil | 37.5+25 | %+% | 003196 | 17.02.2023 | 21.10.2025 | Macarıstan Respublikası | 1.0-1.2 | Üzüm | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2) | 7(3) |
| 1045 | Fusilade Forte 150 EC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Herbisid | Fluazifop-P-Butyl | 15 | % | 003197 | 17.02.2023 | 21.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,75-1,0<br>1,5-2,0 | Çuğundur<br>Kələm<br>Soğan<br>Kartof | Birillik və çoxillik taxıl fasiləsi alaqları | Alaqların 2-4 yarpaq, hündürlüyünün 10-15 sm olduğu vaxt mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 1046 | Rexus | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Mandipropamid | 25 | % | 003198 | 17.02.2023 | 21.10.2025 | Böyük Britaniya Krallığı | 0,6 | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya dövründə tətbiq edilir | 10(2) | 7(3) |
| 1047 | Actellic 50 EC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Pirimiphos-Methyl | 50 | % | 003199 | 17.02.2023 | 21.10.2025 | Macarıstan Respublikası | 1,0<br>3,0 | Buğda<br>Üzüm | Taxıl bağacığı, manana yarpaq Bükəsəsəri | Vegetasiya dövründə tətbiq edilir | 20(1) | 7(3) |
| 1048 | Actara 25 WG | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Thiomethoxam | 25 | % | 003201 | 17.02.2023 | 21.10.2025 | Avstriya Respublikası | 0,06-0,08<br>0.06 | Buğda<br>Kartof | Taxıl bağacığı,taxıl hafi<br>Kolorado kartof böcəvi | Vegetasiya dövründə tətbiq edilir | 20(2) | 7(3) |
| 1049 | Geoxe 50 WG | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil | 50 | % | 003202 | 17.02.2023 | 26.10.2025 | İsveçrə Konfederasiyası | 50 qr 10 l suya 100 m^2 | Meyvə saxlanılan anbar | Anbarda meyvə xəstəlikləri | Anbar şəraitində xəstəliklərin yayılmasına qarşı istifadə edilməsi məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 1050 | Ridomil Gold MZ 68 WG | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl-M | 640+40 | q/kq+q/kq | 003203 | 17.02.2023 | 18.12.2025 | Almaniya Federativ Respublikası | 2,5 | Üzüm<br>Kartof | Mildium<br>Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21(4)<br>14(3) | 7(3) |
| 1051 | Thiovit Jet 80 WG | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Sulphur (Kükürd) | 800 | q/kq | 002204 | 17.02.2023 | 05.03.2027 | Fransa Respublikası | 4,0 kq/ha | Üzüm | Oidium,qanalar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/4-6 | 4(1) |
| 1052 | Quadris 250 SC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Azoxsytirobin | 250 | g/L | 003205 | 17.02.2023 | 06.04.2027 | Rusiya Federasiyası | 0,6-0,8 L/ha | Üzüm | Mildiu, Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/2 | 7(3) |
| 1053 | Vertimec 018 EC | "Syngenta Crop Protection AG" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 003206 | 17.02.2023 | 06.04.2027 | Almaniya Federativ Respublikası | 1,0-1,2 L/ha | Xiyar (istixana) | Qanalar, minalayıcılar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 1054 | Hektthiram Forte (WP) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiram | 80 | % | 003207 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 300 qr/ 100 kq toxum | Noxud | Antraknoz | Sapından qabaq toxumun dərmanlanması tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1055 | Cebir (SC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil, Metalaxyl | 12.5, 5 | g/L, g/L | 003208 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 5.0 L/ha | Pomidor, bibar | Kök çürüməsi | Şitillar köçürüldükdən sonra suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 35/2 | 7(3) |
| 1056 | Acs Bakır Hidroksit (DF) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide | 35 | % | 003224 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.8 kq/ha | Üzüm | Mildium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 5/2 |
| 1057 | Acs-Forte WP | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiram | 80 | % | 003225 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 150 g/100 L su | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1058 | Agnicor SC | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | g/L | 003226 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.5 L/ ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1059 | AGN-Captan 500 SC | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 500 | g/L | 003227 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 3.0 L/ ha | Pomidor | Altemarioz | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1060 | Agshine 50 WG | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 003228 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.4 kq/ ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 28/2 | 7(3) |
| 1061 | Alopec EC | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 003229 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.250 L/ ha | Xiyar | Qanalar | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 5(3) |
| 1062 | Ancora 5 EC | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 50 | g/L | 003230 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.2 L/ ha | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/2 | 7(3) |
| 1063 | Antalis 250 EC | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 003231 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.1 L/ ha | Armud | Damğıl | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1064 | Astragil (EC) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Quizalofop-P-Ethyl | 50 | g/L | 003232 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.0 L/ ha | Pomidor | Alaq otları | Alaq otlarının 3-4 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1065 | Best Stopper (SL) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate Ipa Salt | 480 | g/L | 003233 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 3.0 L/ ha | Alma bağı | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1066 | BlueMac-M 45 (WP) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 003234 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2.5 kq/ ha | Alma bağı | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1067 | Bluemax Bordolex (WP) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Maroon Slurry Equal To Metallic Copper | 20 | % | 003235 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.5 kq/ 100 L su | Alma bağı | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 3/2 |
| 1068 | Deltadoğ 25 EC | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 003236 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.1 L/ha | Alma bağı | Alma güvəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1069 | Magnesya SC | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 500 | g/L | 003237 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.8 L/ ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 5/3 |
| 1070 | Ningbo 25 EC | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 003238 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.2 L/ ha | Armud | Armud ballıcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7/3 |
| 1071 | Polyen 72 (WP) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb, Metalaxyl | 64, 8 | %, % | 003239 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2.5 kq/ ha | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 4/3 |
| 1072 | Potegon 20 (SP) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 003240 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.3 kq/ha | Pomidor (istixana) | İstixana Ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 17/2 | 3/2 |
| 1073 | Rhamses 20 WP | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Pyridaben | 20 | % | 003241 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.7 kq/ ha | Alma | Qonur gənəcik | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7/3 |
| 1074 | Shaolin 100 EC | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | g/L | 003242 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.2 L/ ha | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 26/2 | 7/3 |
| 1075 | Sorides (EC) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Imazalil | 500 | g/L | 003243 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.30 L/ha | Badımcan (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 5/3 |
| 1076 | Stin 80 WP | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosethyl -Al | 80 | % | 003244 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2.5 kq/ ha | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 5/3 |
| 1077 | Tunadis 100 (EC) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 003245 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.5 L/ ha | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 5/3 |
| 1078 | Yimacho Oil (SC) | "Astranova Tarım Ticaret Ve Sanayi A.Ş. " | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Paraffin Oil (Cas 8042-47-5), Imidacloprid | 704, 4 | g/L, g/L | 003246 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2.5 L/ 100 L su | Alma | Kaliforniya çanaqlı yastıcası | Erkən yazda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7/3 |
| 1079 | Hektaş Mentor (EC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 003247 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2.5 L/ ha | Armud | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 35-40/ 2 | 7/3 |
| 1080 | Pusula (SC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 240 | g/L | 003248 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.2 L/ ha | Xiyar (istixana) | İstixana Ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 4/2 |
| 1081 | Tasmet 50 WP | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Phosmet | 50 | % | 003249 | 17.02.2023 | 17.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.5 kq/ha | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25-30/2 | 7/3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | Trooper 72 WP | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl + Mancozeb | 8 + 64 | % | 003258 | 21.02.2023 | 21.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 2.5 kq/ ha | Üzüm<br>Pomidor<br>Kartof<br>Soğan | Mildiu<br>Fitoftora<br>Alternarioz<br>Fitoftora<br>Alternarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | 15 / 3 | 7 (3) |
| 1083 | Ecolia 300 EC | "Adama Makhteshim Ltd." | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole + Prothioconazole | 125 + 175 | g/L + g/L | 003261 | 22.02.2023 | 05.02.2025 | İsrail Dövləti | 1.2 L/ha | Şəkər çuğunduru | Serkosporioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | 20 / 2 | 7(3) |
| 1084 | Magan (EC) | "Adama Makhteshim Ltd." | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Prothioconazole | 250 | g/L | 003262 | 23.02.2023 | 05.02.2025 | İsrail Dövləti | 1,0 l/ha 350-400 lt su ilə | Noxud | antraknoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | 20 / 1-2 | 7(3) |
| 1085 | Score 250 EC | "Syngenta Crop Protection Ag" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 25 | % | 003268 | 22.02.2023 | 21.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0.15-0.2 | Alma | Unlu seh | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 20(3) | 7(3) |
| 1086 | Miravis Duo | "Syngenta Crop Protection Ag" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole + Pydiflumetofen | 12.5 + 7.5 | % + % | 003269 | 22.02.2023 | 26.10.2025 | İsveçrə Konfederasiyası | 0,7 L / ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 20(2) | 7(3) |
| 1087 | Brace Forte (EC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Fluazifop-P-Butyl | 150 | g/L | 003270 | 23.02.2023 | 23.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.8 L / ha | Pomidor | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1088 | East Star 24 EC | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelieri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-Propargyl + Cloquintocet- Mexyl (Safener) | 240 + 60 | g/L + g/L | 003271 | 24.02.2023 | 24.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.2 L / ha | Buğda | Birlləpalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | 30 / 1-2 | 7(3) |
| 1089 | Matabele WG | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelieri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-Methyl | 50 | % | 003272 | 24.02.2023 | 24.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 qr / 100 L suya | Xiyar (istixana) | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | 20 / 2 | 7(3) |
| 1090 | Danus 50 WG | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelieri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 003273 | 24.02.2023 | 24.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 450 qr / ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | 28 / 2 | 7(3) |
| 1091 | Northstar 40 EC | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelieri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Nematosid | Fenamiphos | 400 | g/L | 003274 | 24.02.2023 | 24.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 37.5 L / ha | Pomidor | Fir nematodu | Şitillər əkilmişdən əvvəl darmanlama üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur | 20 / 1-2 | 7(3) |
| 1092 | Ergamon SL | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelieri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Ethephon | 480 | g/L | 003275 | 24.02.2023 | 24.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 3.0 L / ha | Pomidor | _ | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | 10 / 1-2 | 7(3) |
| 1093 | Octopus 40 EC | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelieri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 003276 | 24.02.2023 | 24.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.0 L / ha | Xiyar (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | 14 / 1-2 | 7(3) |
| 1094 | Voyage 50 WP | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelieri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil | 50 | % | 003277 | 24.02.2023 | 24.02.2028 | Türkiyə Respublikası | 52 qr / 100 L suya | Xiyar (istixana) | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə edilir | 14 / 2 | 7(3) |
| 1095 | Aliot, EC (Алиот, КЭ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsekto-akarisid | Malathion | 570 | g/L | 003290 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,2 L / ha | Pomidor | Ağqanadlı, gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur | 21 / 2 | 7(3) |
| 1096 | Balerina, SE(Балерина, СЭ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | 2,4 D + Florasulam | 410 + 7,4 | g/L + g/L | 003291 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,5 L / ha | Qarğıdalı | Alaq otları | Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60 / 1 | 8 / 4 |
| 1097 | Bomba ,WG (Бомба, ВДГ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Florasulam + Tribenuron-Methyl | 187 + 563 | g/kq + g/kq | 003292 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,03 kq / ha | Buğda | Birillik ikilləpalı alaq otları | Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60 / 1 | 7(3) |
| 1098 | Borey Neo, SC(Борей Нео, СК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Alpha-cypermethrin + Clothianidin + Imidacloprid | 125+50+100 | g/L + g/L + g/L | 003293 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,12 L / ha | Şəkər çuğunduru | Çuğundur biraciyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur | 20 / 2 | 7(3) |
| 1099 | Breyk, ME (Брейк, МЭ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-Cyhalothrin | 100 | g/L | 003294 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 0,2 L / ha | Üzüm | Üzüm salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur | 10 / 2 | 7(3) |
| 1100 | Cirocco, EC (Сирокко, КЭ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 003295 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,2 L / ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur | 30 / 2 | 7(3) |
| 1101 | Dublon Gold, WG(Дублон Голд, ВДГ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron + Thifensulfuron-methyl | 600<br>150 | g/kq + g/kq | 003296 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 65 g / ha | Qarğıdalı | Alaq otları | Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60 / 1 | 7(3) |
| 1102 | Gaitan, EC( Гайтан, КЭ) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | g/L | 003297 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 3,5 L / ha | Soğan | Alaq otları | Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60 / 1 | 7(3) |
| 1103 | Herbitox, SL (Гербитокс, ВРК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | MCPA | 500 | g/L | 003298 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,5 L / ha | Buğda | Birillik ikilləpalı alaq otları | Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60 / 1 | 7(3) |
| 1104 | Kumir , SC (Кумир, СК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Copper Sulphate | 345 | g/L | 003299 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 5 L / ha | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur | 20 / 3 | 7(3) |
| 1105 | Lazurit, WP (Лазурит, СП) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 700 | g/kq | 003300 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,4 kq / ha | Pomidor | Alaq otları | Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 45 / 1 | 7(3) |
| 1106 | Ordan MC, WP (Ордан МЦ, СП) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil + Mancozeb | 80 + 640 | g/kq + g/kq | 003301 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 2,5 kq / ha | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə təbiqi tövsiyə olunur | 10 / 3 | 7(3) |
| 1107 | Paradox, SL (Парадокс, ВРК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Imazamox | 120 | g/L | 003302 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 0.4 L / ha | Günəbaxan | Alaq otları | Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60 / 1 | 7(3) |
| 1108 | Tabu Neo, SC (Табу Нео, СК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Clothianidin + Imidacloprid | 100 + 400 | g/L + g/L | 003303 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 8,0 L / ton toxuma | Qarğıdalı | Məftil qurdları, danadişi | Sapındanqabaq toxumun darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | - / 1 | 7(3) |
| 1109 | Vial Trio,SC (Виал Трио, ВСК) | "Avqust" SC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyproconazole + Prochloraz + Thiabendazole | 5 + 120 + 30 | g/L + g/L + g/L | 003304 | 02.03.2023 | 02.03.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,2 L / 1 ton toxuma | Buğda | Bark sürmə | Sapındanqabaq toxumun darmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | - / 1 | 0(0) |
| 1110 | Prişans, SE (Пришанс, СЭ) | "Şans Enterpryz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | 2,4 D acid (2-ethylhexyl ester) + Florasulam | 300 + 6.25 | g/L + g/L | 003306 | 07.03.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,6 L/ ha | Buğda<br>arpa,<br>çovdar<br>qarğıdalı | Birillik və bazi çoxillik ikilləpali alaqlar | Alaq otlarının ilkin böyümə mərhələsində mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0 / 1 | 7(3) |
| 1111 | Şansti, SHD (Шансти, ВДГ) | "Şans Enterpryz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Thifensulfuron-methyl | 750 | g/kq | 003307 | 07.03.2023 | 04.12.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,01 kq / ha | Soya<br>Buğda,<br>arpa,<br>qarğıdalı | Birillik və çoxillik ikilləpali alaqlar | Alaq otlarının 8-10 yarpaq, 10-12 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 35 / 1 | 7(3) |
| 1112 | Skoroşans,EC (Скорошанс, КЭ) | "Şans Enterpryz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 003308 | 07.03.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,25 L / ha<br>0,4 L/ha<br>0,2 L/ha<br>0,3-0,35 | Alma,armud<br>Kartof,pomidor<br>Şaftalı, ərik, albalı, gilas<br>nar | Damğıl, unlu şeh<br>Alternarioz<br>Monilioz<br>klasterosporiz<br>Fomoz | Vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 12 / 3 | 7(3) |
| 1113 | Şanstar, SHD (Шанстар, ВДГ) | "Şans Enterpryz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron-methyl | 750 | g/kq | 003309 | 07.03.2023 | 04.12.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,030 kq / ha | Buğda,<br>arpa,<br>çovdar,<br>qarğıdalı | Birillik və bazi çoxillik ikilləpali alaqlar | Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 35 / 1 | 7(3) |
| 1114 | QlifoşansSuper, SM (Глифошанс Супер, ВР) | "Şans Enterpryz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate acid (Potassium salt) | 540 | g/L | 003310 | 07.03.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 3,2 L / ha<br>1-2.5 L /ha<br>2,8 L / ha | Kartof<br>Müxtəlif bitkilərin əkini üçün nəzərdə tutulmuş sahələr(dənli, paxlalı, texniki bitkilər)<br>pambıq | Birillik və çoxillik alaq otları | Əkindən əvvəl yazda alaqların aktiv inkişaf fazasında, alaq otlarının boyunun 6-8 sm olan dövri preparat tətbiq edilir (məsələn bitki qorunmaqla) | - / 1 | 7(3) |
| 1115 | Magnolia Süper (SL) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D + Dicamba | 344+120 | g/L+g/L | 003318 | 09.03.2023 | 09.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L / ha | Buğda | Alaq otları | Alaq otlarının 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiq tövsiyə edilir | 35 / 1 | 7(3) |
| 1116 | Veltnor SC 350 | "Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 350 | g/L | 003323 | 09.03.2023 | 29.09.2025 | Türkiyə Respublikası | 0,25-0,35 L / ha | Alma | Manənələr<br>Ballıca | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20 / 2 | 7(3) |
| 1117 | Versal 25 EC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Carbosulfan | 250 | g/L | 003334 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.5 l/ha | Alma | Yastıcalar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/1 | 15/7 |
| 1118 | Twister 5 EC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 003337 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | Pambıq | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1 | 7(3) |
| 1119 | ABG SUNN (VP) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | 1-Methylcyclopropene | 3.3 | % | 003338 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,043 mL / 1 m2 | Meyvə | - | Anbar şəraitində meyvənin fumiqasiyası | - / 1 | 7(3) |
| 1120 | Applore 25 EC | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 003339 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L / ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20 / 3 | 7(3) |
| 1121 | Başaran M (SL) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone + MCPA | 250 + 125 | g/L + g/L | 003340 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,2 L / ha | Çəltik | Alaq otları | Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | - / 1 | 7(3) |
| 1122 | Baytore 40 SL | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | İmazamox | 40 | g/L | 003341 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L / ha | Günəbaxan | Alaq otları | Alaq otlarının 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | - / 1 | 7(3) |
| 1123 | Best Forte 80 WP | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiram | 80 | % | 003342 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 160 qr / 100 L su | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30 / 3 | 7(3) |
| 1124 | Bestgol 20 EC | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Esfenvalerate | 200 | g/L | 003343 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,6 L / ha | Pambıq | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21 / 2 | 7(3) |
| 1125 | Bestugan (SC) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Spiromesifen | 240 | g/L | 003344 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 mL / 100 L Su | Badımcan (İstixana) | Hörümçək gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14 / 2 | 7(3) |
| 1126 | Bestutax (SC) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione+Nicosulfuron | 75+30 | g/L+g/L | 003345 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,2 L / ha | Qarğıdalı | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | - / 1 | 7(3) |
| 1127 | Big-Mech (EC) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lufenuron | 50 | g/L | 003346 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,22 L / ha | Qarğıdalı | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26 / 2 | 7(3) |
| 1128 | Canpirin 35 (DS) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl | 35 | % | 003348 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 520 qr / 100 kq toxum | Günəbaxan | Plasmopara | Sapından əvvəl toxumun darmanlanması tövsiyə edilir. | - / 1 | 3(1) |
| 1129 | Casaro 50 (SC) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 500 | g/L | 003349 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,2 L / ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21 / 3 | 7(3) |
| 1130 | Chillinger 200 EC | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cyhalofop-butyl | 200 | g/L | 003350 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,6 L / ha | Çəltik | Alaq otları | Alaq otlarının 2-4 yarpaq inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | - / 1 | 7(3) |
| 1131 | Efedor 350 (SC) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 350 | g/L | 003351 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L / ha | Pomidor (İstixana) | İstixana ağqanadlısı | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14 / 2 | 4(3) |
| 1132 | Fenthoxan (SL) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone | 480 | g/L | 003353 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,0 L / ha | Soğan | Birillik birlapalı və ikilapalı alaq otları | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | - / 1 | 7(3) |
| 1133 | Goldamiral 5 (EC) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 50 | g/L | 003354 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L / ha | Badımcan (İstixana) | İstixana ağqanadlısı | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14 / 2-3 | 7(3) |
| 1134 | Gondolier 240 (EC) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 003355 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,75 L / ha | Soğan | Birillik birlapalı və ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | - / 1 | 7(3) |
| 1135 | Kambit (WG) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim - Methyl | 50 | % | 003356 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kq / ha | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25 / 3 | 7(3) |
| 1136 | Lobbi (EC) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Benoxacor (Safener) + S-Metolachlor | 45 + 915 | g/L + g/L | 003357 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,6 L / ha | Pambıq | Bir illik alaq otları | Sapından qabaq torpağa tətbiqi tövsiyə edilir | - / 1 | 5(3) |
| 1137 | Perspecta 240 (SC) | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Bifenazate | 240 | g/L | 003358 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,6 L / ha | Pomidor (İstixana) | Gənələr | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14 / 2 | 3(2) |
| 1138 | Resumme FS 600 | "Agrobest Grup Tarim İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 600 | g/L | 003359 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 6,5 L / 1 ton toxum | Qarğıdalı | Məftil qurdu, Danadişi | Sapından qabaq toxumun darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur | - / 1 | 0(0) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | Rockypso (OD) | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 240 | g/L | 003360 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L / ha | Pomidor (İstixana) | İstixana ağqanadlısı | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14 / 2-3 | 3(3) |
| 1140 | Saf-T-Side | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsekto-akarisid | Paraffin Oil (CCAS 64742-55-8) | 700 | g/L | 003361 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,7 L / 100 L su | Alma | Qırmızı meyvə gənəsi, Kalifornİya çanaqlı vəsticası | Zərərvericilərin çıxlama fazasına qarşı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | - / 1 | 7(3) |
| 1141 | Seldony 20 (WP) | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsekto-akarisid | Tebufenpyrad | 20 | % | 003362 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,4 kq/ha | Xiyar (İstixana) | Hörümçək gənəcəyi | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14 / 2 | 7(3) |
| 1142 | Soufrex EC | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prochloraz | 450 | g/L | 003363 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,2 L/ha | Arpa | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30 / 2 | 7(3) |
| 1143 | Vurgaren SL | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Hymexazole | 360 | g/L | 003364 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,0 L/ ha 1000 L su | Pomidor (İstixana) | Kök çürüməsi | Damcı suvarma suyu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14 / 2 | - C1423/ - |
| 1144 | Blue Bordo Disperss WG | "Cerexagri S.A.S." | Fransa Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallic Copper Equivalent To Bordeaux Mixture | 20 | % | 003365 | 14.03.2023 | 09.04.2026 | Fransa Respublikası | 1,5 kg/ 100 L su | Meyvə ağacları | Damğıl | Vegetasiya dövründə zərərli orqanizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədəuyğundur | 15 / 2 | 7(3) |
| 1145 | Yoksorrun 5 EC | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 003366 | 14.03.2023 | 14.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | Xiyar (İstixana) | Hörümçək gənəciyi | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14 / 2 | 7(3) |
| 1146 | Talendo EC | "Corteva Agriscience De France S.A.S." | Fransa Respublikası | Pestisid | Fungisid | Proquinazid | 200 | g/L | 003373 | 15.03.2023 | 16.07.2025 | Fransa Respublikası | 0,24-0,36 L/ha<br>0,25 L/ha | Üzüm<br>Buğda | Oidium<br>Unlu şeh | Vegetasiya müddətində zərərli orqanizm müşahidə edildikdə preparat tətbiq edilir | 14 / 2 | 7(3) |
| 1147 | Vydate L | "Corteva Agriscience De France S.A.S." | Fransa Respublikası | Pestisid | İnsektisid-nematosid | Oxamyl | 240 | g/L | 003374 | 15.03.2023 | 16.07.2025 | Fransa Respublikası | 0,4-0,8 L/ha | Xiyar<br>Pomidor<br>Bibər | Nematod<br>Nematod<br>Nematod | Əkinqabağı torpağa tətbiq edilməsi tövsiyə edilir | 14 / 1-2 | 7(3) |
| 1148 | Sierra 25 EC | "Internacional Quimica De Cobre S.A De C.V" | Meksika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 25 | % | 003375 | 17.03.2023 | 17.03.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0,26-0,38 L/ha | Üzüm | Yarpaqbükənlər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20 / 1 | 7(3) |
| 1149 | Spirox D (EC) | "Arysta Life Science Benelux SPRL" | Belçika Krallığı | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole + Spiroxamine | 50+400 | g/L + g/L | 003380 | 17.03.2023 | 17.03.2028 | Belçika Krallığı | 500 qr/1000 L suya | Üzüm | Mildiu, oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21 / 2 | 7(3) |
| 1150 | Acramite SC 480 | "Arysta Life Science Benelux SPRL" | Belçika Krallığı | Pestisid | Akarisid | Bifenazate | 480 | g/L | 003381 | 17.03.2023 | 17.03.2028 | Belçika Krallığı | 30 ml/100 L su | Alma | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26 / 2 | 7(3) |
| 1151 | Mass Tonik (SL) | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyicisi | Sodium Ortho Nitrophenolate + Sodium Para-Nitrophenolate + Sodium Penta-Nitroguaiacolate | 2+3+1 | g/L + g/L + g/L | 003397 | 29.03.2023 | 29.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 55 ml/100 L suya | Pomidor | - | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | - / 3 | 7(3) |
| 1152 | Bendis (SC) | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | g/L | 003399 | 29.03.2023 | 29.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 800 mL/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25 / 2 | 7(3) |
| 1153 | Colony 2 DS | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 2 | % | 003400 | 29.03.2023 | 29.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kq/ 1 ton toxum | Buğda | Toz və bərk sürmə | Səpindən qabaq toxumun darmanlanması məqsədilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20 / 1 | 5(2) |
| 1154 | Oscar 100 EC | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 003402 | 29.03.2023 | 29.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 300 mL/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20 / 3 | 7(3) |
| 1155 | Manifesto 24 EC | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 003403 | 29.03.2023 | 29.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,0 L/ha | Günəbaxan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 41 / 1 | 7(3) |
| 1156 | Korumagor 40 EC | "Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 003413 | 30.03.2023 | 30.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,0-2,5 mL/100 L su | Alma | Mənənələr<br>Yastıcalar<br>Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14 / 3 | 7(3) |
| 1157 | Koruma Bakir WP | "Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper | 50 | % | 003414 | 30.03.2023 | 30.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1. 0,3-0,5 kg / 100 L su<br>2. 0,4 - 0,8 kg / 100 L su | 1. Üzüm<br>2. Alma | 1. Mildiu<br>2. Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21 / 3 | 7(3) |
| 1158 | Kormicarb 50 WP | "Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pirimicarb | 50 | % | 003415 | 30.03.2023 | 30.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 50 g / 100 L suya | Alma | Mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26 / 2 | 7(3) |
| 1159 | Sacred 76 WG | "Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ziram | 76 | % | 003416 | 30.03.2023 | 30.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,200 g / 100 L suya<br>2.800 g / 100 L suya | 1. Şaftalı<br>2.Qoğal | 1. Yarpaq qıvrılması<br>2. Deşikli ləkəlilik | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25 / 2 | 7(3) |
| 1160 | Kor-prex Dodine 65 WP | "Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 65 | % | 003418 | 30.03.2023 | 30.03.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 g / 100 L suya | Soğan | Peronosporoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14 / 1-2 | 7(3) |
| 1161 | FASŞANS, EC (ФАСШАНС, КЭ) | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | g/L | 003419 | 05.04.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,15 L/ha<br><br>0,3 L/ha<br>0,2 L/ha<br>0,3 L/ha<br>0,3 L/ha<br>0,3 L/ha | Kartof<br><br>Buğda,arpa<br>otlaqlar,sahələr<br>Yonca<br>Pambıq<br>Üzüm<br>Alma, armud | Kolorado böcəyi<br><br>Taxıl böcəyi<br>Çəyirtkəkimilər<br>Mənənələr<br>Pambıq soxulcanı<br>Yarpaqbükənlər<br>Meyvəyeyənlər | Vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir | 18(2) | 7(3) |
| 1162 | Microthiol Special Disperss | "Cerexagri S.A.S." | Fransa Respublikası | Pestisid | Fungisid-akarisid | Sulfur | 80 | % | 003420 | 05.04.2023 | 21.04.2025 | Fransa Respublikası | 3,0-5,0 kg/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/1-5 | 4(1) |
| 1163 | Korpollo 500 SC | "Koruma Kor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Clofentezine | 500 | g/L | 003421 | 07.04.2023 | 07.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 250 g/ha | Üzüm | Unlu bit<br>2 nöqtəli qırmızı hörümcək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/2 | 10(4) |
| 1164 | Deltatec 2,5 EC | "Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 003423 | 07.04.2023 | 07.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,5 L/ha | Pomidor (istixana) | Pambıq soxulcanı<br>(Helicoverpa armigera) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1165 | Maklaim 5 SG | "Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 003424 | 07.04.2023 | 07.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 g/100 L suya | Pomidor (istixana) | Pambıq soxulcanı<br>(Helicoverpa armigera) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1166 | Makom 10 SC | "Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 003425 | 07.04.2023 | 07.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 35 ml/100 L suya | Xiyar (istixana) | 2 nöqtəli qırmızı hörümçək (Tetranychus urticae) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1167 | Nariv 25 EC | "Cansa Kimya Sanayi Və Ticaret Ltd Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 003436 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 35 ml/1000 m2 | Pomidor (istixana) | Pambıq soxulcanı<br>(Helicoverpa armigera) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-22/1-2 | 7(3) |
| 1168 | Amazon 2 DS | "Modern İnsectisides Limited" | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 2 | % | 003437 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Hindistan Respublikası | 160 qr/100 kq | Buğda toxumu | Bərk sürmə | Vegetasiya müddətində darmanlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1169 | Astral 50 WP | "Modern İnsectisides Limited" | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Phosmet | 50 | % | 003438 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Hindistan Respublikası | 160 qr/100 L suya | Armud ağacları | Armud bağcığı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25-30/1-2 | 7(3) |
| 1170 | Ziram Forte (WG) | "Modern İnsectisides Limited" | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ziram | 76 | % | 003439 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Hindistan Respublikası | 220 qr/100 L suya | Şaftalı | Yarpaq qıvrılması | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 1171 | Bi Plus (EC) | "Modern İnsectisides Limited" | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 003440 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Hindistan Respublikası | 120 ml/100 L suya | Alma | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 22/1-2 | 10(4) |
| 1172 | Prozamide 50 WP | "Modern İnsectisides Limited" | Hindistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Propyzamide | 50 | % | 003441 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Hindistan Respublikası | 4 L/ha | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1173 | Astar 50 WP | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tolclofos methyl+Thiram | 20+30 | % | 003442 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Çin Xalq Respublikası | 370 gr/100 kq toxuma | Pambıq | Kök çürüməsi | Pambıq toxumun sapindan əvvəl darmanlanmanın aparılması tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1174 | Pameo 70 WP | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 003443 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0.8 kg/ha | Soya | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 45/1-2 | 7(3) |
| 1175 | Captan 50% WP | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 003444 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Çin Xalq Respublikası | 2.6 kq/ 1 ton suya | Pomidor (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1176 | Tilteks 250 EC | "Evergreen Agrochemical CO., LTD. " | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole | 250 | g/L | 003445 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Çin Xalq Respublikası | 520 gr / 1000 L suya | Pomidor (istixana) | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1177 | Bordo Lux (WP) | "Evergreen Agrochemical CO., LTD." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux mixture equivalent to metallic copper | 20 | % | 003446 | 17.04.2023 | 17.04.2028 | Çin Xalq Respublikası | 6.2 kq/ 1 ton suya | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1178 | Masgard (SE) | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D Ethylhexyl Ester (EHE) + Florasulam | 452,42 + 6,25 | g/L | 003457 | 19.04.2023 | 19.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,75 L/ ha | Qarğıdalı | Dar və enli yarpaqlı alaq otlarına | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1179 | Roycaptan 50 WP | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 003458 | 19.04.2023 | 19.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 160 g/ 100 L suya | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 10(4) |
| 1180 | Roycel 75 SL | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyicisi | Chlormequat chloride | 750 | g/L | 003459 | 19.04.2023 | 19.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,5 L/ha | Payızlıq buğda | - | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/1-2 | 3(3) |
| 1181 | Roycoper 50 WP | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallic Copper Equivalent To Copper Hydroxide | 50 | % | 003460 | 19.04.2023 | 19.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 350 g/100 L su | Şaftalı | Yarpaq qıvrılması | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/2 | 7(3) |
| 1182 | Royfuron OD | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione + Nicosulfuron | 75+30 | g/L | 003461 | 19.04.2023 | 19.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,0 L/ha | Qarğıdalı | Dar və enli yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1183 | Royguard 125 SC | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Flutriafol | 125 | g/L | 003462 | 19.04.2023 | 19.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/ha | Şəkər çuğunduru | Serkosporioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/2 | 7(3) |
| 1184 | Roystar 75 WG | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron-methyl | 75 | % | 003463 | 19.04.2023 | 19.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 10 g/ ha | Buğda | Birillik enli yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1185 | Elfdal Mesod 500 SL | "Shangai Mingdou Chemical Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fumiqant | Metam Sodium | 500 | g/L | 003464 | 20.04.2023 | 21.04.2025 | Çin Xalq Respublikası | 1100 L/ ha | Xiyar (istixana) | Kök çürüməsi | Vegetasiya müddətində torpaqdan tətbiqi tövsiyə olunur | 0(1) | 20(15) |
| 1186 | Harvista 1.3 SC | "AgroFresh İnc." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Boy Tənzimləyici | 1-Methylcyclopropene | 17,15 | g/L | 003467 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 8,75 L/ha<br>11,7 L/ha | Alma | - | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/1-2<br>3/1-2 | 0(0) |
| 1187 | Delos (SC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 003468 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 35 ml /100 L suya | Alma<br>Pomidor | Hörümçək gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 1188 | Hektaş Hydrocop 77 WP | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper hydroxide equivalent to metallic copper | 50 | % | 003469 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 500 g/100 L suya<br>350 g/100 L suya | Alma<br><br>Alma<br>Şaftalı<br>Üzüm | Damğıl<br><br>Damğıl<br>Yarpaq qıvrılması<br>Mildiu<br>Antraknoz | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1189 | Expert Team (WP) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Oxychloride Equivalent To Metallic Copper+Cymoxanil | 39,75+4,2 | % | 003470 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 200 g/100 L suya | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | Hektaş Heksil DS 2 (Toz) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 2 | % | 003471 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 150 g/100 kg toxuma | Buğda<br>Arpa | Sürmə<br>Kök çürüməsi | Sapından 5-6 saat əvvəl toxumun darmanlanması tövsiyə edilir | -/1 | 0(0) |
| 1191 | Heckate (SC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Aclonifen | 600 | g/L | 003472 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,25 L/ha | Noxud | Birillik ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 35/1-2 | 7(3) |
| 1192 | Lastpoint (EC) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole+ Propiconazole | 150+150 | g/L | 003473 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,4-0,5 L/ha | Buğda | Unlu şeh<br>Sarı pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/1-2 | 7(3) |
| 1193 | Hektaş Tess (OD) | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Ethofumesate+Phenmedipham+D esmedipham+Lenacil | 80+65+50+26 | g/L | 003474 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 3,0 L/ha | Şəkər çuğunduru | İkilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 40/1-2 | 7(3) |
| 1194 | Alliset 80 WP | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-Al | 80 | % | 003475 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,5-3,0 kg/ha | Alma bağı | Bakterial yanıq | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26/2 | 7(3) |
| 1195 | Comprador SC 350 | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 003476 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 2 L/ha<br>1,5 L/ha<br>2 L/ha | Pambıq<br>Üzüm<br>Kartof | Pambıq sovkası<br>Manənə<br>Kolorado böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1196 | Cymithane 24 E (EC) | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Myclobutanil | 245 | g/L | 003477 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 15 ml /100 L suya<br>7,5 ml /100 L suya | Alma<br>Üzüm | Dəmgil<br>Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1197 | Di Amin 500 SL | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4 D acid | 500 | g/L | 003478 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,6-2 L/ha | Taxıl | Birillik ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 1198 | Gortca FS 600 | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 600 | g/L | 003479 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,32 L/ton | Kartof | Məftil qurdu<br>Danadişi | Sapından əvvəl toxumun darmanlanması | -/1 | 7(3) |
| 1199 | Kernel 50 W (WP) | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Propyzamide | 50 | % | 003480 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 3,2 kg/ha | Yonca | Sarı sarmaşıq | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 35/1-2 | 7(3) |
| 1200 | Kobuz 100 EC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 003481 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 25 ml /100 L suya | Üzüm | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1201 | Lozilex 50 WP | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tolclofos methyl | 50 | % | 003482 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,5 kg/ton | Buğda | Sürmə | Sapından qabaq darmanlama tövsiyyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1202 | Malvin XL 035 FS (SC) | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil + Metalaxyl | 25+10 | g/L | 003483 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 225 ml /1000 m2 | Pomidor | Kök çürüməsi | Cücərtilər müşahidə edildikdən sonra darmanlama tövsiyyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1203 | Milis 30 SC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | g/L | 003484 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 ml /100 L suya<br>50 ml /100 L suya<br>125 ml /100 L suya | Üzüm<br>Alma<br>Pomidor | Boz çürümə<br>Dəmgil<br>Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1204 | Nemafen EC 400 | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Nematisid | Fenamiphos | 400 | g/L | 003485 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 27,5 L/ha | Pomidor | Nematod | Ştillər əkilməmişdən əvvəl əkin qatına verilmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1205 | Platform 10 EC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 003486 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 50 mL/100 L suya | Şaftalı | Tut çanaqlı yastıcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 1206 | Prim Etrex (SL) | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Ethephon | 480 | g/L | 003487 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 3,0 L/ha | Pomidor | - | Meyvələrin 15-20% qızarması zamanı çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 7/1-2 | 7(3) |
| 1207 | Prostar WG | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-Methyl | 50 | % | 003488 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 15 g/100 L suya<br>15 g/100 L suya | Alma<br>Üzüm | Dəmgil<br>Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1208 | Ridonet MZ 72 WP | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 64+8 | % | 003489 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,25 kG/100 L suya<br>0,2-0,25 kG/100 L suya<br>2-2,5 kg/ha | Üzüm<br>Xiyar<br>Pomidor<br>Kartof | Mildiu<br>Fitoftora<br>Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1209 | Sakozeb M-45 (WP) | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 003490 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 200-300 g/100 L suya | Alma<br>Üzüm | Dəmgil<br>Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/3 | 7(3) |
| 1210 | Sponsor 330 E (EC) | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | g/L | 003491 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 5,0 L/ha | Qarğıdalı | Birlapalı və ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1211 | Sanspor (OD) | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | g/L | 003492 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,25 L/ha | Qarğıdalı | Birlapalı və bazi enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 40/1-2 | 7(3) |
| 1212 | Senkron 70 WDG | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 003493 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 80 mL/1000 m2 | Pomidor | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 35/1-2 | 7(3) |
| 1213 | Scorpion 250 EC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 003494 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 10 mL/100 lt suya | Alma<br>Armud | Dəmgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1214 | Tekvando 5 EC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 50 | g/L | 003495 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,25-0,4 L/100 L suya<br>1,5 L/ha<br>0,4 L/100 L suya | Alma<br>Pambıq<br>Üzüm | 1.Meyvəyayan yarpaqbükən<br>2.Pambıq sovkası<br>3.Saxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1215 | Unifruit (WP) | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | NAD+NAA | 1,18+0,43 | % | 003496 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 65 g / 100 L suya | Pomidor | - | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1216 | Trimazine 75 WP | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cyromazine | 75 | % | 003497 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,22 L/ha | Pomidor (İstixana) | Manənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1217 | Rayok (EC)<br>(Райок КЭ) | "Avgust" SC (АО"Август) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 003498 | 25.04.2023 | 25.04.2028 | Rusiya Federasiyası | 1,0,15-2,0 L/ha<br>2,0,2 L/ha<br>3,0,3-0,4 L/ha | 1. Alma, armud<br>2. Gilas, ərik, gavalı<br>3. Çuğundur | 1. Unlu şeh, dəmgil<br>2. Kokomikoz, monilioz, yarpaq çevrilməsi, unlu şeh, klyasterosporoz<br>3. unlu şeh, serkosporoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 1. 20/4<br>2. 20/2<br>3. 20/2 | 7(3) |
| 1218 | Fitomaq, P | "Fitomag İnter" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Etilen inhibitoru | 1-Methylcyclopropene | 30 | g/kq | 003499 | 26.04.2023 | 26.04.2028 | Rusiya Federasiyası | 10-14 q/70m2 | Alma (meyvə) | - | 3 L suda həll edib saxlama kamerasında məhsul yığımından 2-7 gün sonra tətbiqi tövsiyyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1219 | Hektaş Aktor (EC) | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | İmazalil | 500 | g/L | 003501 | 01.05.2023 | 01.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 mL/100 L suya | Pomidor (İstixana) | Boz çürümə (Botrytis cinerea) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1220 | Hektaş Gredi (WG) | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Flonicamid | 50 | % | 003502 | 01.05.2023 | 01.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 15 q/100 L suya | Xiyar (İstixana) | Manənələr (Aphis gossypii, Myzus persicae) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3 | 7(3) |
| 1221 | Maico (SC) | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole+Azoxystrobin | 200+120 | g/L | 003503 | 01.05.2023 | 01.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 mL/100 L suya | Xiyar (İstixana) | unlu şeh (Erysiphe cichoraceanum) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1222 | Puzzle 20 WP | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Pyridaben | 20 | % | 003504 | 01.05.2023 | 01.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 q/100 L suya | Pomidor (İstixana) | Tütün ağqanadlısı (Bemisia tabaci) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1223 | Sloop MZ (WP) | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb<br>Dimethomorph | 60<br>9 | % | 003505 | 01.05.2023 | 01.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 250 q/100 L suya | Pomidor (İstixana) | Fitoftora (Phytophthora infestans) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1224 | Titan 350 SC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 003513 | 01.05.2023 | 01.05.2028 | Çin Xalq Respublikası | 110 mL/1000 m2 | Pomidor (İstixana) | istixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1225 | Nanoşans, SM ( Наношанс ВР) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Bentazone | 480 | g/L | 003514 | 02.05.2023 | 04.12.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,6 L/ha | çaltik, arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı | birillik və bazi çoxillik ikilapalı alaqlar | mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 35/1-2 | 7(3) |
| 1226 | Greenkiller (SL) | Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate Isopropylamin Salt | 480 | g/L | 003516 | 03.05.2023 | 03.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,10 L/1000 m2 | damiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında | birillik və çoxillik enliyarpaqlı və dəryarpaqlı alaq otları | Alaq otlarının aktiv inkişafı dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi | 50/1 | 7(3) |
| 1227 | Judwa 5 EC | Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 003517 | 03.05.2023 | 03.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,55 L/ha | Pomidor (İstixana) | pambıq sovkası (helicoverpa armigera) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-22/1-2 | 7(3) |
| 1228 | Şansometoks Trio, SC<br>(Шансометокс Трио КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | insektisid-funqisid | Thiamethoxam + Difenoconazole + Fludioxonil | 262,5+25+25 | g/L | 003518 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,6 kq/ton<br>1,5 kq/ton | kartof<br>buğda | koloradо<br>kartof böcəyi<br>bərk sürmə<br>fuzarioz | sapından əvvəl toxum materialının darmanlanması | 0(1) | 7(3) |
| 1229 | İmidaşans Pro, SC<br>(Имидашанс Про КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid + Pensicuron | 140+150 | g/L | 003519 | 03.05.2023 | 09.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,7-1,0 L/ha | kartof | məftil qurdları, kolorado böcəyi, manənələr | əkin qabağı və ya əkin vaxtı kök yumrularının emalı. İşçi maye sərfiyyatı 10 L/ton | 0/1 | 0(0) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | İmazoşans ,SM (Имазошанс ВР) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | İmazamox | 40 | g/L | 003520 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,0 L/ha<br>1,2 L/ha | soya<br>noxud günəbaxan (toxumluq) | birillik taxıl fasiləsi və ikilapalı alaq otları | vegetasiya müddətində:<br>alaqların 1-3 yarpaq, bitkinin 1-3 yarpaq, alaqların 2-4 yarpaq, bitkilərin 4-5 yarpaq mərhələsində mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 1231 | Zenkoşans, SC (Зенкошанс КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 600 | g/L | 003521 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,0 L/ha<br>0,5 L/ha<br>0,5 L/ha | soya<br>kartof<br>qarğıdalı(dənlik) | birillik ikilapalı və taxıl fasiləsi alaq otları | bitkilərin cücərtilərinin əmələ gəlməsinə qədər mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 1232 | Qlifoşans, SM ( Глифошанс ВР) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate acid | 360 | g/L | 003522 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 3,2 L/ha<br>4-6 L/ha<br>2-4 L/ha | kartof<br>pambıq<br>tərəvəz,kartof, paxlalı, texniki bitkilər üçün sahə | birillik və çoxillik alaq otları | əkindən əvvəl yazda alaqların aktiv inkişaf fazasında, alaq otlarının boyunun 6-8 sm olan dövrü preparat tətbiq edilir (madanı bitki qorunmaqla) | 0(1) | 7(3) |
| 1233 | Agroşans, SC (Агрошанс ВК) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | MCPA (dimethylamino+sodium+potassium salt mixture) | 500 | g/L | 003523 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,5 L/ha<br>0,8 L/ha<br>1,2 L/ha | buğda,arpa çovdar<br>noxud<br>kartof | birillik ikilapalı alaq otları | Yazda taxılların boruya çıxma mərhələsinə qədər əkinlərin cilanması<br>Bitkilərin 3-5 əsl yarpaq mərhələsində cilanması | 0(1) | 7(3) |
| 1234 | Betaşans Trio, EC (Беташанс Трио КЭ) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Ethofumesate+Phenmedipham+Desmedipham | 112+91+71 | g/L | 003524 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 3,0 L/ha | soğan<br>şəkər çuğunduru | birillik ikilapalı və bazi birillik taxıl fasiləsi alarları | vegetasiya müddətində, bitkinin 4. alaq otlarının 3-5 yarpaq mərhələsində çiləmə aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 1235 | Şansil Ultra, SC (Шансил Ультра КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 120 | g/L | 003525 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,3 L/ton | qarğıdalı<br>buğda arpa<br>yulaf<br>çovdar | toz sürmə<br>helmintosporioz<br>bərk sürmə<br>fuzarioz<br>kök çürüməsi | sapından əvvəl toxum materialının dərmanlanması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 1236 | Şansil Trio, SC (Шансил Трио КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Thiabendazole + Tebuconazole + İmazalil | 60+60+40 | g/L | 003526 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,4-0,5 L/ton | qarğıdalı buğda,<br>arpa,<br>çovdar | bərk sürmə<br>toz sürmə fuzarioz<br>kök çürüməsi | sapından əvvəl toxum materialının dərmanlanması məqsədə uyğundur | 0(1) | 7(3) |
| 1237 | Strobişans Pro, SC (Стробишанс Про КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin+Cyproconazole | 200+80 | g/L | 003527 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,5 L/ha<br>1,0 L/ha | qarğıdalı<br>buğda<br>arpa<br>çovdar | Fuzarioz<br>pas xəstəlikləri, fuzarioz | vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 21(2) | 7(3) |
| 1238 | Kletoşans, EC ( Клетошанс КЭ) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 240 | g/L | 003528 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,0-1,2 L/ha | pambıq, şəkər çuğunduru, soya | birillik və çoxillik taxıl fasiləsi alaqları | bitkinin inkişaf mərhələsindən asılı olmayaraq alaq otlarının 2-6 yarpaq mərhələsində 0,1 L/ha Silvoşans SAM əlavə etməklə mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 1239 | Dişans, EC (Дишанс КЭ) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Dimetoate | 400 | g/L | 003529 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,8 L/ha<br>1,5 L/ha<br>1,0 L/ha<br>1,5-2,5 L/ha<br>0,8-1,6 L/ha | üzüm<br>buğda, arpa<br>şəkər çuğunduru<br>pambıq,<br>kartof<br>Alma, armud | Gənələr, yastıcalar<br>Ziyahkar bağacıq<br>Mənənələr, gənələr<br>mənənələr, güvələr<br>yastıcalar,gənələr | vegetasiya müddətində zərərli organizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla preparat tətbiq edilir | 18(2) | 7(3) |
| 1240 | İmidaşans Plyus, SC ( Имидашанс Плюс КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid + Lambda - cyhalothrin | 150+50 | g/L | 003530 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,45 L/ha<br>0,1 L/ha<br>0,3 L/ha<br>0,3 L/ha<br>0,3 L/ha | üzüm<br>buğda<br>tut<br>pambıq<br>alma,nar | yarpaqbükənlər<br>taxıl böcəyi<br>tut odlucası<br>mənənələr<br>meyvəyeyənlər yastıcalar | vegetasiya müddətində zərərli organizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir | 18(2) | 7(3) |
| 1241 | Duşans, EC (Душанс КЭ) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | S-metolachlor | 960 | g/L | 003531 | 03.05.2023 | 04.12.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,5 L/ha | şəkər çuğunduru,qarğıdalı, soya,günəbaxan, pambıq | birillik və bazi çoxillik ikilapalı alaqlar | madanı bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 35(1) | 7(3) |
| 1242 | Şans 24, EC (Шанс 24 КЭ) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | 2,4 D acid (2-ethylexyl ether) | 564 | g/L | 003532 | 03.05.2023 | 04.12.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,2 L/ha<br>1,0 L/ha | qarğıdalı<br>buğda | birillik və çoxillik ikilapalı alaqlar | madanı bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 35(1) | 7(3) |
| 1243 | Şans DKB, SM (Шанс ДКБ ВР) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Dicamba acid (dimethylamine salt) | 480 | g/L | 003533 | 03.05.2023 | 04.12.2025 | Rusiya Federasiyası | 0,5 L/ha | arpa, buğda, çovdar, qarğıdalı | birillik və bazi çoxillik ikilapalı alaqlar | madanı bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 35(1) | 7(3) |
| 1244 | İmidaşans-S, SC ( Имидашанс-С КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | İnsektisid | İmidacloprid | 600 | g/L | 003534 | 03.05.2023 | 04.12.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,3 L/ton<br>0,4 L/ton<br>0,8 L/ton | kartof<br>arpa, buğda<br>günəbaxan, qarğıdalı | kolorada böcəyi<br>məftil qurdu | sapından əvvəl toxum materialının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunur | 0(1) | 7(3) |
| 1245 | DVD Şans, SC (ДВД Шанс КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole+Cyproconazole | 30+6,3 | g/L | 003535 | 03.05.2023 | 04.12.2025 | Rusiya Federasiyası | 1,0 L/ton | qarğıdalı<br>buğda<br>arpa<br>çovdar | helmintosporioz<br>bərk sürmə<br>toz sürmə<br>fuzarioz<br>septorioz | sapından əvvəl toxum materialının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunur | 0(1) | 7(3) |
| 1246 | Şansomitron, SC ( Шансомитрон КС) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Metamitron | 700 | g/L | 003536 | 03.05.2023 | 04.12.2025 | Rusiya Federasiyası | 2,2 L/ha | şəkər çuğunduru | alaq otları | madanı bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 6-8 sm olduğu fazada mübarizənin aparılması daha səmərəlidir | 0(1) | 7(3) |
| 1247 | Şansilin, SPD ( Шансилин ВДГ) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | İnsektisid | Diflubenzuron | 800 | g/kg | 003539 | 03.05.2023 | 19.10.2025 | Çin Xalq Respublikası | 0,9 kq/ha<br>0,6 kq/ha<br>0,3 kq/ha | alma<br>gilas<br>tut | meyvəyeyənlər<br>ipəkqarınyanlar<br>tut odlucası | vegetasiya müddətində zərərli orqanizmin iqtisadi zərər vurma həddi nəzərə alınmaqla tətbiq edilir | 18(2) | 7(3) |
| 1248 | Tanoşans, SPD (Таношанс, Вдг) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil+Famoxadone | 250+250 | g/kg+ g/kg | 003540 | 03.05.2023 | 11.02.2027 | Rusiya Federasiyası | 500 q/ha<br>(800 L/ha işçi məhlul) | kartof | fitoftora | vegetasiya müddətində bitkinin 5-6 yarpaq və meyvələrinin formalaşması fazalarında çiləmə üsulu ilə tətbiq təvsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1249 | Şantus, SPD (Шантус, Вдг) | Şans Enterprayz MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Rimsulfuron | 250 | g/kg | 003541 | 03.05.2023 | 11.02.2027 | Rusiya Federasiyası | 50 q/ha<br>(200-300 L/ha işçi məhlul) | pomidor | alaq otları | bitkinin 2-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının ilkin inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu lə tətbiqi tövsiyə edilir | 0/1 | 7(3) |
| 1250 | Bisect 20 SC | Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | g/L | 003550 | 11.05.2023 | 11.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 12,5 mL/100 L su<br>17,5 mL/100 L su<br>20 mL/100 L su | heyva<br>armud<br>şaftalı | Alma meyvəyeyəni (Cydia pomonella)<br>armud minalayıcı güvəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10-12 | 7(3) |
| 1251 | Evisect 75 WDG | Nippon Kayaku CO., LTD | Yaponiya | Pestisid | İnsektisid | Thiocyclam hydrogen oxalate | 750 | g/kg | 003562 | 18.05.2023 | 07.07.2026 | Yaponiya | 1,2 kq/ha | pomidor | pomidor minalayıcı güvəsi | vegetasiya dövründə zərərli organizmin iqtisadi zərərvermə həddi nəzərə alınmaqla mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | | 7(3) |
| 1252 | Axial 50 EC | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Herbisid | Pinoxaden+Cloquinocet-mexyl | 50+12.5 | g/L | 003576 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Macarıstan Respublikası | 0.7-1.3 L/ha | buğda | birillik birləpalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1-2 | 7(3) |
| 1253 | Dual Gold 960 EC | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Herbisid | S-Metolachlor | 960 | g/L | 003577 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Rusiya Federasiyası | 1.3-1.6 L/ha | şəkər çuğunduru | birillik taxıl fasiləsi və bazi ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1-2 | 7(3) |
| 1254 | Voliam Targo 063 SC | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Chlorantraniliprole+Abamectin | 45+18 | g/L | 003578 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Fransa Respublikası | 0.4 L/ha | alma şaftalı<br>üzüm kartof<br>tərəvəz | gənələr mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1255 | Pergado MZ 65 WG | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Mandipropamid+Mancozeb | 50+600 | g/kg+ g/kg | 003579 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Almaniya Federativ Respublikası | 2.5 kq/ha | üzüm pomidor<br>kartof xiyar<br>yemiş | gənələr mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3 | 7(3) |
| 1256 | Tilt 250 EC | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole | 250 | g/L | 003580 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Rusiya Federasiyası | 0.5 L/ha | buğda | unlu şeh xətli pas sarı pas septarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 40/1-2 | 7(3) |
| 1257 | Ouragan Forte 500 SL | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 500 | g/L | 003581 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Rusiya Federasiyası | 1.5-3.0 | üzüm meyvə bağları | birillik taxıl fasiləsi və ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1-2 | 7(3) |
| 1258 | Elfdal Sıvç Tonik | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tanzimləyici | Sodium PN, Sodium ONP, Sodium PNG | 3,2,1 | g | 003588 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 50 mL/100 L suya | alma armud<br>şaftalı | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3 | 7(3) |
| 1259 | Elfdal Kimetrin 25 EC | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 003589 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 20 mL/100 L suya | üzüm | yarpaqbükən | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1260 | Elfdal Fenos 400 EC | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Nematisid | Nematisid | Fenamiphos | 400 | g/L | 003590 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 37.5 L/ha | pomidor (istixana) | kök fir nematodları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1-2 | 0(0) |
| 1261 | Elfdal Lamtorin 5 EC | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 50 | g/L | 003591 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 55 mL/ha | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 10(4) |
| 1262 | Elfdal Mectin 18 EC | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 003592 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.5 L/100 L suya | xiyar | gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 3/2 | 7(3) |
| 1263 | Elfdal Pirden 20 WP | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Pyridaben | 200 | g/L | 003593 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.4 L/100 L suya | pomidor | gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 10(4) |
| 1264 | Elfdal Procar 722 SL | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propamocarb | 722 | g/L | 003594 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 L/ha | kartof | fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 5/2 | 7(3) |
| 1265 | Elfdal Fosalin 80 WP | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosethyl-Al | 800 | q/kq | 003595 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 200 g/L | pomidor (istixana) | fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 3/2 | 7(3) |
| 1266 | Elfdal Kimarsol WP | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiram | 800 | q/kq | 003596 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 350 g/100 L suya | lobya | kök çürüməsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 7(3) |
| 1267 | Elfdal Emaben 5 SG | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | İnsektisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 50 | g/L | 003597 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 g/100 L suya | xiyar (istixana) | pambıq yarpaq qurdu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 3/2 | 7(3) |
| 1268 | Elfdal İmidrid 350 SC | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 003598 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,15 L/ha | pomidor | mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1-2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269 | Efdal Kemidon | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Dimethoate | 400 | g/L | 003599 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 120 ml/100 L suya | üzüm | üzüm salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 40/2 | 10(4) |
| 1270 | Efdal Bakirox 50 WP | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper oxychlor | 500 | g/kg | 003600 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 300 g/100 L suya | pomidor (istixana) | erkən yarpaq yanıqlığı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 3/2 | 7(3) |
| 1271 | Efdal Delmetrin 25 EC | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticatet A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 003601 | 25.05.2023 | 25.05.2028 | Türkiyə Respublikası | 150 ml/100 L suya | xiyar (istixana) | istixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 3/2 | 7(3) |
| 1272 | Megaton M | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda Cyhalothrin | 50 | g/L | 003613 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Hindistan Respublikası | 0,06 L/ha | pommidor | pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 24/1-2 | 7(3) |
| 1273 | Pluton 72 WP | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 64+8 | % | 003614 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Hindistan Respublikası | 260 g/100 L suya | pomidor (istixana) | fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1274 | Malathion M | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | q/L | 003615 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Hindistan Respublikası | 20 ml/100 L suya | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1275 | M-Cozeb M 45 | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 003616 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Hindistan Respublikası | 210 g/100 L suya | xiyar (istixana) | unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1276 | Kükürt Plus | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Sulphur | 80 | % | 003617 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Hindistan Respublikası | 420 g/100 L suya | üzüm | oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 7(3) |
| 1277 | Deltis 25 EC | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 003618 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Hindistan Respublikası | 1,2 L/ha | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1278 | Cypermethrin 250 EC | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | q/L | 003619 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Hindistan Respublikası | 0,35 L/ha | xiyar (istixana) | istixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1279 | Bakir Gold 50 WP | Modern İnsecticides LTD | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper oxychloride (Metallic Copper) | 50 | % | 003620 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Hindistan Respublikası | 220 g/100 L suya | soğan (istixana) | yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 7(3) |
| 1280 | Uran Plus | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb+Metalaxyl | 64+8 | % | 003621 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Çin Xalq Respublikası | 260 g/100 L suya | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1281 | Katrin 5 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda cyhalothrin | 50 | g/L | 003622 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0,6 L/ha | pomidor (istixana) | pomidor güvəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1282 | Demis 25 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 003623 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0,6 L/ha | xiyar (istixana) | mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1283 | Doxa 100 EC | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alphacypermethrin | 100 | g/L | 003624 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0,6 L/ha | pomidor (istixana) | pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1284 | Deniprid 20 SP | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 003625 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Çin Xalq Respublikası | 32 g/100 L suya | pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1285 | Apache 50 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pirimiphos-Methyl | 500 | g/L | 003626 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 110 mL/100 L suya | pomidor (istixana) | mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/1-2 | 7(3) |
| 1286 | Referee 5 EC | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 003627 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,6 L/ha | üzüm | gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1287 | Rita 400 | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Phosphorous acid | 400 | g/L | 003628 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 420 mL/100 L suya | pomidor (istixana) | fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 7/2 | 7(3) |
| 1288 | Spider 20 WP | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Pyridaben | 20 | % | 003629 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,6 kq/ha | alma | qırmızı meyvə gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1289 | Soldeco 20% | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux mixture equivalent to metallic copper | 20 | % | 003630 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 520 g/100 L suya | xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1290 | Tomaton | Evergreen Agrochemical CO. LTD. | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | BNOA | 50 | g/L | 003632 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Çin Xalq Respublikası | 155 mL/100 L suya | pomidor (istixana) | - | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/2 | 0(0) |
| 1291 | Vulcano Gold | Doğal Kimyevi Madde Ve Zirai İlaçlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Gibberellic acid | 20 | g/L | 003633 | 06.06.2023 | 06.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 55 mL/100 L suya | xiyar (istixana) | - | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/2 | 0(0) |
| 1292 | Tebizole - 25% WP | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 003634 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 120 g/1 ton toxuma | buğda | bərk sürmə, toz sürmə | Səpindən öncə toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 1293 | Tovap - 30% EC | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl+Cloquintocet- Mexyl | 24+6 | % | 003635 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,2 L/ha | buğda | birillik birləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26/1-2 | 7(3) |
| 1294 | Blast - 44,1% SL | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | Bentazone | 44.1 | % | 003636 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 3,0 L/ha | qarğıdalı | ikiləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 1295 | Deltarin - 2,5% EC | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 2.5 | % | 003637 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,25 L/ha | buğda | ziyankar bağacıq, taxıl böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 24/1-2 | 7(3) |
| 1296 | Floratone SP | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Boy Tənzimləyici | 1-Naphthaleneacetic acit+ 1-Naphthaleneacetamide | 4,5 + 12,5 | g | 003638 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 6 g/10 L suya | meyvə bağları | bitkinin vegetativ orqanlarının stimulatoru | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/3 | 7(3) |
| 1297 | Oscar 75% WP | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | Tribenuron-Methyl | 75 | % | 003640 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,02 kq/ha | buğda | ikiləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 1298 | Propivap 25% EC | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Propiconazole | 25 | % | 003641 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,5-1,0 L/ha | buğda | unlu şeh, qonur pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26/2 | 7(3) |
| 1299 | Azoxifen 32,5% SC | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin+Difenoconazole | 20+12,5 | % | 003642 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,6 L/ha | buğda | unlu şeh, qonur pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/1-2 | 7(3) |
| 1300 | Bifenamin 20% EC | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Bifenthrin | 20 | % | 003643 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,15 L/ha | buğda | taxıl böcəyi, mənənə, ziyankar bağacıq | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 24/1-2 | 7(3) |
| 1301 | Ground-UP SL | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | Glyphosate IPA | 48 | % | 003644 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 6,0 L/ha | üzüm | birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 1302 | Agrinate 90% SP | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 90 | % | 003645 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,3 kq/ha | qarpız (bostan əkinlər) | payız sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3 | 7(3) |
| 1303 | Supertak 10 %EC | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Alpha cypermethrin | 10 | % | 003646 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,1 L/ha | noxud | mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1-2 | 7(3) |
| 1304 | Emavap 2% EC | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Emamectin benzoate | 2 | % | 003647 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,2-0,4 L/ha | alma | meyvəyeyən, yarpaqbükən | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1305 | Mosil 5% EC | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Akarisid-İnsektisid | Lufenuron | 5 | % | 003648 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 1,2 L/ha | alma | alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 1306 | Oblate 12,5% SC | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Epoxiconazole | 12,5 | % | 003649 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 0,5-1,0 kq/ha | buğda | sarı pas, qonur pas, unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1307 | Cartap 50% SP | Veterinary&Agricultural Prod.Mfg.Co.Ltd | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Cartap | 50 | % | 003650 | 14.06.2023 | 14.06.2028 | İordaniya Krallığı | 2,5 g/L | alma | meyvəyeyən, gənələr, mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/3 | 7(3) |
| 1308 | Preparat-30 | Fuad-Kimya Servis MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Parrafin Oil (Cas № 7732-18-15) | 75.2 | % | 003662 | 09.06.2023 | 19.06.2028 | Azərbaycan Respublikası | 3 L/100 L suya | alma | Qırmızı meyvə gənəsi, Kolifomiya qanaqlı yastıcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 1309 | Pherocon ASW | Trece, Inc. | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Feromon tələ | (Z,Z)-6,9-Tricosadiene; (Z,Z)-6,9-Pentacosadiene; Other ingredients | 1; 1; 98 | % | 003683 | 19.06.2023 | 19.06.2028 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 3 ədəd/5 ha | badam | badam toxumu arısı | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 1310 | Pherocon BMSB Dual | Trece, Inc. | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Feromon tələ | Murgantiol; Methyl E,E,Z-2,4,6-decatrienoate; Other ingredients | 1; 1; 98 | % | 003684 | 19.06.2023 | 19.06.2028 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 3 ədəd/ ha | zeytun | qəhvəyi mərmər bağacığı | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 15/3 | 3(3) |
| 1311 | Pherocon CM | Trece, Inc. | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Feromon tələ | 8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; Other ingredients | 1; 99 | % | 003685 | 19.06.2023 | 19.06.2028 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 3 ədəd/5 ha | alma bağları | alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 1312 | Pherocon CMDA Combo-P | Trece, Inc. | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Feromon tələ | 8,10-Dodecadien-1-ol, (8E,10E) ; (2,4-decadienoic acid,ethyl ester, (E,Z); Other ingredients | 1; 1; 98 | % | 003686 | 19.06.2023 | 19.06.2028 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 3 ədəd/5 ha | alma bağları | alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 1313 | Pherocon EGVM L2 | Trece, Inc. | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Feromon tələ | (7E,9Z)-7,9-dodecadien-1-yl acetate; Other ingredients | 1; 99 | % | 003687 | 19.06.2023 | 19.06.2028 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 3 ədəd/5 ha | üzüm | üzüm salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 1314 | Pherocon TA | Trece, Inc. | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Feromon tələ | (3E,8Z,11Z)-3,8,11-tetradectrien-1-yl acetate; (3E,8Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetate; Other ingredients | 1; 1; 98 | % | 003688 | 19.06.2023 | 19.06.2028 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 3 ədəd/ ha | pomidor (istixana) | pomidor ləğmlayıcı güvəsi | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 15/3 | 3(3) |
| 1315 | Kibele 490 SC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metamitron Ethofumesate Phenmedipham | 400 55 35 | g/L | 003696 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 3.0 l/ha | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 50/1-2 | 7 (3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1316 | Hekalfa 20 EC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Esfenvalerate | 200 | g/L | 003697 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.65 l/ha | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20-22/1-2 | 7 (3) |
| 1317 | Esqui | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Fluometuron | 500 | g/L | 003698 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 2.0 l/ha | Pambıq | Alaq otları | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 10 (4) |
| 1318 | Hektaş Biselado | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA<br>Oxyfluorfen | 360<br>30 | g/L | 003699 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 1) 1.5 l/ha 300 l suya<br>2) 3.0 l/ha 300 l suya | 1) Ərik<br>2) Şaftalı | 1) Tülküquyruğu<br>2) Qırmızı kökü tülküquyruğu<br>3) Çobançantası<br>4) Sirkən<br>5) Dəlicə<br>6) Yapışqan ot<br>7 )Qurşotu<br>8 )Eyni mənşəli birillik alaq otları | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60-90/2 | 7 (3) |
| 1319 | Taido CS | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 003707 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.2 L/ha | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 10/2-3 | 10 (4) |
| 1320 | Royzum 10 SC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 003708 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 25 mL/100 L suya | Üzüm | İki nöqtəli qırmızı hörümçək | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/2 | 10 (4) |
| 1321 | Girdap 48 SL | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA | 480 | g/L | 003709 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 3 l/ha | Üzüm | Birillik ikilapalı və birlapalı alaq otları | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/1 | 7(3) |
| 1322 | Zepplin 100 EC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha cypermethrin | 100 | g/L | 003710 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 ml/100 l su | Üzüm | Üzüm uzunburnu | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 10-15/2 | 7(3) |
| 1323 | Roy Boss SC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantaraniliprole | 200 | g/L | 003711 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 15 ml/100 l su | Üzüm | Salxım güvəsi | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/2 | 10 (4) |
| 1324 | Roybordo | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux mixture equivalent to metallic copper | 20 | % | 003712 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 500 g/100 l suya | Üzüm | Mildiu<br>Külü kol | Vegitasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2-3 | 7(3) |
| 1325 | Roytix 70 WG | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metamitron | 70 | % | 003715 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 6.5 kg/ha | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətindəçiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1 | 7(3) |
| 1326 | Roydere 300 EC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Ethofumesate Phenmedipham | 200;100 | g/L | 003716 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.5 L / ha | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/2 | 7(3) |
| 1327 | Remdox SC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate Indoxacarb | 53;106 | g/L | 003717 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 250 mL/ha | Pomidor (istixana) | Pomidor güvəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1 | 7(3) |
| 1328 | Tepplan WG | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid<br>Flonicamid | 15;20 | % | 003718 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 22 g/100 L suya | Bibər (istixana) | Mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1329 | Roytazone 320 SC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin Tebuconazole | 120;200 | g/L | 003719 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 110 mL/100 L suya | Xiyar (istixana) | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1330 | Roygetin 220 SC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Abamectin<br>Spirodiclofen | 20;200 | g/L | 003720 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 25 ml /100 L suya | Alma | Qırmızı meyvə gənəciyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 18/2 | 10(4) |
| 1331 | Roymectin 1.8 EC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 003721 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 25 ml /100 L suya | Xiyar (istixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1332 | Royzole SC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Abamectin<br>Etoxazole | 52;104 | g/L | 003722 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 25 ml /100 L suya | Alma | Qırmızı meyvə gənəciyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 18/2 | 10(4) |
| 1333 | Forcop 20 SP | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 003723 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.35 kg/ha | pomidor (istixana) | Mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 22-25/1-2 | 7(3) |
| 1334 | Roystomp 450 CS | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 450 | g/L | 003724 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 3 L /100 L suya | Gönəbaxan | Dər və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1 | 7(3) |
| 1335 | Royphon 72 SL | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Ethephon | 720 | g/L | 003725 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 2L /ha | Pambıq | _ | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/2 | 10(4) |
| 1336 | Boryspil 35 FS | "Koruma Kior Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil<br>Metalaxyl-M | 25<br>10 | g/L | 003729 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 mL/100 kq toxuma | Qarğıdalı | Kök çürüməsi | sapından önce toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiya olunur | 0/1 | 7(3) |
| 1337 | Koruma Weed Killer D | "Koruma Kior Alkali" San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid | 500 | g/L | 003730 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.6-2.0 L/ha | Taxıllar | Birillik ikilapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1338 | Royfix | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Boy Tənzimləyici | Mepiquat Chloride | 50 | g/L | 003731 | 22.06.2023 | 22.06.2028 | Türkiyə Respublikası | 1000 m^2 sahəyə 100 mL | Pambıq | _ | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/3 | 10(4) |
| 1339 | Alushta 116,2 EC | Koruma Kior Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 116.2 | g/L | 003765 | 12.07.2023 | 12.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.6 L/ha | Soğan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 60/1 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | Korfezin 400 SC | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Insektisid | Buprofezin | 400 | g/L | 003766 | 14.07.2023 | 14.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 1 L/ha | Pambıq | Mənənə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1 | 10(4) |
| 1341 | Dante 25 EC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Insektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 003771 | 17.07.2023 | 17.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 25 mL/100 L suya | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 60/2 | 7(3) |
| 1342 | Koffex SC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spiromesifen | 240 | g/L | 003772 | 17.07.2023 | 17.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.05 L/ha | Pomidor (istixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/1-2 | 7(3) |
| 1343 | Modesta SC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Insektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 003773 | 17.07.2023 | 17.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 25 mL/100 L suya | Pomidor (istixana) | istixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/1-2 | 7(3) |
| 1344 | Tiganex SC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | g/L | 003774 | 17.07.2023 | 17.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 625 mL/ha | Pomidor (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1345 | Radiant 120 SC | Corteva Agriscience International Sarl.. | İsveçrə Respublikası | Pestisid | Insektisid | Spinetoram | 120 | g/L | 003776 | 19.07.2023 | 19.07.2028 | Fransa Respublikası | 0.6 L/ha | Pomidor (istixana) | Pomidor güvəsi | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1346 | Graiser 350 FS | Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Insektisid | Thiamethoxam | 350 | g/L | 003783 | 26.07.2023 | 26.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 10 mL/100 kq toxuma | Kartof | Kolorado böcəyi | Vegetasiya müddətində toxumlar əkilmamişdən öncə tətbiqi tövsiyə olunur | 3/1-2 | 7(3) |
| 1347 | Amid 330 EC | Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | g/L | 003784 | 26.07.2023 | 26.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 50 q/100 L suya | Pomidor | Alternariya | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1348 | Pestige 250 EC | Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 250 | g/L | 003785 | 26.07.2023 | 26.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 50 q/100 L suya | Pomidor | Alternariya | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1349 | Nadas | Astranova Tarim Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA, Oxyfluorfen | 360,30 | g/L | 003786 | 26.07.2023 | 26.07.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.5 L / ha 300 L suya; 3 L/ha 300 L suya | Ərik, Şaftalı, Nektarin | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 60-90/2 | 7(3) |
| 1350 | Vitaşans, Spd (Виташанс, Вдг) | Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Sulphur | 800 | g/kg | 003787 | 27.07.2023 | 09.10.2025 | Hindistan Respublikası | 1.6-8 , 6.0 | 1.Üzüm , 2.Alma, armud, heyva | 1.Oiodium, 2 Dəmgil, pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 1351 | Fumişans, Hab (Фумишанс, Таб) | Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fumiqant | Aluminium phosphide | 560 | g/kg | 003788 | 27.07.2023 | 11.02.2027 | Hindistan Respublikası | 10 g/m^3 | qurudulmuş müxtəlif tərəvəz bitkiləri və onların toxumları | Anbarda rast gəlinən bütün zərərvericilər | Qapalı şəraitdə xüsusi nəzarət altında anbar zərərvericilərinə qarşı tətbiqi məqsədəuyğundur | 0/1 | 7(3) |
| 1352 | Metaşans, NT (Меташанс, Сп) | Şans Enterprayz (ООО ШАНС ЭНТЕРПРАЙЗ) ММС | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb, Metalaxyl | 640,80 | g/kg | 003789 | 27.07.2023 | 19.10.2025 | Çin Xalq Respublikası | 1.3.0 kg/ha , 2.2.5 kg/ha | 1.Üzüm , 2.Kartof, pomidor,xiyar, soğan | 1. Mildiu<br>2. Fitoftora, peronosporioz | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 12/1 | 7(3) |
| 1353 | Cydia Protect | Mezhtrans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feremon tələ | (E,E)-8,10-Dodecadien-1-Ol (Cas-33956-49-9), Antioxidant | 92.2 ;<br>0.1 | %<br>% | 003798 | 11.08.2023 | 11.08.2028 | Moldova Respublikası | 5 hektara 3 ədəd | Alma ağacları | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 1354 | Lobesia Protect | Mezhtrans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feremon tələ | (E)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-35148-19-7),<br>(E,Z)-7,9-Dodecadienyl Acetate (Cas-55774-32-8),<br>(Z)-9-Dodecenyl Acetate (Cas-16974-11-1),<br>Antioxidant | 5;<br>85;<br>5;<br>0.1 | %<br>%<br>% | 003799 | 11.08.2023 | 11.08.2028 | Moldova Respublikası | 5 hektara 3 ədəd | Üzüm | Üzüm salxım yarpaq bükəni | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 1355 | Tuta Protect | Mezhtrans Moldova SRL | Moldova Respublikası | Pestisid | Feremon tələ | (E,Z)-3,8-Tetradecadienyl Acetate (163041-87-0),<br>(E,Z,Z)-3,8,11- Tetradecatrienyl Acetate (163041-94-9),<br>Antioxidant (10191-41-0) | 5;<br>90;<br>0.1 | % | 003800 | 11.08.2023 | 11.08.2028 | Moldova Respublikası | Hektara 3 ədəd | Pomidor (İstixana) | Pomidor güvəsi | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur | 15/3 | 3(3) |
| 1356 | Marcus 250 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin-250g/L | 250 | g/L | 003801 | 17.08.2023 | 17.08.2028 | Azərbaycan Respublikası | 40 mL/100 L suya | Alma | Alma meyvəyeyəni, Alma ballıcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26/2 | 7(3) |
| 1357 | Ledrock 5 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-Cyhalohtrin | 50 | g/L | 003802 | 17.08.2023 | 17.08.2028 | Azərbaycan Respublikası | 20 mL/100 L suya | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 1358 | Delta Force 25 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 003803 | 17.08.2023 | 17.08.2028 | Azərbaycan Respublikası | 30 mL/ 100 L suya | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 1359 | Renumbra 500 SL | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D Acid (Amin duzu) | 500 | g/L | 003804 | 17.08.2023 | 17.08.2028 | Azərbaycan Respublikası | 2.0 L/ha | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/1-2 | 7(3) |
| 1360 | Turbo 100 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha - Cypermethrin | 100 | g/L | 003807 | 17.08.2023 | 17.08.2028 | Azərbaycan Respublikası | 20 mL/100 L suya | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/2 | 7(3) |
| 1361 | Ronin 50 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob-P-Ethyl | 50 | g/L | 003808 | 17.08.2023 | 17.08.2028 | Azərbaycan Respublikası | 850 mL/ha | Pambıq | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 40/1-2 | 7(3) |
| 1362 | Herboglif 480 SL | "Shenzhen Yufull Industries Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA | 480 | g/L | 003809 | 18.08.2023 | 18.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 3 l/ha | Alma | Sürünən kəkrə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 0/1 | 7(3) |
| 1363 | Ultra | "Better Crop Agro Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Molyuskosid | Metaldehyde | 6 | % | 003810 | 18.08.2023 | 18.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 15 | Tərəvəz (İstixana) | İlbizlər | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 0/3 | 7(3) |
| 1364 | Snayper 20 SP | "Better Crop Agro Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 003811 | 18.08.2023 | 18.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 60 g/ha | Kartof | Kolorado böcəyi | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 0/2 | 7(3) |
| 1365 | Tolan | Newton Chemicals Co | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 240 | g/L | 003818 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 100 q/ha | Xiyar (İstixana) | Mənənələr | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1 | 7(3) |
| 1366 | Tanos | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Lambda-Cyhalothrin, İmidacloprid | 10;<br>20 | %<br>% | 003819 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 75 q/ha | Xiyar (İstixana) | Mənənələr | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/1 | 7(3) |
| 1367 | Delta | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 2.5 | % | 003820 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 350 ml/ha | Xiyar (İstixana) | Mənənələr | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368 | Malaton | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 50 | % | 003821 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 220 ml 100 L suya | Pomidor (İstixana) | Yaşıl mənənə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 22-25/1 | 7(3) |
| 1369 | Etazol | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Etoxazole | 11 | % | 003822 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 37 mL 100 L suya | Xiyar (İstixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/2 | 7(3) |
| 1370 | Admin | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 10 | % | 003823 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 55 ml/ 100 L suya | Pomidor (İstixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1 | 7(3) |
| 1371 | Asist 10 EC | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 003824 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 l suya | Badımcan (İstixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1372 | Foça WG | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metiram, Pyraclostrobin | 55, 5 | %, % | 003825 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 250 qr/100 l suya | Xiyar (İstixana) | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 2-Oct | 7(3) |
| 1373 | Fourwet 5 EC | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lufenuron | 50 | g/L | 003826 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 ml/100 l suya | Xiyar (İstixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1374 | Raneb 5 SG | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 003827 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 qr/100 l suya | Pomidor (İstixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1375 | Skype 62.5 WG | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil, Fludioloxonil | 37.5 25 | %, % | 003828 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 60 qr/100 l suya | Pomidor (tstixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 2-Oct | 7(3) |
| 1376 | Metaldehyde Bait 6% | "Zarpash Shimi Co. LTD " | İran İslam Respublikası | Pestisid | Molyuskasid | Metaldehyde | 6 | % | 003831 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | İran İslam Respublikası | 25 kq/ha | Pomidor (İstixana) | Çılpaq ilbizlər | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1377 | Volck 92 Oil | "Zarpash Shimi Co.LTD " | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisd, ovisid | Emulsiyalaşmış Mineral Yağ (CASNr. 8020-83-5) | 920 | g/L | 003832 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | İran İslam Respublikası | 2.5 l/100 suya | Alma | Qırmızı meyvə gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1378 | Akton | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 25 | % | 003833 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 26.5 qr/ 100 L suya | Pomidor (İstixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1 | 7(3) |
| 1379 | Capitan | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Captan | 80 | % | 003834 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 30 qr/ 100 L suya | Pomidor (İstixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1380 | Grover | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Boy tənzimləyicisi | Gibberellic Acid | 40 | g/L | 003835 | 24.08.2023 | 24.08.2028 | Çin Xalq Respublikası | 100 mL/ 100 L suya | Pomidor (İstixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1381 | Berrlan (WG) | "Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-Methyl | 50 | % | 003851 | 28.08.2023 | 28.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 16 qr/100 l suya | Alma | Dəmgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 35/2 | 7(3) |
| 1382 | Arvica (SC) | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid Kresoxim Methyl | 200; 100 | g/L g/L | 003856 | 30.08.2023 | 30.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.3 l/ha | Pomidor (İstixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/3 | 7(3) |
| 1383 | Derivate SC | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 150 | g/L | 003857 | 30.08.2023 | 30.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 45 ml/1000 m2 | Pomidor (İstixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/1-2 | 7(3) |
| 1384 | Flazon (EC) | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisd | Abamectin | 18 | g/L | 003858 | 30.08.2023 | 30.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/ha | Pomidor (tstixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1385 | Nimadel (SC) | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Bifenazate | 240 | g/L | 003859 | 30.08.2023 | 30.08.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.65 l/ha | Pomidor (tstixana) | Hörümçək gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/1-2 | 7(3) |
| 1386 | Super Alpha 10 ULV | "Shenzhen Yufulll Industries Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha - cypermethrin | 10 | g/L | 003878 | 06.09.2023 | 06.09.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0,15 l/ha | Otlaqlar | Çəyirtkə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 27/1-2 | 7(3) |
| 1387 | Sombrero WG | "Ningbo Generic Chemical Co Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 003879 | 07.09.2023 | 07.09.2028 | Çin Xalq Respublikası | 65 q/ha | Kələm | Almaz güvə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1388 | Pherocon OFM | "Trece, İnc" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Feromon tələ | E-8-Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenyl Acetate Z-8 Dodecenol Other İngredients | 1 1 1 97 | % % % % | 003880 | 08.09.2023 | 08.09.2028 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 3 ədəd / 5 ha | Şaftalı | Şərq meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 0(0) |
| 1389 | Halcyon 330 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | g/L | 003881 | 08.09.2023 | 08.09.2028 | Azərbaycan Respublikası | 5,2 l/ha | Pomidor | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1-2 | 7(3) |
| 1390 | Megasun 20 SP | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 003882 | 08.09.2023 | 08.09.2028 | Azərbaycan Respublikası | 20-25 q/l / 100 L suya | Alma, ərik | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/2 | 7(3) |
| 1391 | Seal | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Desmedipham Phenmedipham | 34 129 | g/L g/L | 003887 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.5 l/ha | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1392 | Serastar | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxadiazon | 250 | g/L | 003888 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 1,5 l/ha | Çəltik | Dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 1393 | Zucronal OF | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Ethofumesate Phenmedipham Desmedipham | 112 91 71 | g/L g/L g/L | 003889 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 3,5 l/ha | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1394 | Cobbler | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Fluometuron | 500 | g/L | 003890 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 2 L/ha | Pambıq | Birillik dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1395 | Atractivo | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Abamectin Indoxacarb | 18 75 | g/L g/L | 003892 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 45 mL/100 L suya | Pomidor (istixana) | Pomidor ləğmlayıcı güvəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1396 | Buproled | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Buprofezin | 400 | g/L | 003893 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 L suya | Pomidor (istixana) | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1397 | Caser Pro | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil Famoxadone | 30 22,5 | % % | 003894 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 40 q / 100 L suya | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1398 | Corridor 50 SC | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fenhexamid | 500 | g/L | 003896 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 L suya | Xiyar (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1399 | Edgar | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil | 50 | % | 003897 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 500 q/ha | Kartof | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1400 | Fieno WG | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil<br>Metiram | 4,8<br>57 | %<br>% | 003898 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 200 q/100 l suya | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1401 | Fordus | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | g/L | 003899 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 75 mL/100 L suya | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1402 | Mixever | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil<br>Metalaxyl-M | 25<br>10 | g/L<br>g/L | 003900 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 10 mL/4 L suya | Pomidor (istixana) | Fuzarium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1403 | Saury | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Abamectin Bifenazate | 7,5<br>125 | g/L<br>g/L | 003901 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 L suya | Pomidor (istixana) | Qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1404 | Skyner | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper<br>Chlorothalonil | 25<br>25 | %<br>% | 003902 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 250 qr/100 L suya | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1405 | Truegold | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Fenpyroximate | 50 | g/L | 003903 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 75 mL/100 L suya | Pomidor (istixana) | İki nöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1/- | 7(3) |
| 1406 | Aquatis | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin. Difenoconazole | 200<br>125 | g/L<br>g/L | 003904 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,8 l/ha | Noxud | Askoxitoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/1 | 7(3) |
| 1407 | Başaran M 60 | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone<br>MCPA | 400<br>60 | g/L<br>g/L | 003905 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 2 l/ha | Çəltik | Çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 20(6) |
| 1408 | Filiker MC | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bromoxynil<br>MCPA | 300<br>300 | g/L<br>g/L | 003906 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,35 l/ha | Buğda | Yabanı xardal və digar ikiləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1 | 0(3) |
| 1409 | Maksiyer | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cloquintocet-mexyl(safener)<br>Pinoxaden | 20<br>45 | g/L<br>g/L | 003907 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha | Buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1410 | Orisafem 600 | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Aclonifen | 600 | g/L | 003908 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.25 l/ha | Noxud | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1411 | Pablo | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quinclorac | 250 | g/L | 003909 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.5 l/ha | Çəltik | Birillik alaq otları (daryarpaqlı) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 20(6) |
| 1412 | Ritmica OF 120 | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mefenpyr-diethyl (Safener)<br>Mesosulfuron-methyl | 90<br>30 | g/L<br>g/L | 003910 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,4 L/ha | Buğda | Birləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1 | 7(3) |
| 1413 | Wikilis | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesosulfuron-methyl<br>Iodosulfuron-methyl-sodium<br>Mefenpyr diethyl (safener) | 3<br>0,6<br>9 | %<br>%<br>% | 003911 | 14.09.2023 | 14.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,25 L/ha | Buğda | Birləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1 | 7/3 |
| 1414 | Menta Captan 50 WP | Menta Tarim İlaçlari Sanayi Ve Tic.Ltd | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 003929 | 18.09.2023 | 18.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 150 qr/100 l suya<br>150 qr/100 l suya<br>300 qr/100 l suya<br>300 qr/100 l suya<br>300 qr/100 l suya | Alma<br>Armud<br>Şaftalı<br>Əhlik<br>Gavalı | Damgil<br>Damgil Yarpaqdələnçil<br>Moniliya<br>Cib-cibə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7/2-3<br>7/2-3<br>15/2-3<br>7/2-3<br>10/2-3 | 7(3) |
| 1415 | Makmec 1,8 EC | Clone Kimya Tarim Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 003930 | 18.09.2023 | 18.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 75 ml/100 l suya<br>75 ml/100 l suya<br>75 ml/100 l suya | Armud<br>Alma<br>Çiyələk | Armud ballıcası<br>2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi<br>2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7/2<br>10-12/2<br>-/1 | 7(3) |
| 1416 | Rosesyl | "Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole<br>Propiconazole | 150<br>150 | g/L<br>g/L | 003954 | 26.09.2023 | 26.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 0,5 l/ha | Buğda | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1 | 7(3) |
| 1417 | Piler-Amin | "Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D Acid (dimethylamin) | 500 | g/L | 003955 | 26.09.2023 | 26.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 2,2 l/ha | Qağıdalı | Dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 1418 | Pil-EMR | "Pileryum Tarim Ve Gida Sanayi Ticaret Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 003956 | 26.09.2023 | 26.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 l suya | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1 | 7(3) |
| 1419 | Burbon | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione Nicosulfuron | 37,5<br>15 | g/L<br>g/L | 003957 | 28.09.2023 | 28.09.2028 | Türkiyə Respublikası | 200 ml / ha 200 ml suda həll etməklə | Qarğıdalı | İkiləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1420 | Flagfin | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Rimsulfuron | 25 | % | 003983 | 13.10.2023 | 13.10.2028 | Türkiyə Respublikası | 50 q/ha 200 l suda həll etməklə | Qarğıdalı | Birillik enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1421 | Otobur | Agrobest Grup Tarim İlaçlari Tohum İmalat İthalat İhr. San. Ve Ticaret.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cyprosulfamide (Safener)<br>Isoxaflutole | 240<br>240 | g/L<br>g/L | 003984 | 13.10.2023 | 13.10.2028 | Türkiyə Respublikası | 400 ml/ha 200 l suda həll etməklə | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1422 | Ultra 80 % WG | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Captan | 800 | g/kg | 003986 | 13.10.2023 | 13.10.2028 | Çin Xalq Respublikası | 2.5 kq/ha | Şaftalı | Yarpaq qıvrılması | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 1423 | Antiick 5 % WDG | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Abamectin | 50 | g/kg | 003987 | 13.10.2023 | 13.10.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0.4 kq/ha | Alma | Qırmızı meyvə gənəciyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 18/2 | 10(4) |
| 1424 | Fitozeb 80 % WP | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 800 | g/kg | 003988 | 13.10.2023 | 13.10.2028 | Çin Xalq Respublikası | 3.0 kq/ha | Alma | Damgil xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22/1 | 10(4) |
| 1425 | Tigr 80 % WG | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Thiram | 800 | g/kg | 003989 | 13.10.2023 | 13.10.2028 | Çin Xalq Respublikası | 2.2 kq/ha | Alma | Damgil xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22/2 | 10(4) |
| 1426 | Complice 25 % ME | Campo Alboran S.L. | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Bupirimate | 250 | g/L | 003990 | 13.10.2023 | 13.10.2028 | Çin Xalq Respublikası | 1.55 l/ha | Üzüm | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1427 | Tonus, VDQ | "Listerra" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Famoxadone<br>Cymoxanil | 250<br>250 | g/kg<br>g/kg | 003998 | 18.10.2023 | 18.10.2028 | Rusiya Federasiyası | 0.6 kq/ha | Kartof (istixana) | Alternarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1428 | Penkozol 100 EC | Pileryum Tarım ve Çida sanayi Ticaret Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 003999 | 18.10.2023 | 18.10.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.3 l/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 10(4) |
| 1429 | Diamond | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Nematisid | Ethoprophos | 200 | g/L | 004001 | 18.10.2023 | 18.10.2028 | Türkiyə Respublikası | 5 l/1000 m^2 | Pomidor | fir nematodu | Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 1430 | Eclipso 20 SC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | g/L | 004002 | 18.10.2023 | 18.10.2028 | Türkiyə Respublikası | 12.5 ml/100 l suya<br>17.5 ml/100 l suya<br>20 ml/100 l suya | Heyva<br>Armud<br>Saftalı | Alma qurdu<br>Armud minalayıcı güvəsi<br>Saftalı güvəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-12/2-3 | 7(3) |
| 1431 | Smartfresh Protabs (Yellow) | AgroFresh İnc. | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | 1-Methylcyclopropene | 20 | g/kg | 004013 | 20.10.2023 | 20.10.2028 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 6 tablet/215-268 m^3 | Alma | | Saxlanma yerlərində tabletlərin yerləşdirilməsi ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | |
| 1432 | Glif, VR | "Listerra" MMC | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate potassium salt | 540 | g/L | 004015 | 26.10.2023 | 26.10.2028 | Rusiya Federasiyası | 3 kq/ha | Alaq otları | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 1433 | Lasya | Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 100 | g/L | 004017 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha | Buğda | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1434 | Shangdong 240 EC | Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafob-propargyl,<br>Cloquintocet-mexyl (Safener) | 240<br>60 | g/L | 004018 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.2 l/ha | Buğda | Birləpəli alaqlar | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1435 | Anbimex | Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyraclostrobin<br>epoxiconazole | 85<br>62.5 | g/L | 004019 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 2 l/ha | Buğda | Unlu şeh<br>septorioz<br>qonur pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 42/2 | 7(3) |
| 1436 | Anhui 40 SC | Astranova Tarım Tic.ve San A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicusulfuron | 40 | g/L | 004020 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 125 ml/ha | Qarğıdalı | İkiləpəli alaqlar | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1437 | Manlax | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb<br>Metalaxyl | 64<br>8 | % | 004021 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 2.5 kq/ha | Kartof | Fitoftoza(Phytophthora infestans) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1438 | Porselen Xtra | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectiin Benzoate | 5 | % | 004022 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 200 q/ha | Kələm | Almaz güvə(Plutella xylostella) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1439 | Metrin Xtra | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 004023 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 1 kq/ha | Kartof | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1440 | Elite | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 004024 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 60 qr/100 l suya | alma<br>ərik | damgil<br>çiçək və meyvə moniliyası | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7-8,10-12/2-4 | 7(3) |
| 1441 | Azostar | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | g/L | 004025 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 1 l/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2-3 | 7(3) |
| 1442 | Saeta | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl Aluminium | 80 | % | 004026 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 2.5 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2-3 | 7(3) |
| 1443 | Ranger Xtra | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid | 50 | % | 004027 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0.85 kq/ha | Üzüm | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2-3 | 10(4) |
| 1444 | Speramet | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat | 100 | g/L | 004028 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 80 ml/ha | Üzüm | Unlu bit və ya cod tüklü yastıca | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/15-20 | 7(3) |
| 1445 | Hoprole Xtra | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 30 | % | 004029 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 0.077 l/ha | Pomidor(istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1 | 7(3) |
| 1446 | Abamet | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Abamectin | 18 | g/L | 004030 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 750 ml/ha | Alma | Qırmızı meyvə gənəciyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 18/2 | 10(4) |
| 1447 | Seprain | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spiromesifen | 240 | g/L | 004031 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 90 ml/ha | Pomidor(istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1 | 7(3) |
| 1448 | Cisthrin | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 004032 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 100 ml/ha | Pambıq | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 1449 | Punto | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 004033 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 170 ml/ha | Pomidor(istixana) | Yaşıl mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/1 | 7(3) |
| 1450 | Cleverdim | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 240 | g/L | 004034 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 375 ml/ha | Pambıq | Birillik İkiləpəli alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 1451 | Pendipax | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | g/L | 004035 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 2 l/ha | Soğan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/1 | 7(3) |
| 1452 | Adiconstar Plus | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Difenoconazole | 200<br>125 | g/L | 004036 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Çin Xalq Respublikası | 1 l/ha | Üzüm | Antraknoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1453 | Matrix 5 SG | "Aqro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectiin Benzoate | 5 | % | 004037 | 04.11.2023 | 04.11.2028 | Azərbaycan Respublikası | 35 qr/100 l suya | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 24/2 | 7(3) |
| 1454 | Bordeaux- G | Gyah Corporation | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper sulphate<br>Calcium Hydroxide | 24<br>7.5 | % | 004038 | 14.11.2023 | 14.11.2028 | İran İslam Respublikası | 0.5 kq/100 l suya | Pomidor(istixana) | Fitoftoza(Phytophthora infestans) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1455 | Oxi-coop | Gyah Corporation | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Oxychloride | 35 | % | 004039 | 14.11.2023 | 14.11.2028 | İran İslam Respublikası | 3 kq/1 ton suya | Alma | Damgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22/2 | 10(4) |
| 1456 | Gyahphosate | Gyah Corporation | İran İslam Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 41 | % | 004041 | 14.11.2023 | 14.11.2028 | İran İslam Respublikası | 12l / 100/L suya | Alma | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/2 | 7(3) |
| 1457 | Gysta | Gyah Corporation | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl<br>Tricyclazole | 72.5 | % | 004042 | 14.11.2023 | 14.11.2028 | İran İslam Respublikası | 500 q/ha | Çəltik | Pirikulyarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1 | 7(3) |
| 1458 | Pertila G | Gyah Corporation | İran İslam Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pretilachlor | 50 | % | 004043 | 14.11.2023 | 14.11.2028 | İran İslam Respublikası | 2 l/ha | Çəltik | Enli və iynayarpaq alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 1459 | Malathion Aria | "Ariashimi " | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 57 | % | 004044 | 14.11.2023 | 14.11.2028 | İran İslam Respublikası | 150 ml/100 L suya | Pomidor(istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1460 | Chito Life | Gyah Corporation | İran İslam Respublikası | Pestisid | Boy tənzimləyicisi | Organic Carbon | 5 | % | 004047 | 14.11.2023 | 14.11.2028 | İran İslam Respublikası | 3 l/ha | Pomidor(istixana) | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1461 | Hektaş Adonis | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prothioconazole, Azoxystrobin | 125<br>90 | g/L | 004056 | 17.11.2023 | 17.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha | Buğda | Pas<br>Unlu şeh<br>Septorioz<br>Kök xəstəlikləri | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1462 | Hektaş Hattirck | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quinclorac<br>Clomazone | 150<br>60 | g/L | 004057 | 17.11.2023 | 17.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 2 l/ha | Çəltik | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1463 | Handle | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bromoxynil octanoate<br>MCPA isooctylester | 200<br>200 | g/L | 004059 | 17.11.2023 | 17.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 2 l/ha | Buğda | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1464 | Hektaş Hora | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesosulfuron-methyl<br>Mefenpyr diethyl (safener) | 30<br>90 | g/L | 004061 | 17.11.2023 | 17.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.4 l/ha | Buğda | Birlləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1 | 7(3) |
| 1465 | Albacore | Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper sulfate equivalent to metallic copper | 65.82 | g/L | 004063 | 21.11.2023 | 21.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 150 ml/100 L suya | Pomidor(istixana) | Fitoftora(Phytophthora infestans) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1466 | Ferrigard 600 | Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Phosphorous acid | 600 | g/L | 004064 | 21.11.2023 | 21.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/100 L suya | Pomidor(istixana) | Fitoftora(Phytophthora infestans) | Vegetasiya müddətində çiləmə; yarpaq ham alt ,ham da üst tərəfdən damanlanmalıdır. | -/1 | 7(3) |
| 1467 | Priaxor EC | "BASF SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyraclostrobin<br>Fluxapyroxad | 150<br>75 | g/L | 004068 | 22.11.202. | 22.11.2028 | İspaniya Krallığı | 0.75 l/ha | Buğda | Unlu şeh<br>Septorioz<br>Pas xəstəlikləri | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 42/1-2 | 7(3) |
| 1468 | Agfesin SC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper | 65.82 | g/L | 004069 | 24.11.2023 | 24.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 600 ml/ha | Pomidor(istixana) | Fitoftora(Phytophthora infestans) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1469 | Nestor SP | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Insektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004070 | 24.11.2023 | 24.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 34 qr/1000^m | Pomidor(istixana) | Tütütn tripsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1470 | Arando SC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Insektisid | Thiamethoxam | 240 | g/L | 004071 | 24.11.2023 | 24.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha | Pomidor(istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/1 | 7(3) |
| 1471 | Paromet EC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | İmazalil | 500 | g/L | 004072 | 24.11.2023 | 24.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 150 ml/ha | Pomidor(istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1472 | Valetra SD | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil<br>Fludioxanil | 37.5<br>25 | % | 004073 | 24.11.2023 | 24.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 1.5 kq/ha | Pomidor(istixana) | Fitoftora(Phytophthora infestans) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1473 | Hektaş Tesla | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Lodosulfuron-metyyl-sodium+<br>Mesosulfuron methyl+<br>Mefenpyr diethyl(safener) | 6<br>30<br>90 | g/L | 004074 | 30.11.2023 | 30.11.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.3 l/ha | Buğda | Birlləpəli və ikilləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1 | 7(3) |
| 1474 | Cottenex 500 SC | Adama Agan LTD | İsrail Dövləti | Pestisid | Herbisid | Fluometuron | 500 | g/L | 004079 | 15.12.2023 | 15.12.2028 | İsrail Dövləti | 2 l/ha | Qarğıdalı | İkilləpəli alaq otları | Toxum cücərmamişdən əvvəl torpağa çiləmə üsulu ilə tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1475 | Belvedere Forte | Adama Agan LTD | İsrail Dövləti | Pestisid | Herbisid | Ethofumesate<br>Phenmedipham<br>Desmedipham | 200<br>100<br>100 | g/L | 004080 | 15.12.2023 | 15.12.2028 | İsrail Dövləti | 1 l/ha | Şəkər çuğunduru | İkilləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 35/1-2 | 7(3) |
| 1476 | Shavit 25 EC | Adama Makhteshim Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Triadimenol | 250 | g/L | 004081 | 15.12.2023 | 15.12.2028 | İsrail Dövləti | 40 mL/100 L suya | Şaftalı | Unlu şeh(Erysiphe necator) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1477 | Ridown XTRA | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate Ammonium salt | 74.7 | % | 004083 | 15.12.2023 | 15.12.2028 | Çin Xalq Respublikası | 3 kq/ha | Üzüm | Birillik İkilləpəli və birləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/1 | 7(3) |
| 1478 | Tancap XTRA | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 80 | % | 004084 | 15.12.2023 | 15.12.2028 | Çin Xalq Respublikası | 2 kq/ha | Kartof | Boz kif (Botrytis cinerea) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1479 | Cleaner | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 500 | g/L | 004085 | 15.12.2023 | 15.12.2028 | Çin Xalq Respublikası | 1 L/ha | Kartof | Alternarioz(Alternaria Solani) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1480 | Choiser | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Myclobutanil<br>Quinoxyfen | 45<br>45 | g/L | 004089 | 18.12.2023 | 18.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 125 ml/100 L suya | Üzüm | Unlu şeh(Erysiphe necator) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1481 | Mirage 45 EC | Adama Makhteshim Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Prochloraz | 450 | g/L | 004106 | 19.12.2023 | 19.12.2028 | İsrail Dövləti | 1 L/ha | Buğda | Fuzarioz<br>Kök çürüməsi<br>Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 35/1-2 | 7(3) |
| 1482 | Ridolaxyl | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Metalaxyl-M | 282<br>109 | g/L | 004109 | 22.12.2023 | 22.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 66 ml/100 l suya | Xiyar | Kök çürümələri(Fusarium spp,Pythium spp,Rhizoctonia spp) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1483 | Axion | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Insektisid | Flonicamid | 50 | % | 004110 | 22.12.2023 | 22.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 15 q/100 L suya | Pomidor(istixana) | Şaftalı mənənəsi(myzus persicae) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1484 | Ridown | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate isopropylamine salt | 480 | g/L | 004111 | 27.12.2023 | 27.12.2028 | Çin Xalq Respublikası | 12 L/ha | Üzüm | Birillik İkilləpəli və birləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/1 | 7(3) |
| 1485 | Ceramox Plus | Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil<br>Famoxadone | 30<br>22.5 | % | 004113 | 27.12.2023 | 27.12.2028 | Çin Xalq Respublikası | 600 q/ha | Kartof | Fitoftora(Phytophthora infestans) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1486 | Mastercop | Ingeneria Industrial S.A.De.C.V. | Meksika Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper sulfate equivalent to metallic copper | 65.82 | g/L | 004122 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Meksika Respublikası | 125 ml/ 100 L suya | Alma | Damğıl<br>Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/3 | 7(3) |
| 1487 | Affluron | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Insektisid | Diflubenzuron | 480 | g/L | 004125 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 1) 20ml/100L su<br>2) 20 ml/100L su<br>3) 25ml/100L su | 1) Alma<br>2 )Alma<br>3) Armud | 1) Alma meyvəyeyəni<br>2) Güvələr<br>3) Armud ballcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1) 10/2<br>2) 15/2-3<br>3)10/2-3 | 7(3) |
| 1488 | Agrilex | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 004126 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 L su | Alma | Avropa qırmızı gənəciyi (Panonychus ulmi) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 55-60/2 | 7(3) |
| 1489 | Mandate | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl | 70 | % | 004127 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 60 qr/100 l suya | 1) Alma<br>2) Armud<br>3) Ərik<br>4) Gilas<br>5) Heyva | 1) Damğıl, Unlu şeh<br>2)Venturia pyrina<br>3)Monilioz (sclerotinia laxa)<br>4)Moniliоz (sclerotinia laxa)<br>5)Sclerotinia linhartiana | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7-10/2-4 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | Vistro 500 SC | Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd .Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Clofentezine | 500 | g/L | 004128 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 1) 20ml/100L su<br>2) 40 ml/100L su | 1) Alma<br>2) Şaftalı | 1) Yemişan gənəciyi,Avropa qırmızı gənəciyi<br>2)iki nöqtəli qırmızı gənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2-3 | 7(3) |
| 1491 | Makfos 80 WP | Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-Al | 80 | % | 004133 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 250 qr/100 L suya | Pomidor | Fitoftora(Phytophthora infestans) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1492 | Cypersul 25 EC | Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 004134 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.3 l/ha | Pomidor | Tütün ağqanadlısı<br>(Bemisia tabaci) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1493 | Gremec 5 EC | Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 004135 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 L suya | Pomidor | İki nöqtəli qırmızı hörümçək<br>(Tetranychus urticae) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1494 | Makman 65 EC | Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | g/L | 004136 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 2 L/ha | Pomidor | Pambıq sovkası<br>(Helicoverpa armigera) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1495 | Makplan 20 SP | Clone Kimya Tarım San. Ve Tic. LTD Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004137 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 30 q/100 L suya | Pomidor | Tütün ağqanadlısı<br>(Bemisia tabaci) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1496 | Basegate | Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Haloxyfop-p-Methyl (Ester) | 108 | g/L | 004138 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 0.6 l/ha | Yerfındığı | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | |
| 1497 | Perry | Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Penoxsulam | 25.2 | g/L | 004139 | 29.12.2023 | 29.12.2028 | Türkiyə Respublikası | 800 mL/ha | Çəltik | Birillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 20/6 |
| 1498 | Şkiper SM (Шкипер ВР) | "Listerra MMC" (ООО «Листерра») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid<br>Picloram | 267<br>67 | g/L | 004141 | 08.01.2024 | 08.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.33 l/ha | Buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-30/1 | 7(3) |
| 1499 | Patron SDQ (Патрон ВДГ) | "Listerra MMC" (ООО «Листерра») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Thifensulfuron-methyl<br>Tribenuron-methyl | 500<br>250 | g/kg | 004142 | 08.01.2024 | 08.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.04 kq/ha | Buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-30/1 | 7(3) |
| 1500 | PinoKvinto EC (ПиноКвинто КЭ) | "Listerra MMC "(ООО «Листерра») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Pinoxaden+Cloquintocet-mexyl (antidot) | 50<br>12,5 | g/L | 004143 | 08.01.2024 | 08.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.8 l/ha | Buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-30/1 | 7(3) |
| 1501 | Metkiy MD (меткий МД) | "Listerra MMC" (ООО «Листерра») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione<br>Nicosulfuron | 75<br>30 | g/L | 004144 | 08.01.2024 | 08.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 1.5 l/ha | Qarğıdalı | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-30/3 | 7(3) |
| 1502 | Megapolis SM (Мегаполис ВР) | "Listerra MMC" (ООО «Листерра») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Glufosinate-ammonium | 150 | g/L | 004146 | 08.01.2024 | 08.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 3.5 l/ha | Qarğıdalı | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-30/3 | 7(3) |
| 1503 | Midas SE (Мидас СЭ) | "Listerra MMC" (ООО «Листерра») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | 2.4 Dichlorophenoxyacetic acid<br>Florasulam | 410<br>15 | g/L | 004147 | 08.01.2024 | 08.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.4 l/ha | Buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-30/1 | 7(3) |
| 1504 | Dithine XTRA | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 70 | % | 004148 | 08.01.2024 | 08.01.2029 | Çin Xalq Respublikası | 70 qram /100 l su | 1)alma<br>2)armud | Damgil(venturia inaequalis) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10/2-3 | 7(3) |
| 1505 | Spozine | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirodiclofen | 240 | g/L | 004149 | 08.01.2024 | 08.01.2029 | Çin Xalq Respublikası | 750ml/ha 1000 l suya | 1)alma<br>2)şaftalı | 2 nöqtəli qırmızı meyvə gənəciyi,<br>Avropa qırmızı gənəciyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25-30/2 | 7(3) |
| 1506 | Teafol, SM (Теафол ВР) | "Listerra MMC" (ООО «Листерра») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Chlormequat chloride | 750 | g/L | 004150 | 08.01.2024 | 08.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 1.3 l/ha | Buğda | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1507 | Coption 65 EC | "Ertar Kimya Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | g/L | 004153 | 10.01.2024 | 10.01.2029 | Türkiyə Respublikası | 90 ml/100 l suya | Kələm | Kələm ağ kəpənəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1508 | Decis Expert EC 100 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 100 | g/L | 004154 | 10.01.2024 | 10.01.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.125 l/ha | Buğda | Taxıl böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/1 | 7(3) |
| 1509 | Folicur EC 250 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 250 | g/L | 004155 | 10.01.2024 | 10.01.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.75 l/ha | Şaftalı | Sarı pas<br>Qonur pas<br>Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/1 | 7(3) |
| 1510 | Qiberelon WP (Гиберелон ВРП) | "Aqrosintez MMC" (ООО "Агросинтез") | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Gibberellin turşuları | 40 | g/kg | 004156 | 12.01.2024 | 12.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 150-200 qr/1000 l su | Gilas | | Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/2 | 7(3) |
| 1511 | Etamon Bio (Этамон Био ВРП) | "Aqrosintez MMC" (ООО "Агросинтез") | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Dimetilfosfat dimetildi-2 qidroksietil ammonium | 10 | g/kg | 004158 | 12.01.2024 | 12.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 1)500-750 qr/100 l su<br>2)500-1000 qr/ha 1000 l su | Alma | | Vegetasiya müddətində çiləmə və fertigasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14-15/2-3 | 7(3) |
| 1512 | Kornevin WP (Корневин СП) | "Aqrosintez MMC" (ООО "Агросинтез") | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | 4((İndol-3 il)yağ turşusu) | 5 | g/kg | 004159 | 12.01.2024 | 12.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 10-20 qr/1000 ədəd çiling<br>2) 1qr/1 l su 100 l işçi məhlul/100 bitkiyə<br>3) 1gr/ l su 50 l /100 bitkiya | Alma ,Gilas | | Əkindən əvvəl stilləri işçi məhlulda islatması yolu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1513 | Piler Gibb | "Plieryum Tarım ve Qida sanayi Ticaret Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki inkişafı tənzimləyicisi | Gibberellic acid | 20 | g/L | 004161 | 15.01.2024 | 15.01.2029 | Türkiyə Respublikası | 75 ml/100 l su | Gilas | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1514 | Soligar EC 425 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prothioconazole<br>Tebuconazole<br>Spiroxamine | 53<br>148<br>224 | g/L | 004164 | 25.01.2024 | 25.01.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.8 L/ ha | Buğda | Unlu Şeh<br>Pas<br>Septoriоz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/1-2 | 7(3) |
| 1515 | Mahancor | "Sadat Mahan Chemical Company" | İran İslam Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 004167 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | İran İslam Respublikası | 0.60 kq/ha 300 L suya | Soya | Birillik ikiləpəli və dənli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1516 | Grader 24/7% SC | "Sadat Mahan Chemical Company" | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam + Lambda - Cyhalothrin SC | 14.1<br>10.6 | % | 004168 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | İran İslam Respublikası | 0.30 L/ha 300 L su | Pomidor | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1517 | Mahanaxyl 72 % WP | "Sadat Mahan Chemical Company" | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl+<br>Mancozeb | 8<br>64 | % | 004169 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | İran İslam Respublikası | 2.5 kq/ 1000 L suya | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/3 | 10 (3) |
| 1518 | Mahancap | "Sadat Mahan Chemical Company" | İran İslam Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 004170 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | İran İslam Respublikası | 3 kq /1000 L suya | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2-4 | 7(3) |
| 1519 | Mahanvidor | "Sadat Mahan Chemical Company" | İran İslam Respublikası | Pestisid | İnsektisid -akarisid | Spirodiclofen | 24 | % | 004171 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | İran İslam Respublikası | 0.5 L /1000 L suya | Üzüm | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10/2-3 | 10 (4) |
| 1520 | Roypic 240 EC | "Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Sti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafob-propargyl,<br>Cloquintocet-mexyl (Safener) | 240<br>60 | g/L | 004172 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | Türkiyə Respublikası | 22 ml/1000 $m^2$ sahəyə | Buğda | Birillik ince yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1521 | Roymax FS | "Royal-Fen Kimya Tarım İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-fungisid | Thiamethoxam+<br>Fludioxonil+<br>Difenoconazole | 262.5<br>25<br>25 | g/L | 004173 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | Türkiyə Respublikası | 220 ml /100kq toxum | Buğda | 1) Taxıl böcəyi<br>2) məftil qurdlara<br>3) dənədişilərə qarşı | Sapından əvvəl buğda toxumunun dərmanlanaraq saplması tövsiyə olunur. | 25/1-2 | 7(3) |
| 1522 | Ser Süper | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofob-p- ethyl | 50 | g/L | 004178 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/1000 $m^2$ sahəyə | Üzüm | Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/1-2 | 7(3) |
| 1523 | Starcyper EC | "Mehmani Organics Limited" | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 004181 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | Hindistan Respublikası | 0.32 L/ha | Pomidor | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 12-15/1-2 | 7(3) |
| 1524 | Avaunt 150 EC | "FMC İnternational Switzerland Sarl" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | g/L | 004195 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 1) 0.4-0.45 L/ha<br>2)0.25-0.3 L/ha<br>3)0.35 L/ha<br>4)0.35-0.4 L/ha | 1) Pambıq<br>2) Üzüm<br>3) Alma<br>4) Pomidor | 1) Pambıq sovkası<br>2) Yarpaq bükan<br>3) Meyvəyeyən<br>4) Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1525 | Granstar Pro WG | "FMC İnternational Switzerland Sarl" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron methyl | 750 | g/kg | 004196 | 26.01.2024 | 26.01.2029 | Fransa Respublikası | 0.01-0.015 kq/ha | Taxıl | Birillik ikiləpəli, eləcədə 2,4 D-yə davamlı alaq otları | Alaq otlarının erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1526 | Klini Xtreme | "Nufarm GmbH & Co KG" | Avstriya Respublikası | Pestisid | Herbisid | a mixture of glyphosate IPA and potassium salts (calculated 540 g/l Glyphosate) | 700 | g/L | 004201 | 29.01.2024 | 29.01.2029 | Avstriya Respublikası | 3.0 L/ha | Alma | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 45/2 | 7(3) |
| 1527 | Champion WG | "Nufarm GmbH & Co KG" | Avstriya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Hydroxide | 770 | g/kg | 004202 | 29.01.2024 | 29.01.2029 | Çili Respublikası | 3.0 kq/ha | Pomidor(istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10/2 | 7(3) |
| 1528 | Affet | "MITSUI CHEMICALS CROP & LIFE SOLUTION, INC." | Yaponiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penthiopyrad | 200 | g/L | 004203 | 29.01.2024 | 29.01.2029 | Yaponiya Respublikası | 0.75-1.0 L/ha | Alma | Damgil<br>unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1529 | Temiflyu KS (Темифлю КС) | "Listerra MMC" (ООО «Листерра») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektofungisid | Thiamethoxam<br>Mefenoxam<br>Fludioxonil | 280<br>32.3<br>8 | g/L | 004205 | 30.01.2024 | 30.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 15 lt/ ton toxum | Raps | 1)Xaççiçəklilər birəsi və ya raps birəsi<br>2) "Qara ayaq"- kök çürüməsi ,toxumların kiflənməsi, alternarioz ,fomoz xəstəlikləri | Toxumların sapınqabağı dərmanlanması üsulu ilə atbıqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1530 | Simus Proqres KE (Цимус Прогресс КЭ) | "Listerra MMC" (ООО «Листерра») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole<br>Cyproconazole | 250<br>80 | g/L | 004206 | 29.01.2024 | 29.01.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.5 L/ha | Noxud | Askoxitoz<br>Pas xəstaliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 40/1-2 | 7(3) |
| 1531 | Safegor 40 EC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 004218 | 01.02.2024 | 01.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.2 L/ha | Pambıq | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 10(4) |
| 1532 | Delta | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 2.5 | % | 004219 | 08.02.2024 | 08.02.2029 | Hindistan Respublikası | 750 mL/ha | Pambıq | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1533 | Capitan | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Captan | 80 | % | 004220 | 08.02.2024 | 08.02.2029 | Hindistan Respublikası | 375 qr/100 L suya | Pomidor (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | Abama-18 | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Abamectin | 1.8 | % | 004221 | 08.02.2024 | 08.02.2029 | Hindistan Respublikası | 0.750 ml/1000 L suya | Üzüm | Bağ hörümçək gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22/2 | 10(4) |
| 1535 | Final 20 % SP | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004222 | 08.02.2024 | 08.02.2029 | Hindistan Respublikası | 52qr/500 L suya | Pambıq | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1536 | Defender 25% | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 25 | % | 004223 | 08.02.2024 | 08.02.2029 | Hindistan Respublikası | 32 ml/100 L suya | Üzüm | Boz çürümə xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1537 | İndox-15 | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 15 | % | 004224 | 08.02.2024 | 08.02.2029 | Hindistan Respublikası | 200 ml/0.4ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1538 | Emaben 57 WG | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5.7 | % | 004225 | 08.02.2024 | 08.02.2029 | Hindistan Respublikası | 222 qr/1000 L suya | Üzüm | Üzüm salxım yarpaq bükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/3 | 7(3) |
| 1539 | Timet 70 % | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Thiophanate Methyl | 70 | % | 004226 | 08.02.2024 | 08.02.2029 | Hindistan Respublikası | 290 qr/0.4 ha | Üzüm | Antraknoz xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1540 | Efedor Ölü (cas N63148-62-9) | "Agrobest Group Tar.İ.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid<br>Mineral Oil | 4<br>704 | g/L | 004227 | 19.02.2024 | 19.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 2.5 L/100 L suya | Alma | Kalifomiya qanaqlı yastıcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/1-2 | 7(3) |
| 1541 | Cosagran | "Sulphur Mills Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid-akarisid | Sulphur | 80 | % | 004233 | 20.02.2024 | 20.02.2029 | Hindistan Respublikası | 400 q/100 L suya | Şaftalı<br>Alma | Göbələk mənşəli unlu şeh (Podaspharea leucotricha) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1542 | Biogibb | "Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | Gibberellic Acid | 20 | g/L | 004234 | 20.02.2024 | 20.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 75-100 ml/100 L su | Armud | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-12/1-2 | 7(3) |
| 1543 | Cabrio Top 60 WG | "Basf Se" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyraclostrobin<br>Metiram | 5<br>55 | % | 004239 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 1.5-2 kq/ha | Üzüm | Mildiu<br>Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/2 | 7(4) |
| 1544 | Azimut 320 SC | "Adama Makhteshim Ltd." | İsrail dövləti | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole<br>Azoxystrobin | 200<br>120 | g/L | 004240 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | İsrail dövləti | 0.75 L/ha | Şəkər çuğunduru | Serkosporoz<br>unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1545 | Goltix 700 SC | "Adama Agan Ltd." | İsrail dövləti | Pestisid | Herbisid | Metamitron | 700 | g/L | 004243 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | İsrail dövləti | 4 L/ha | Şəkər çuğunduru | İkilapalı alaqlara qarşı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1546 | Agil Extra 100 EC | "Adama Agan Ltd." | İsrail dövləti | Pestisid | Herbisid | Propaquizafop | 100 | g/L | 004244 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | İsrail dövləti | 0.5 L/ha | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/1-2 | 7(3) |
| 1547 | Mentamin 500 SL | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Dimethyl Amine Salt Equivalent To 2,4-D Acid | 500 | g/L | 004245 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.7 L/ha | Buğda | Birillik geniş yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1548 | Menta Prelüd | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | g/L | 004246 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 125 ml/100 L suya | Pomidor (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1549 | Menta Inox | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004247 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 L suya | Xiyar (istixana) | Qabaqkimilərdə unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1550 | Enigma 20 WP | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Pyridaben | 20 | % | 004248 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 100 q/100 L suya | Pomidor(istixana) | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1551 | Menta Lapis | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsdektisid | Lufenuron | 50 | g/L | 004249 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/ha | Bibər (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1552 | Spector 20 SP | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsdektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004250 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 300 q/ha | Pomidor(istixana) | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1553 | Menta Metafor 70 WP | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate Methyl | 70 | % | 004251 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 40 q / 100 L suya | Xiyar (istixana) | Qabaqkimilərdə unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1554 | Nucleus 5 EC | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 004252 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 500 ml/100 lt su | Badımcan (istixana) | qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1555 | Mentamectin 1.8 EC | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 004253 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 250 ml/ha | Pomidor(istixana) | ikinöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1556 | Menta Ufo | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 004254 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 L suya | Pomidor(istixana) | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1557 | Exodia | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 004255 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 35 ml/100 L suya | Pomidor(istixana) | ikinöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1558 | Menta Trigon | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | g/L | 004256 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 35 ml/100 L suya | Pomidor(istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1559 | Pitomets KS (Питомец, КС) | Listerra MMC (ООО «Листера») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam<br>Alpha-cypermethrin | 150<br>150 | g/L | 004257 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.15 L/ha | Buğda | ziyankar bağacıq,<br>zalıca böcəyi<br>taxıl böcəkləri<br>mənənə<br>trips | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1-2 | 7(3) |
| 1560 | Agrisave SL | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propamocarb -HCl | 722 | g/L | 004258 | 21.02.2024 | 21.02.2029 | Türkiyə Respublikası | 2.5 L/ha | Pomidor(istixana) | Fitoflora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1561 | Foster | "Newton Chemicals Co" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-Al | 80 | % | 004265 | 26.02.2024 | 26.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 260 q/100 L suya | Limon | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 1562 | Prime 30 | "Newton Chemicals Co" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | g/L | 004266 | 26.02.2024 | 26.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 500 q/ha | Çaltik | Pinkulyarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1-2 | 7(3) |
| 1563 | Maze | "Newton Chemicals Co" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Imazalil | 500 | g/L | 004267 | 26.02.2024 | 26.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2 L/ha | Limon | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 1564 | Titan | "Newton Chemicals Co" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Thiram | 80 | % | 004268 | 26.02.2024 | 26.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1.4 kq/ha | Xiyar (istixana) | Antraknoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/2 | 7(3) |
| 1565 | Gobi 757 | "Newton Chemicals Co" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 75.7 | % | 004269 | 26.02.2024 | 26.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 4 kq/ha | Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1566 | Z-Ram | "Newton Chemicals Co" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Ziram | 72 | % | 004270 | 26.02.2024 | 26.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1.4 kq/ha | Xiyar (istixana) | Antraknoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/2 | 7(3) |
| 1567 | Camper | "Newton Chemicals Co" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Herbisid | Dicamba | 48 | % | 004271 | 26.02.2024 | 26.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 405 ml/ha | Buğda | Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1568 | Gobi | "Newton Chemicals Co" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA salt | 480 | g/L | 004272 | 26.02.2024 | 26.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.2 L/ha | qarğıdalı | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1569 | Glimp 75.7 % WG | "Campo Alboran S.L." | İspaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 757 | g/kg | 004278 | 28.02.2024 | 28.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2 L/ha | Fındıq | Çoxillik və birillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 45-60/2 | 7(3) |
| 1570 | Cimex 25% EC | "Campo Alboran S.L." | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 004279 | 28.02.2024 | 28.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.32 L/ha 1000 l su | Alma | 1)Alma meyveyeyani<br>2)yarpaqbükənlər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/2-3 | 7(3) |
| 1571 | Lamdoro 10% CS | "Campo Alboran S.L." | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Lambda -cyhalothrin | 100 | g/L | 004280 | 28.02.2024 | 28.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.2 L/ha 1000 L su | Alma | 1)Alma meyveyeyani<br>2)yarpaqbükənlər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7-14/2 | 7(3) |
| 1572 | Tinox 70% WDG | "Campo Alboran S.L." | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 700 | g/kg | 004281 | 28.02.2024 | 28.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.7 kq/ ha /1000 L su | 1) Alma<br>2) Şaftalı<br>3) Ərik | 1) Dəmgil<br>2) Yarpaq qıvrılması<br>3) Desikt təkəllik | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/2-3 | 7(3) |
| 1573 | Pyridox 20 % WP | "Campo Alboran S.L." | İspaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Pyridaben | 200 | g/kg | 004282 | 28.02.2024 | 28.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.75 kq/ha 1000 L su | Alma | Meyvə gənələri | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25-30/2 | 7(3) |
| 1574 | Kremex 50 % WG | "Campo Alboran S.L." | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-Methyl | 500 | g/kg | 004283 | 28.02.2024 | 28.02.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.3 L/ha 1000 L su | Alma | Dəmgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7/2-3 | 7(3) |
| 1575 | Balboa | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Mineral yağ<br>(CAS:8042-47-5) | 800 | g/L | 004287 | 07.03.2024 | 07.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 810 ml/100 l suya | Xiyar (istixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/2 | 7(3) |
| 1576 | Outribut | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Propoxycarbazone-sodium<br>Mesosulfuron-methyl<br>Mefenpyr-diethyl(safaner) | 6.75<br>4.5<br>9 | % | 004288 | 07.03.2024 | 07.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 30g/1000m$^2$ | Buğda | Birillik ince yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1577 | Basking | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohum İmalat İthalat İhr. San. ve Ticaret A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prochloraz<br>Trifloxystrobin<br>Cymoxanamide | 250<br>75<br>50 | g/L | 004289 | 07.03.2024 | 07.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/ha | Buğda | Pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1-2 | 7(3) |
| 1578 | Alecto WG | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metiram<br>Cymoxanil | 57<br>4.8 | % | 004290 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 2 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 28/3 | 7(3) |
| 1579 | Conrad Max | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Difenoconazole | 200<br>125 | g/L | 004291 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 l suya | Pomidor | Badımcançiçəklilərdə unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/1-2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | Safa Bless | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid<br>Pyraclostrobin | 25.2<br>12.8 | % | 004292 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1) 30q/100 l su<br>2) 30 q 100 l su<br>3) 40 q/100 l su<br>4) 40 q/100 l su<br>5) 50 q/100 l su | 1) Alma<br>2) Armud<br>3) Ərik<br>4) Gilas<br>5) Heyva | 1) Dəmgil<br>2) Venturia pyrina<br>3) Monilinia laxa | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7/2-4 | 7(3) |
| 1581 | Raider Süper | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spirodiclofen<br>Abamectin | 185<br>15 | g/L | 004293 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1) 30 ml/100 l su<br>2) 25 ml/100 l su | 1) Alma<br>2) Şaftalı gilas | 1) Avropa qırmızı gənəciyi<br>2) İkinöqtəli gənəciyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2-3 | 7(3) |
| 1582 | Sponsor Aqua | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 455 | g/L | 004294 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 3 l/ha | | Günəbaxan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1583 | Talent Süper | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 116.2 | g/L | 004295 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.8 l/ ha | | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1584 | Taldex Pellet | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Molyusksid | Metaldehyde | 5 | % | 004296 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 5 kq/ha | | Pomidor (istixana) | Çılpaq ilbizlər | Vegetasiya müddətində bitkiların ətrafına səpilməklə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1-2 | 10(4) |
| 1585 | Safa Alegria SC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb<br>Emamectin Benzoate | 106<br>53 | g/L | 004297 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 260 ml/ha | | Pambıq | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1586 | Etrex Extra | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | Ethephon | 720 | g/L | 004298 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 2 l/ha | | Pambıq | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/1-2 | 7(3) |
| 1587 | Movento Energy SC 240 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat<br>Imidacloprid | 120<br>120 | g/L | 004306 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.8 L/ha | | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1588 | Sekator Turbo OD 375 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Amidosulfuron<br>Iodosulfuron-methyl-natrium<br>Mefenpyr-diethyl (antidot) | 100<br>25<br>250 | g/L | 004307 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.1 L/ha | | Buğda | Birillik ikiləpəli alaq otları | Bitkilərin boruyaçəmə fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1-2 | 7(3) |
| 1589 | Magnaphos Plate | "UPL Limited" | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fumiqant | Magnesium Phosphide | 56 | % | 004313 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 3 lövhə/1 $m^2$ | | Anbar zərərvericisi | Taxıl anbarı | Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1590 | Quickphos | "UPL Limited" | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fumiqant | Aluminium phosphide | 57 | % | 004314 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 3 hab/1 $m^2$ | | Anbar zərərvericisi | Taxıl anbarı | Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1591 | Magnaphos | "UPL Limited" | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fumiqant | Magnesium Phosphide | 66 | % | 004315 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 3 hab/1 $m^2$ | | Anbar zərərvericisi | Taxıl anbarı | Taxıl saxlanılan anbara tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1592 | Folpan 80 WDG | "Adama Makhteshim Ltd." | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Folpet | 80 | % | 004316 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İsrail Dövləti | 1.5-2 kq/1000 L su | | Alma | Dəmgil<br>Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1593 | Frame | "Sinoway International(Jiangsu)Co.Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron methyl | 75 | % | 004317 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 10-15 q/ha | | Buğda | Alaq otları (birillik çoxillik ) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/3 | 7(3) |
| 1594 | Boscalbin | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid<br>Pyraclostrobin | 150<br>100 | g/L | 004321 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1050 ml/ha | | Pomidor (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1595 | Coppo | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper oxychloride | 500 | g/kg | 004322 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 600 q/ha | | Xiyar | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1596 | Acerit | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 200 | g/kg | 004323 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 240 q/ha | | Pomidor | Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1597 | Indoben | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate<br>Indoxacarb | 50<br>150 | g/L | 004324 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 300 ml/ha | | Pomidor | Çuğundur sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1598 | Manco | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 800 | g/kg | 004325 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3750 q/ha | | Xiyar | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1599 | Thiofil | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl | 700 | g/kg | 004326 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 600 q/ha | | Xiyar | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1600 | Kaptan | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 800 | g/kg | 004327 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 360 q/ha | | Xiyar | Antraknoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1601 | Cytrin | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 500 | g/L | 004328 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 120 ml/ha | | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1602 | Lamthrin | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 100 | g/L | 004329 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 120 ml/ha | | Pomidor | Manənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1603 | Imidal | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid<br>Lambda-cyhalothrin | 300<br>100 | g/L | 004330 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 90 ml/ha | | Pomidor | Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1604 | Penco | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004331 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 600 ml/ha | | Xiyar | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1605 | Abamet | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Etoxazole<br>Abamectin | 200<br>50 | g/L | 004332 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 150 ml/ha | | Pomidor | Qırmızı hörümçəklər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1606 | Deltarin | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 50 | g/L | 004333 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 375 ml/ha | | Pomidor | Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1607 | Tebucan | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 250 | g/L | 004334 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Çin Xalq Respublikası | 460 ml/ha | | Xiyar | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1608 | Regalis Plus | "Basf SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Prohexadion Calcium | 100 | q/kq | 004335 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 1.8 kq/ha | | Üzüm | | Gilələrin formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1609 | Yamactin 1.8% EC | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Akarisid | Abamectin | 1.8 | % | 004336 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 45 ml/100 l suya | | Pomidor (istixana) | Qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1610 | Leond 5% EC | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Lufenuron | 5 | % | 004337 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 40 ml/100 l suya | | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1611 | Global 65% WP | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Copper Hydroxide<br>Metalaxyl-M | 60<br>5 | % | 004338 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 225 q/100l su | | Kartof | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1612 | Foselyam 80% WP | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Fosetyl aluminuim | 80 | % | 004339 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 300 q/100 l su | | Pomidor (istixana) | kök çürümələri | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1613 | Deltayam 2.5% EC | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 2.5 | % | 004340 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 75 ml/100 l suya | | Kartof | Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1614 | Agri-Ten 8.4% SC | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 8.4 | % | 004341 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 15 ml/100 l su | | Pomidor (istixana) | İkinöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1615 | Fortal 39% SE | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Metalaxyl-M | 28.2<br>10.8 | % | 004342 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 1130 ml/ha | | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1616 | Kara-Star 32.5% SC | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole<br>Azoxystrobin | 12.5<br>20 | % | 004344 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 50 ml/100 l su | | Pomidor (istixana) | Alternariya | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1617 | Lastro 24.7 % SC | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam<br>Lambda-cyhalothrin | 14.1<br>10.6 | % | 004345 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 35 ml/100 l su | | Pomidor (istixana) | Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1618 | Yamagreen 30% SL | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Hymexazole | 30 | % | 004346 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 200 ml/100 l su | | Pomidor (istixana) | Fuzarium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1619 | Yamathrin 25% EC | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 25 | % | 004347 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 25 ml/100 L suya | | Kələm | Almaz güvə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1620 | Nemamyl 24% SL | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid-Nematisid-Akarisid | Oxamyl | 24 | % | 004348 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 600 ml/100 l su | | Pomidor (istixana) | Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1621 | Alphayam 10% EC | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 10 | % | 004349 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 300 ml/ha | | Üzüm | Salxım yarpaq bükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7/2-3 | 7(3) |
| 1622 | Floryam 24% EC | "Yamama Agri Products Industrial Company LTD." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 24 | % | 004350 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | İordaniya Krallığı | 4 l/ha | | Üzüm | Birillik ikiləpəli və birləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30-56/3 | 7(3) |
| 1623 | Mentagard | "Menta Tarım İlaçları San ve Tic Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 004351 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.35 l/ha | | Şəkər çuğunduru | Serkosporioz xətə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 7(3) |
| 1624 | Alpha | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Alpha cypermethrin | 100 | g/L | 004352 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 180 ml/ha | | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1625 | Azul | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Bordeaux Mixture | 20 | % | 004353 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 420 q/100 l suya | | Limon | Penicillium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 1626 | Metro 70 | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 004354 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 0.3 q/ha | | Buğda | Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1627 | Falcon | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | g/L | 004355 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 155 ml/ha | | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1628 | Sphinx | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Sulphur | 80 | % | 004356 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 3.13 kq/100 l suya | | Limon | Alternarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 1629 | Lambda-C | "Newton Chemicals Co." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Lamda Cyhalothrin | 4.9 | % | 004357 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 320 ml/ha | | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1630 | Cymet | "Newton Chemicals Co" | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 004358 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Hindistan Respublikası | 80 ml/ha | | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1631 | Safezone | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | S-metolachlor<br>Benoxacor | 915<br>45 | g/L | 004359 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.7 l/ha | | Pambıq | Sapından əvvəl alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1632 | Planlarel (Плантрарел) | "Хевагаці" ММС (ООО "Хевбарил") | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | kolloid gümüş (Ag)<br>polihekzametilen biquanud hidroxlorid | 0.5<br>0.5 | g/L | 004360 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Rusiya Federasiyası | 1 l/ha | | Xiyar (istixana) | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/3 | 7(3) |
| 1633 | Caira | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | g/L | 004362 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 65 ml/100 l suya | | Yalançı unlu şeh | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/2 | 7(3) |
| 1634 | Ventigra | "Basf Agrochemical Products B.V." | Puerto-Riko | Pestisid | İnsektisid | Afidopyropen | 100 | g/L | 004363 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Fransa Respublikası | 105 ml/ha | | Pambıq | Manənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1635 | Pemena | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | İnsektisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 004365 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 l suya | | Pomidor (istixana) | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1636 | Galeron 600 | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Phosphorous acid | 600 | g/L | 004366 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/100 l suya | | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1637 | İnvesto 100 SC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat | 100 | g/L | 004367 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1) 100ml/100 l su<br>2) 75 ml/100 l su<br>3) 50ml/100 L su | 1) Armud<br>2) Şaftalı<br>3) Alma | 1) Armud ballcası<br>2) Tut yastıcası, şaftalı manənəsi<br>3) Alma yaxılı manənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-12/2-3 | 7(3) |
| 1638 | Tolyparen 20 SC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | g/L | 004368 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1) 12.5 ml/100 l su<br>2) 20 ml/100 l su | 1) Alma, Armud<br>2) Şaftalı, Şəkərli | 1) Alma meyvəyeyəni<br>2) Şaftalı güvəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10/2-3 | 7(3) |
| 1639 | Sulfopower 800 SC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Sulphur | 800 | g/L | 004369 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 4 l/ha | | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-12/3 | 7(3) |
| 1640 | Caddifel 500 SC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Fluometuron | 500 | g/L | 004370 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 2.2 l/ha | | Pambıq | Dar və geniş yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1641 | Goggles 500 SC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metamitron<br>Ethofumesate | 350<br>150 | g/L | 004371 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 2.1 l/ha | | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1642 | Sphera Max SC 535 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Trifloxystrobin<br>Cyproconazole | 375<br>160 | g/L | 004375 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.4 l/ha | | Şəkər çuğunduru | Unlu şeh<br>Serkosporoz<br>Fomoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/1-2 | 7(3) |
| 1643 | Ramox Ultra | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Imazamox | 40 | g/L | 004376 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.3 l/ha | | Yonca | Sarı sarmaşıq | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1644 | Knockdown 24 SL | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate IPA | 240 | g/L | 004377 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 3 l/ha | | Alma | Dar və geniş yarpaqlı birillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 45-60/2 | 7(3) |
| 1645 | Teren | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Flonicamid | 50 | % | 004378 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 15 q/100 l su | | Xiyar (istixana) | Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1646 | Entovant 150 SC | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | İndoxacarb | 150 | g/L | 004380 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.45 l/ha | | Pambıq | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1647 | Fosetal 800 WP | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl Aluminium | 80 | % | 004381 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 2.1 kq/ha | | Xiyar (istixana) | yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/2 | 7(3) |
| 1648 | Siklodefol 720 SL | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Ethephon | 720 | g/L | 004382 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.22 l/ha | | Pambıq | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1649 | Duet Ekstra 550 WP | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole<br>Thiamethoxam | 200<br>350 | q/kg | 004383 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.3 kq/ha | Alma | damgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22/2 | 10(4) |
| 1650 | Aramis 380 WDG | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid<br>Pyraclostrobin | 252<br>128 | g/kg | 004384 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.8 kq/ha | Alma | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22/2 | 10(4) |
| 1651 | Entoxlorok 850 WP | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper oxychloride | 85 | % | 004385 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 4 kq/ha | Üzüm | Antraknoz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1652 | İndoksamektin 93 SC | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | İndoxacarb<br>Abamectin | 7.5<br>1.8 | % | 004386 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.7 l/ha | Üzüm | Üzüm salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/3 | 7(3) |
| 1653 | Entovant Pro 300 WDG | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 30 | % | 004387 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.25 kq/ha | Pomidor (istixana) | pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1654 | Entosoran 100 WP | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 100 | g/kg | 004388 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.2 kq/ha | Pambıq | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/2 | 7(3) |
| 1655 | Protekt Pro 150 SC | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb<br>Emamectin Benzoate | 100<br>50 | g/L | 004389 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.45 l/ha | Pambıq | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1656 | Aksess 500 SC | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 50 | % | 004390 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 3 l/ha | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1657 | Address 250 SC | "İfoda Agro Kimyo Himoya" MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 25 | % | 004391 | 15.03.2024 | 15.03.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.6 l/ha | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1658 | Cytron EC | "Tapazol Chemical Works Ltd." | İsrail Dövləti | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 004397 | 18.03.2024 | 18.03.2029 | İsrail Dövləti | 400 ml/1000 l su | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni<br>(gilələqurdu) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1659 | Biomectin EC | "Tapazol Chemical Works Ltd." | İsrail Dövləti | Pestisid | İnsektisid | Abamectin | 18 | g/L | 004398 | 18.03.2024 | 18.03.2029 | İsrail Dövləti | 75 ml/100 l su | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni<br>( gilələqurdu) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/2 | 7(3) |
| 1660 | Skipper EC | "Tapazol Chemical Works Ltd." | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 004399 | 18.03.2024 | 18.03.2029 | İsrail Dövləti | 0.15 L/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 10(4) |
| 1661 | Kodkod SC | "Tapazol Chemical Works Ltd". | İsrail Dövləti | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 350 | g/L | 004400 | 18.03.2024 | 18.03.2029 | İsrail Dövləti | 1-2 ml/1 bitki | Üzüm | Yastıcalar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10/2-3 | 10(4) |
| 1662 | Atlas EC | "Tapazol Chemical Works Ltd". | İsrail Dövləti | Pestisid | İnsektisid | Bifenthrin | 100 | g/L | 004401 | 18.03.2024 | 18.03.2029 | İsrail Dövləti | 75 ml/1000 $m^2$ | Pomidor (istixana) | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/1-2 | 7(3) |
| 1663 | Atreus | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil<br>Trifloxystrobin | 310<br>95 | g/L | 004402 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 45 ml/100 l suya | Alma | Damgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/3 | 7(3) |
| 1664 | Rauma | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prochloraz<br>Propiconazole | 400<br>90 | g/L | 004403 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.25 l/ha | Buğda | Kök çürüməsi<br>Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 40/1-2 | 7(3) |
| 1665 | Sound SL | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Hymexazole | 360 | g/L | 004404 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 150 ml/100 l suya | Pomidor | Fuzarioz | Vegetasiya müddətində damlama üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 1666 | Battalion 100 EC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Bifenthrin | 100 | g/L | 004405 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1) 20-30 ml/100 l suya<br>2) 50 ml/100 l suya | 1) Alma<br>2) Pomidor | 1) Alma meyvəyeyəni<br>2) Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1) 28/2<br>2) 10/2 | 7(3) |
| 1667 | Deltharin 2.5 EC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 004406 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 15 ml/100 l su | Alma | Alma çiçəkyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 1668 | Fudine 500 SC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 500 | g/L | 004407 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 l suya | Alma | Damgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 28/3 | 7(3) |
| 1669 | Fullspeed | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | g/L | 004408 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.25 l/ha | Üzüm | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları. | Alaq otlarının ilkin inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1670 | Magical 250 EC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 004409 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 15-20 ml/100 l suya | Alma | Damgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/4 | 7(3) |
| 1671 | Manchet | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ziram | 76 | % | 004410 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1) 200-250 q/100 l suya<br>2) 250-300 q/100 l suya | 1) Şaftalı<br>2) Ərik | 1) Yarpaq qıvrılması<br>2) Klasterosporioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1) 25/2<br>2) 36/2 | 7(3) |
| 1672 | Smach 24 SC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spirodiclofen | 240 | g/L | 004411 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/100 l suya | Alma | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 7(3) |
| 1673 | Walnus Süper | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-P-ethyl<br>Clopyuntocet-meyxl (safaner) | 69<br>33 | g/L | 004412 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.8-0.9 l/ha | Arpa | Birləpəli alaq otları | Bitkilərin kollanma fazasında tətbiqi tövsiyə edilir | 60/1-2 | 7(3) |
| 1674 | Gremlin | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Indoxacarb | 150 | g/L | 004413 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 35 ml/100 l suya | Alma | 1) Yarpaqbükən<br>2) Mevsuseyən | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1675 | Quartette 70 WP | "Hektaş Ticaret T.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate methyl | 70 | % | 004414 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 60 q/100 l suya | 1) Alma<br>2) Armud | 1) Alma<br>2) Armud | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2-3 | 7(3) |
| 1676 | Delan 700 WG | "Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 70 | % | 004415 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | İtaliya Respublikası | 0.5-0.7 kq/ha | 1) Üzüm<br>2) Alma<br>3) Şaftalı | 1) Mildiu<br>2) Damgil<br>3) Damgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1) 28/5<br>2) 15/3<br>3) 28/6 | 7(3) |
| 1677 | Spintor 240 SC | "Corteva Agriscience International Sarl" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 240 | g/L | 004417 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Fransa Respublikası | 0.2 l/ha | Pomidor (istixana) | 1) Pambıq sovkası<br>2) Trips | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 5/2 | 7(3) |
| 1678 | Dithane M-45 | "Corteva Agriscience International Sarl" | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 800 | q/kq | 004418 | 27.03.2024 | 27.03.2029 | Kolumbiya Respublikası | 1) 2kq/ha<br>2) 3.5 kq/ha | 1) Pomidor<br>2) Kartof<br>3) Alma<br>3) Üzüm<br>4) Buğda | 1,2) Fitoftora<br>3) Damgil<br>4) Mildiu<br>5) Pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1,2,3) 20/3<br>4) 30/4<br>5) 20/3 | 7(3) |
| 1679 | Armaza S Gold | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | S-Metolachlor<br>Benoxacor (safener) | 915<br>45 | g/L | 004419 | 28.03.2024 | 28.03.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.5 l/ha | Pomidor | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1680 | Alphamethrin 10% EC | Meghmani Organics Limited | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha cypermethrin | 100 | g/L | 004428 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Hindistan Respublikası | 500 ml/ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1681 | Barrier 35 DS | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl | 35 | % | 004434 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 500 q/100 kq toxuma | Günəbaxan | Mildiu | Sapından qabaq toxumun darmanlanması tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1682 | Rhythm SC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | g/L | 004435 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 l suya | Alma | Damgil<br>Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1683 | Beltanol L | Probelte S.A | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | 8-hydroxyquinoline sulphate | 500 | g/L | 004437 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 200 ml/1000 $m^2$ sahəyə | Pomidor (istixana) | Kök çürüməsi | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1684 | Freya 240 SC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Bifenazate | 240 | g/L | 004438 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 600 ml/ha | Pomidor | Qırmızı hörümçəklər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1685 | Trowel 050 EC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lufenuron | 50 | g/L | 004439 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 30 ml/100 l suya | Xiyar | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1686 | Capito | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb<br>Abamectin | 75<br>18 | g/L | 004440 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 l suya | Şaftalı | Şaftalı güvəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1-2 | 7(3) |
| 1687 | Eclipso 35 WG | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 35 | % | 004441 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 12 q/100 l suya | Xiyar | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1688 | Penrival 100 EC | Hektaş Ticaret T.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004442 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 250 ml/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21/4-5 | 7(3) |
| 1689 | Almaz | Ningbo Generic Chemical Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004443 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.3 l/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 10(4) |
| 1690 | Valsazeb | Ningbo Generic Chemical Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 004444 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3 kq/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/10-12 | 7(3) |
| 1691 | Metalyx | Newton Chemicals Co | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl<br>Mancozeb | 8<br>64 | % | 004446 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Hindistan Respublikası | 2.5 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/- | 10(3) |
| 1692 | Denali | Newton Chemicals Co | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 75 | % | 004447 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1 l/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-21/2-3 | 7(3) |
| 1693 | Bamboo | Newton Chemicals Co | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Fludioxonil<br>Cyprodinil | 25<br>37.5 | % | 004448 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1 l/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2-3 | 7(3) |
| 1694 | Phoenix | Newton Chemicals Co | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Propiconazole | 25 | % | 004449 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Hindistan Respublikası | 50 ml/ha | Buğda | Pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1-2 | 7(3) |
| 1695 | N-Dimet | Newton Chemicals Co | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 40 | % | 004450 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Hindistan Respublikası | 660 ml/ha | Kartof akinləri | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1696 | Manco 80 | Newton Chemicals Co | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 004451 | 16.04.2024 | 16.04.2029 | Hindistan Respublikası | 260 q/100 l suya | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1697 | Dubius KS (Дубиус КС) | Listerra MMC (ООО Листерра) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 600 | g/L | 004461 | 17.04.2024 | 17.04.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.6-0.75 l/ton | Payızlıq buğda | 1) Taxıl böcəyi<br>2) Mafitl qurdu | Sapınçabağı və ya əvvəlcədən toxumlanın darmanlanması tövsiyə olunur | -/1-2 | 7(3) |
| 1698 | Fitoverm M KE (Фитоверм М КЭ) | AgroEko MMC (ООО АгроЭко) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Aversectin C | 2 | g/L | 004462 | 17.04.2024 | 17.04.2029 | Rusiya Federasiyası | 4.2 l/ha | Pomidor (istixana) | Yaşıl mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/1-2 | 7(3) |
| 1699 | Kristal KS (Кристалл КС) | Listerra MMC (ООО Листерра) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Epoxiconazole<br>Pyraclostrobin<br>Boscalid | 160<br>100<br>90 | g/L | 004463 | 17.04.2024 | 17.04.2029 | Rusiya Federasiyası | 1-1.5 l/ha | Payızlıq buğda | Unlu şeh<br>Qonur və göyəl pası<br>Yarpaq və sünbüldə septorioz<br>Pirenoforoz<br>Tünd qonur lokalik xəstəlikləri | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/1-2 | 7(3) |
| 1700 | Orbita KE (Орбита КЭ) | Listerra MMC (ООО Листерра) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 004464 | 17.04.2024 | 17.04.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.35 l/ha 1000 l suya | 1) Alma<br>2) Armud | 1)Alma çiçəkyeyəni, alma yaşıl mənənəsi, güvələr<br>2) Armud çiçəkyeyəni, armud mənənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 12-15/2-3 | 7(3) |
| 1701 | Kryoz KS (Крёз КС) | Listerra MMC (ООО Листерра) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Boscalid<br>Kresoxim methyl | 200<br>100 | g/L | 004465 | 17.04.2024 | 17.04.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.5 l/ha 1000 l su | 1) Alma<br>2) Armud | Damgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7/2-4 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | Dospex Kvadra KS (Доспех Квадра КС) | Listerra MMC (ООО Листерра) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | insektisid-funqisid | İmidacloprid<br>Tebuconazole<br>Thiabendazole<br>İmazalil | 300<br>30<br>30<br>20 | g/L | 004467 | 17.04.2024 | 17.04.2029 | Rusiya Federasiyası | 1-1.5 l/t | Payızlıq buğda | 1)Sürmə xəstəlikləri<br>2)Fusarium və helmintosporium kök çürüməsi<br>3)Rizoktoniya kökboğazı çürüməsi<br>4)Septoriya<br>5)Toxumun kiflənməsi<br>6)Qara kif | Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur | -/1-2 | 7(3) |
| 1703 | Dospex 3 KS (Доспех 3 КС) | Listerra MMC (ООО Листерра) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole<br>Thiabendazole<br>İmazalil | 60<br>60<br>40 | g/L | 004468 | 17.04.2024 | 17.04.2029 | Rusiya Federasiyası | 1 l/t | Payızlıq buğda | 1) Sürmə xəstəlikləri<br>2)Fusarium kök çürüməsi<br>3)Toxumun kiflənməsi<br>4)Septoriya<br>5)Unlu şeh(ilkin fazalarda) | Səpinqabağı və ya əvvəlcədən toxumların dərmanlanması tövsiyə olunur | -/1-2 | 7(3) |
| 1704 | King Tornado | Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA | 480 | g/L | 004469 | 19.04.2024 | 19.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1250 ml/100 l suya | Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında | Birillik və çoxillik ot və daryarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1705 | Kingema | Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 004470 | 19.04.2024 | 19.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 40 q/100 l suya | Pomidor (istixana) | Yaşıl mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/1-2 | 7(3) |
| 1706 | Kinglamb | Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda cyhalothrin | 50 | g/L | 004471 | 19.04.2024 | 19.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 120 ml/100 l suya | Bibər (istixana) | Tripslər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1707 | Kingprid | Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004472 | 19.04.2024 | 19.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 50 q/100 l suya | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1708 | Krogen | Shenzhen King Wing Chemical Industry Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | g/L | 004473 | 19.04.2024 | 19.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 200 ml/ha | Kələm | Kələm ağkəpənəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1709 | Acethrin 350 SL | Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid<br>Lambda cyhalothrin | 200<br>150 | g/L | 004474 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 45 ml/ha | Pomidor | Mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1710 | Alfosal 800 WP | Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-aluminium | 800 | g/kg | 004475 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3525 q/ha | Xiyar | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1711 | Gibson 777 WSG | Nanjing Essence Fine-Chemical Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate-ammonium | 777 | g/kg | 004476 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2130 q/ha | Pomidor | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1712 | Lipinski 720 SL | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Ethephon | 720 | g/L | 004478 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 2 l/ha | Pambıq | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1713 | Mayuca 320 SC | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole<br>Azoxystrobin | 200<br>120 | g/L | 004479 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 l suya | Xiyar (istixana) | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1714 | Moretta OD | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | İdosulfuron-methyl-sodium<br>Mesosulfuron-methyl<br>Mefenpyr-diethyl (safaner) | 6<br>30<br>90 | g/L | 004480 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 250 ml/ha | Buğda | Birillik və çoxillik geniş yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1715 | Pesaro 80 WG | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Sulphur | 80 | % | 004481 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 4 kq/ha | Üzüm (istixana) | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/3 | 7(3) |
| 1716 | Vainest 20 SC | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | g/L | 004482 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.15 L/ha | Üzüm (istixana) | Salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 28/3 | 7(3) |
| 1717 | Ferralo 50 WP | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 004483 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 3 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/3 | 7(3) |
| 1718 | Manduel 20 WP | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper | 20 | % | 004484 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 5 kq/ha | Üzüm (istixana) | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/3 | 7(3) |
| 1719 | Carius SC | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid<br>Kresoxim methyl | 200<br>100 | g/L | 004485 | 23.04.2024 | 23.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.3 l/ha | Üzüm (istixana) | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 28/3 | 7(3) |
| 1720 | Entojean 980 Powder | İfoda Agro Kimyo Himoya MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Mepiquat Chloride | 980 | g/kg | 004490 | 24.04.2024 | 24.04.2029 | Özbəkistan Respublikası | 30 q/ha | Pambıq əkinləri | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/3 | 7(3) |
| 1721 | Ento Defol 540 SC | İfoda Agro Kimyo Himoya MMC | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Defoliant | Thidiazuron<br>Diuron | 360<br>180 | g/L | 004491 | 24.04.2024 | 24.04.2029 | Özbəkistan Respublikası | 2 l/ha | Pambıq | Pambıq əkinlərində qozaların erkən açılmasının sürətləndirilməsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 1722 | Roycoss 250 WG | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Flazasulfuron | 25 | % | 004493 | 24.04.2024 | 24.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 20 q/1000 $m^2$ sahəyə | Üzüm | Birillik ikilapalı və birlapalı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50-60/1-2 | 7(3) |
| 1723 | Rox-X | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone<br>İmazamox | 480<br>22.4 | g/L | 004494 | 24.04.2024 | 24.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.5 l/ha | Soya | Dar və geniş yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1724 | Roymulus DF | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid-akarisid | S | 80 | % | 004495 | 24.04.2024 | 24.04.2029 | Türkiyə Respublikası | 400 q/100 l suya | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1725 | Perfect | Tapazol Chemical Works Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Emamectin Benzoate | 19.2 | g/L | 004496 | 26.04.2024 | 26.04.2029 | İsrail Dövləti | 40 ml/1000 $m^2$ | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1726 | CyperStar 25% EC | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 25 | % | 004499 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 200 ml/ha | Kələm (İstixana) | Kələm sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1727 | StarClop 350 g/L SC | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 004500 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1 l/ha | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1728 | AlfoStar 80% WP | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-aluminium | 80 | % | 004501 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.2 kq/1 t suya | Xiyar (istixana) | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1729 | Bistar-58 400 g/L EC | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 40 | % | 004502 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1.7 l/1 t suya | Şaftalı (istixana) | Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 1730 | DeltaStar 25 g/L SC | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 004503 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.5 l/ha | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 14(3) |
| 1731 | StarMectin 5.7 WDG | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5.7 | % | 004504 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.30 kq/1 t suya | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1732 | StarPlan 20 % SP | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004505 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.3 kq/1 t suya | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1733 | GlyphoStar 480 g/L SL | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate IPA | 480 | g/L | 004506 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 10 l/ha | Dəmiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1734 | LambdaStar 50 g/L EC | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 5 | % | 004507 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.5 l/ha | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 14(3) |
| 1735 | StarCaptan 50% WP | Hubei Raystar Biotechnology Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 004508 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.6 kq/1 t suya | Pomidor (istixana) | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1736 | Coragen 20 SC | FMC İnternational Switzland Sarl | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 20 | % | 004509 | 02.05.2024 | 02.05.2029 | Fransa Respublikası | 1) 0.04-0.05 l/ha<br>2) 0.15-0.3 l/ha<br>3) 0.15-0.25 l/ha<br>4) 0.15-0.2 l/ha<br>5) 0.1-0.15 l/ha | 1) Kartof<br>2) Alma, gavalı<br>3) Üzüm<br>4) Pomidor<br>5) Pambıq, qarğıdalı | 1) Kolorado kartof böcəyi<br>2) Meyvəyeyənlər, yarpaqbükənlər<br>3) Salxım yarpaqbükəni<br>4) Pambıq sovkası<br>5) Pambıq sovkası, gövdə kapanayi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1) 14/1<br>2) 21/2<br>3) 21/2<br>4) 21/1<br>5) 7/2 | 7(3) |
| 1737 | Royligo 150 ZC | Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole<br>Lambda-cyhalothrin | 100<br>50 | g/L | 004510 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.4 l/ha | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 14(3) |
| 1738 | Ducale | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bromoxynil octanoate<br>MCPA isooctylester | 200<br>200 | g/L | 004511 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 2.2 l/ha | Buğda | Birillik daryarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1739 | Rozier EC | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pinoxaden<br>Cloquintocet-mexyl (safaner) | 45<br>20 | g/L | 004512 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/1000 $m^2$ | Buğda | Birillik incəyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1740 | Carice 240 EC | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Aletleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafob-propargyl,<br>Cloquintocet-mexyl (Safener) | 240<br>60 | g/L | 004513 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 200 ml/ha | Buğda | Birillik daryarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | Portelet SC | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Atelleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İsopropylamine salt equivalent to Glyphosate Acid Oxyfluorfen | 360<br>30 | g/L | 004514 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/1000 $m^2$ sahəyə | Damiryolu kənarlarında, üzərində və ətrafında | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1742 | Mongue SE | Agromia Kimya Tarim Ürünleri Ve Atelleri İmalat Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2.4-d 2-Ethylhexyl ester+Florasulam | 452.42<br>6.25 | g/L | 004515 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.6 l/ha | Payızlıq buğda | Dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1743 | Durock 240 SC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spiromesifen | 240 | g/L | 004516 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 l suya | Xiyar (istixana) | Hörümçək gənəciyi | Bitkilərin 5-6 yarpaq və meyvələrin formalaşması fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/2 | 7(3) |
| 1744 | Venison 150 EC | Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 150 | g/L | 004517 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 40 ml/100 l suya | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1745 | Betaren Super MD, OEC (Бетарен Супер МД, МКЭ) | Şelkovo Agroxim SC (АО Щелково Агрохим) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Ethofumesate<br>Phenmedipham<br>Desmedipham | 126<br>63<br>21 | g/L | 004521 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Rusiya Federasiyası | 3.6 l/ha 200 l suya | Şəkər çuğunduru | Birillik ikiləpəli və bazi birləpəli alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/3 | 7(3) |
| 1746 | Theja, SC (Тейя, КС) | Şelkovo Agroxim SC (АО Щелково Агрохим) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 480 | g/L | 004522 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.4 l/ha 1000 l su | Armud | 1) Armud ballıcası<br>2) Kaliforniya yastıcası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10/2 | 7(3) |
| 1747 | Biodor | Shangai Agrochine Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 40 | % | 004527 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 60 ml/ha | Kələm | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1748 | Bioabamectin | Shijiazhuang Liger Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Abamectin | 1.8 | % | 004528 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 90 ml/100 l suya | Pomidor (istixana) | Qırmızı hörümçəklər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1749 | Abrade 100 EC | Jadesheen Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha cypermethrin | 100 | g/L | 004529 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 20 ml/100 l suya | Alma | Alma içqurdu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1750 | Biozeb | Shangai Agrochina Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 004530 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.5 kq/1 t su | 1) Gilas<br>2) Alma | 1) Damgil<br>2) Mamalı pas xəstəliyi<br>3) Deşikli ləkəlilik | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/2-3 | 7(3) |
| 1751 | Berlan | Shangai Agrochina Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Giberellic Acid ($GA_3$) | 10 | % | 004531 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 75 ml/100 l su | 1) Gilas<br>2) Albalı | | Vegetasiya müddətində kökdənkənar yemləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | /2 | 7(3) |
| 1752 | Bilan | Shangai Agrochina Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 004533 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.25 q/ha | Kələm | Çuğundur sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1753 | Biocur | Shangai Agrochina Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 250 | g/L | 004534 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 225 q/ha | Alma | Qaraləkə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1754 | Biostar | Shangai Agrochina Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron-methyl | 75 | % | 004535 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 40 q/0.405 ha | Çaltik | Birillik enli və iyna yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1755 | Alfametrin | Shangai Agrochina Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 10 | % | 004536 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 500 ml/ha | Pambıq | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1756 | Biamin | Shangai Agrochina Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2.4-D Dimethyl amine salts | 500 | g/L | 004537 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1800 ml/ha | Qarğıdalı | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1757 | Acuity 25 EC | Jadesheen Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 004538 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 500 ml/ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1758 | Oberon Rapid SC 240 | Bayer AG | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spiromesifen<br>Abamectin | 228.6<br>11.4 | g/L | 004539 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.7 l/ha | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Çiçəklənmədən sonra 15 gün fasilə ilə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1759 | Dicamin SL | Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Dicamba<br>2.4-D Amine Salt | 120<br>344 | g/L | 004543 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.2 l/ha | Buğda | Ambroziya | Bitkinin 2-4 alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 35/1-2 | 7(3) |
| 1760 | Xitinazon 48 SC | Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 480 | g/L | 004544 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 250 ml/ha | Alma | Amerika ağ kəpənəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/2 | 7(3) |
| 1761 | Hektaş Excalibur | AMVAC Netherlands B.V | Niderland Krallığı | Pestisid | Defoliant | Tribufos | 720 | g/L | 004545 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 2 l/ha | Pambıq | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |
| 1762 | Sambo | Ningbo Generic Chemical Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyridaben | 20 | % | 004546 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 50-75 q/100 l suya | Alma | Meyvə gənələri | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/1-2 | 7(3) |
| 1763 | Mavrik 2 F | Adama Makhteshim Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | İnsektisid | Tau-Fluvalinate | 240 | g/L | 004548 | 08.05.2024 | 08.05.2029 | İsrail Dövləti | 20 ml/1000 $m^2$ sahəyə | Pomidor (istixana) | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1764 | Omer | Tapazol Chemical Works Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004551 | 10.05.2024 | 10.05.2029 | İsrail Dövləti | 70 ml/100 l suya | Xiyar (istixana) | Unlu şeh xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 7(3) |
| 1765 | Parsav | Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda cyhalothrin<br>Emamectin Benzoate | 300<br>80 | g/L | 004552 | 10.05.2024 | 10.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 40 ml/ha | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/4 | 7(3) |
| 1766 | Tutarips | Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Etofenprox<br>Pyriproxyfen | 250<br>100 | g/L | 004553 | 10.05.2024 | 10.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 500 ml/ha | Üzüm | Unlu bit | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2 | 10(4) |
| 1767 | Nanodax | Entosav İlaçlama İnş.Tem.ve Hiz.İşl.San.Tic.Ltd.Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Kresoxim-methyl | 300<br>60 | g/L | 004554 | 10.05.2024 | 10.05.2029 | Türkiyə Respublikası | 400 ml/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 35/10-12 | 7(3) |
| 1768 | İmpakt SC 25% (Импакт КС) | Cheminova A/S | Danimarka Dövləti | Pestisid | Fungisid | Flutriafol | 250 | g/L | 004555 | 10.05.2024 | 10.05.2029 | Danimarka Dövləti | 1) 0.1-0.125 l/ha<br>2) 0.5 l/ha<br>3) 01-0.15 l/ha | 1) Üzüm<br>2) Taxıl<br>3) Alma | 1) Oidium<br>2) Pas Unlu şeh<br>3) Damgil | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/4 | 7(3) |
| 1769 | Xronos KS (Хронос КС) | Listerra MMC (ООО Листерра) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyazofamid | 160 | g/L | 004556 | 14.05.2024 | 14.05.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.7 l/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 10(4) |
| 1770 | Manifest VDQ (Манифест ВДГ) | Listerra MMC (ООО Листерра) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb<br>Mefenoxam | 640<br>40 | g/kg | 004557 | 14.05.2024 | 14.05.2029 | Rusiya Federasiyası | 3 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 10(4) |
| 1771 | Bicaptan | Shangai Agrochina Chemical Co Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | g/kg | 004561 | 31.05.2024 | 31.05.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3 kq/1 ton su 1000 l/ha | Alma | 1) Damgil<br>2) Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/2-3 | 7(3) |
| 1772 | Dividend Star 036 FS | Syngenta Crop Protection AG | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyproconazole, Difenoconazole | 6.3<br>30 | g/L | 004562 | 05.06.2024 | 05.06.2029 | İspaniya Krallığı | 0,75-1 l/ha | 1) Arpa<br>2) Buğda | 1) Sürmə xəstəlikləri<br>2) Fuzarioz<br>3) Helmintosporioz<br>4) Qonur pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/ 1-2 | 7(3) |
| 1773 | Karate 5 EC | Syngenta Crop Protection AG | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-Cyhalothrin | 50 | g/L | 004563 | 05.06.2024 | 05.06.2029 | Fransa Respublikası | 1) 0,2-0,3 l/ha<br>2) 0,5 l/ha | 1) Üzüm<br>2) Pambıq | 1) Salxım yarpaq bükəni<br>2) Gənələr<br>3) Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 21(2) | 7(3) |
| 1774 | Kortac 100 EC | Koruma Kior Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | g/L | 004564 | 05.06.2024 | 05.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 1) 0.1-0.15 l/ha<br>2) 0.24-0.36 l/ha | 1) Taxıl<br>2) Üzüm | 1) sümürtgən böcəklər<br>2) yarpaqbükənlər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20(2) | 7(3) |
| 1775 | Actinmor EC | Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 004569 | 05.06.2024 | 05.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 280 ml/ha | Pomidor (istixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3/1-2 | 7(3) |
| 1776 | Mastergold SC | Agrikem Ziraat Ilaçları Endüstri Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper sulfate equivalent to metallic copper | 65.82 | g/L | 004570 | 05.06.2024 | 05.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 150 ml/100 l suya | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Çiçəklənmədən əvvəl və meyvələrin formalaşması mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 10/2 | 7(3) |
| 1777 | Valsalaksil WP | Ningbo Generic Chemical Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb<br>Metalaxyl | 64<br>8 | % | 004577 | 05.06.2024 | 05.06.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.5 kq/ha | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20(2) | 7(3) |
| 1778 | Lepostar 100 EC | Pioneers Chemicals Factory Co | Saudiyyə Ərəbistan Krallığı | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Bifenthrin | 10 | % | 004579 | 06.06.2024 | 06.06.2029 | Saudiyyə Ərəbistan Krallığı | 40 ml/100 l suya | Pomidor (istixana) | Mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20(2) | 7(3) |
| 1779 | Solfoblus EC | Ertar Kimya Tarim Ürünleri Atelleri İmalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | S-Metolachlor<br>Pendimethalin<br>Benoxacor(safaner) | 300<br>200<br>45 | g/L | 004580 | 07.06.2024 | 07.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 5 l/ha | Pambıq | Dar və geniş yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1780 | Bi-58 | Meghmani Organics Limited | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 004582 | 13.06.2024 | 13.06.2029 | Hindistan Respublikası | 150 ml/100 l suya | Şaftalı (istixana) | Vergül şəkilli qabıqlı mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | Asetafac 200 SL | Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 200 | g/L | 004583 | 13.06.2024 | 13.06.2029 | Çin Xalq Respublikası | 55 ml/100 l suya | Kartof | Kolorado kartof böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1-2 | 7(3) |
| 1782 | Thialam 25 % EC | Shenzhen Yufull İndustries Co.Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam<br>Lambda cyhalothrin | 15<br>10 | % | 004584 | 13.06.2024 | 13.06.2029 | Çin Xalq Respublikası | 300 ml/ha | Alma | Yaşıcalar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 26/1-2 | 7(3) |
| 1783 | Oxy Aktiv Oxigen | Bioglobal Zirai Biyolojik Sis.Tar.Dan.Gıda Tanrm San ve Tic.A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Dezinfeksiyaedici (torpaqtanzimlayicisi) | Active $O_2$<br>Ethanoperoxoic Acid | 14<br>4 | % | 004585 | 13.06.2024 | 13.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 l/ha | Pomidor (istixana) | | Ekindan qabaq suvarma suyu ilə torpağa tətbiqi tövsiyə olunur | | |
| 1784 | Elumis 105 OD | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione, Nicosulfuron | 75<br>30 | g/L | 004586 | 20.06.2024 | 20.06.2029 | Fransa Respublikası | 1,25-1,5 l/ha | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik birlapalı və birillik ikilapalı alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -(1) | 7(3) |
| 1785 | Chorus 75 WG | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 750 | g/kg | 004587 | 20.06.2024 | 20.06.2029 | Böyük Britaniya Krallığı | 1) 0,5 l/ha<br>2) 0,35 l/ha | 1) Alma<br>2) Armud<br>3) Ərik<br>4) Şaftalı<br>5) Gilas | 1) Damğıl<br>2) Unlu şeh<br>3) Monoliоz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 1) 28/2<br>2) 15/2 | 7(3) |
| 1786 | Proclaim 05 SG | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 50 | g/kg | 004588 | 20.06.2024 | 20.06.2029 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 0.3-0.4 q/kq | 1) Meyvə<br>2) Tərəvəz | Minalayıcı güvə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 7(3) |
| 1787 | Dynali 90 DC | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole<br>Cyflufenamid | 60<br>30 | g/L | 004589 | 20.06.2024 | 20.06.2029 | Fransa Respublikası | 0.7-0.9 l/ha | Alma | 1) Damğıl<br>2) Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/4 | 7(3) |
| 1788 | Quadris Max 593.5 SC | Syngenta Crop Protection Ag | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Folpet | 93.5<br>500 | g/L | 004591 | 20.06.2024 | 20.06.2029 | Fransa Respublikası | 1.5 -2 l/ha | Üzüm | 1) Mildium<br>2) Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 10(4) |
| 1789 | Promise FS 600 | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 600 | g/L | 004592 | 20.06.2024 | 20.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 700 ml/100 kq toxuma qarışdırılmalı | Qarğıdalı | 1) Mafsil qurdu,<br>2) Danadişi | Preparat su ilə hall olunaraq toxum darmanlanır | -(1) | 7(3) |
| 1790 | Promise WS 70 | Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Imidacloprid | 70 | % | 004593 | 20.06.2024 | 20.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 350 qr/1000 kq toxuma qarışdırılmalı | Kartof | 1) Mafsil qurdu,<br>2) Danadişi<br>3) Kələrəda böcəyi | Preparat su ilə hall olunaraq toxum darmanlanır | -(1) | 7(3) |
| 1791 | Powercop | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux Mixture equivalent to metallic copper | 65.82 | g/L | 004601 | 24.06.2024 | 24.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 500 ml/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/3 | 7(3) |
| 1792 | Fiesta | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 480 | g/L | 004602 | 24.06.2024 | 24.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 800 ml/ha | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 7/2-3 | 7(3) |
| 1793 | Sunabmect 1.8 EC | Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 004604 | 25.06.2024 | 25.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 25 ml/100 L suya | Xiyar (istixana) | Qırmızı hörümçəklər | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1794 | Sunalda 50 EC | Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 004605 | 25.06.2024 | 25.06.2029 | Türkiyə Respublikası | 400 ml/ha | Kartof | Kolorado kartof böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1795 | Embrelia 140 SC | Adama Makhteshim Ltd. | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Izopyrazam<br>Difenoconazole | 100<br>40 | g/L | 004606 | 01.07.2024 | 01.07.2029 | İsrail Dövləti | 1,25-1,5 kq | Alma | 1) Damğıl<br>2) Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14(2) | 7(3) |
| 1796 | Qəhvəyi mərmər bağacığı feromon tələ (Феромонная ловушка для коричнево-мраморного клопа) | FDBT" VNİİKR" ( ФГБУ "ВНИИКР") | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Feromon tələ (Dispenser) | 10,11-epoxy-1-bisabolen-3-ol(C15H26O2), Methyl (E,E,Z)-2-4-6-decatrienoat(C11H16O2) | | | 004610 | 03.07.2024 | 03.07.2029 | Rusiya Federasiyası | 3 ədəd/ha | Zeytun | qəhvəyi mərmər bağacığı | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 15/3 | 3(3) |
| 1797 | Flarmoni 240 SC | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Bifenazate | 240 | g/L | 004611 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 600 ml/ha | Pomidor | İkinöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1798 | Betachem Progress OF | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Ethofumesate<br>Phenmedipham<br>Desmedipham | 112<br>91<br>71 | g/L | 004612 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 3.5 l/ha | Şəkər çuğunduru | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1799 | Topzate Extra | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper oxychloride equivalent to metallic copper<br>Cymoxanil | 39.75<br>4.2 | % | 004613 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 2 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2 | 10(4) |
| 1800 | Tekvando Capsül | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 004614 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.55 l/ha | Pomidor(istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1801 | Azote 320 SC | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole<br>Azoxystrobin | 200<br>120 | g/L | 004615 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.5 l/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/3 | 10(3) |
| 1802 | Gold Gibb | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Giberellic Acid ($GA_3$) | 20 | g/L | 004616 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 500 ml/1000 lt su | Üzüm | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 10-15/4 | 7(3) |
| 1803 | Koctel 2000 DF | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper hydroxide equivalent to metallic copper | 35 | % | 004617 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 2 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/2-3 | 7(3) |
| 1804 | Safa Trax | Safa Tanrm A.Ş. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Flutriafol | 296<br>218 | g/L | 004618 | 05.07.2024 | 05.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 500 ml/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2-3 | 7(3) |
| 1805 | FruitFog -CİPC | Productos Citrosol S.A | İspaniya Krallığı | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Chlorpropham | 25 | % | 004622 | 08.07.2024 | 08.07.2029 | İspaniya Krallığı | 600 qramlıq qutu 10 t kartofa | Kartof məhsulu (Anbar şəraitində saxlanılan) | | Anbar şəraitində fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.Anbar şəraitində saxlanılan kartof məhsulunda yumrularda gözcüklərin cücərməsinə qarşı | 30/1-2 | 7(3) |
| 1806 | FruitFog -P | Productos Citrosol S.A | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid-dezinfeksiyaedici | Orthophenylphenol | 25 | % | 004623 | 08.07.2024 | 08.07.2029 | İspaniya Krallığı | 600 qramlıq qutu 10000 $m^2$-ə | 1) Alma<br>2) Armud<br>3) Giləz və s.meyvələri (soyuducu kamera) | Meyvələrdə çürümə xəstəliklərin yaranmasına səbəb olan göbələklər | Soyuducuların boş kameralarında fumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 1807 | FruitFog -Pyr | Productos Citrosol S.A | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 25 | % | 004624 | 08.07.2024 | 08.07.2029 | İspaniya Krallığı | 600 qramlıq qutu 20 t meyvəyə | Alma Armud meyvələri (anbar şəraitində) | Mavi çürümə və boz çürümə xəstəlikləri | Anbar şəraitində saxlanılan alma armud meyvələrindəfumiqasiya üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/1-2 | 7(3) |
| 1808 | Kilex Bordeaux WP | "Safa Tanrm A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordomix equivalent to 20% metallic copper | 74 | % | 004630 | 09.07.2024 | 09.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 1500 qr/100 lt suya | Alma | Damğıl | Yaşıl konus dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/1-2 | 7(3) |
| 1809 | Galaxy 240 EC | "Safa Tanrm A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 004631 | 09.07.2024 | 09.07.2029 | Türkiyə Respublikası | 1) 0.75 l/ha<br>2) 1 l/ha | 1) Soğan<br>2) Günəbaxan | Birlapalı və ikilapalı alaq otları | 1) Soğanın 2-3 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.<br>2) Səpindən bir həftə sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 26/1-2 | 7(3) |
| 1810 | Torpade 480 SL | "Jadesheen Chemical Co.,Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İsopropylamine salt | 480 | g/L | 004632 | 09.07.2024 | 09.07.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3 l/ha | Alma | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/1-2 | 7(3) |
| 1811 | Ortega 350 SC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 004636 | 12.07.2024 | 12.07.2029 | Azərbaycan Respublikası | 20 ml/100 lt suya | Alma | Alma yaşıl mənənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 24/2 | 7(3) |
| 1812 | Rhapsody 50 SL | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyicisi | Mepiquat Chloride | 50 | g/L | 004637 | 12.07.2024 | 12.07.2029 | Azərbaycan Respublikası | 120 ml/1000 $m^2$ | Pambıq | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/3 | 7(3) |
| 1813 | Elision 48 SL | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İsopropylamine Salt | 480 | g/L | 004638 | 12.07.2024 | 12.07.2029 | Azərbaycan Respublikası | 3 kq/ha | Alma bağları | Birillik və çoxillik alaq otları | 3-6 yarpaq fazasında alaq otları üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 1814 | İbanez 250 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 004639 | 12.07.2024 | 12.07.2029 | Azərbaycan Respublikası | 25 ml/100 lt suya | Alma, Armud | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/2 | 7(3) |
| 1815 | Masterson 40 SL | "Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri Iml.Paz.San.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | İmazamox | 40 | g/L | 004651 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.25 l/ha | Yonca | Sarı sarmaşıq | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 1816 | Samsara 40 OD | "Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri Iml.Paz.San.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | g/L | 004652 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.25 l/ha | Qarğıdalı | Dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1 | 7(3) |
| 1817 | Tondela SC | "Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri Iml.Paz.San.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl | 310 | g/L | 004653 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 60 ml/ha | Buğda | Pas xəstəliyi | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 25/1-2 | 7(3) |
| 1818 | Zweig | "Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri Iml.Paz.San.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Terbuthylazine<br>Pendimethalin | 270<br>64 | g/L | 004654 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 3 l/ha | Qarğıdalı | Dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1819 | Topeno 500 SC | "Agromia Kimya Tarım Ürünleri ve Aletleri Iml.Paz.San.Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 500 | g/L | 004655 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 175 ml 100 l suya | Şaftalı | Yarpaq qıvrılması | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15-20/2 | 7(3) |
| 1820 | Escape 20 SP | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait. İml. Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004656 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 30 q 100 l suya | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1-2 | 7(3) |
| 1821 | Catania 50 WG | "Ertar Kimya Tarim Ürünleri Aletleri Imalat Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pirimicarb | 50 | % | 004657 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 55 qr 100 lt suya | Pomidor (istixana) | Mənənə | Hər yarpaqda orta hesabla 2-4 mənənə müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur | 30/1-2 | 7(3) |
| 1822 | Şansügen, SE (Шансюген, ВЕ) | "Şans Enterpryz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-P-ethyl<br>Antidote-Cloquintocet-Mexyl | 69<br>34.5 | g/L | 004658 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.9 l/ha | buğda, arpa, çovdar, qarğıdalı | Birillik və bazi çoxillik ikilapalı alaqlar | Mədəni bitkinin 2-4 yarpaq, alaqların 4-6 sm olduğu fazada mübarizənin apanlması daha səmərəlidir | 35/1-2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | Şansil, EC (Шанскил, КЭ) | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 250 | g/L | 004659 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 0.75-1.0 l/ha 2) 1.5 l/ha | 1) Payızlıq buğda 2) Qarğıdalı | 1) Pirenoforoz, qonur pas, sarı pas,septarioz 2) Pas | Vegetasiya dövründə bayraq yarpağın əmələ gəlməsi mərhələsində və ya sünbüllənmənin başlanğıcında işçi məhlul sərfiyyatı 300 l/ha | 30/1-2 | 7(3) |
| 1824 | Qaloşans, EC (Галошанс, КЭ) | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Haloxyfop-p-Methyl | 104 | g/L | 004660 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 0.5 l/ha 2) 1 l/ha | 1) Şəkər çuğunduru 2) Günəbaxan | 1) Birillik taxıl fasiləsi alaqları (setariya növləri, toyuq darısı) 2) Çoxillik taxıl fasiləsi alaqları (sürünən ayrıq) | Alaq otlarının: Aktiv böyüməmə dövründə (2-6 yarpaq mərhələsindən kollanmanın əvvəlinə qədər) çiləmə. Sürünən ayrığın 10-15 sm hündürlüyü zamanı çiləmə. İşçi məhlul sərfiyyatı 200-300 l/ha | 60/1-2 | 7(3) |
| 1825 | Agroşans, WSC (Агрошанс ВК) | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | MCPA | 500 | g/L | 004661 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 1.5 l/ha 2) 0.8 l/ha 3) 1.2 l/ha | 1) Buğda, arpa, çovdar 2) Noxud 3)Kartof | Birillik ikiləpəli alaq otları | 1) Yazda taxılların boruya çıxma mərhələsinə qədər akinların çilənməsi 2) Bitkilərin 3-5 əsl yarpaq mərhələsində çilənməsi | -/1 | 7(3) |
| 1826 | Skoroşans,EC (Скоропшанс, КЭ) | "Şans Enterprayz" MMC ( ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 004662 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 0.25 l/ha 2) 0.4 l/ha 3) 0.2 l/ha 4) 0.3-0.35 l/ha | 1) Alma, armud 2) Kastof, pomidor 3) Şaftalı, arık, albalı, gilas 4) Nar | 1) Damgil, unlu şeh 2) Alternarioz 3) Monilioz, klasterosporioz 4) Fomoz | Vegetasiya müddətində xəstəliyin əlamətləri müşahidə edildikdə mübarizənin aparılması məqsədə uyğundur | 12/3 | 7(3) |
| 1827 | Trivap 75% WP | "Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd." | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Cyromazine | 75 | % | 004663 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | İordaniya Krallığı | 35 q /20 l suya | Pomidor | Manənələr | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1828 | Vacomil-Extra 44% SC | "Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl-M Chlorothalonil | 4 40 | % | 004664 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | İordaniya Krallığı | 250 ml/100 l suya (500 l/ha işçi məhlul) | Kartof | Fitoftora | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1829 | Proporid-72.2% SL | "Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Propamocarb hydrochloride | 72.2 | % | 004665 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | İordaniya Krallığı | 60 ml/ 20 l suya | Kartof | Fitoftora | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1830 | Valete-80% WP | "Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Fosetyl aluminium | 80 | % | 004666 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | İordaniya Krallığı | 40 q/ 20 l suya | Pomidor | Fuzarium | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1831 | Chloronil-75% WP | "Vapco Veterinary Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Chlorothalonil | 75 | % | 004667 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | İordaniya Krallığı | 40 q/ 20 l suya | Kartof | Fitoftora | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 1832 | İnbox SE | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Flonicamid Pyriproxyfen | 75 75 | g/L | 004668 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/ 100 l suya | Pomidor (istixana) | Şaftalı manənəsi | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 22-25/1-2 | 7(3) |
| 1833 | Venmectin SC | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarasid | Spirotetramat Abamectin | 240 40 | g/L | 004669 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 35 ml/ 100 l suya | Pomidor (istixana) | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 14/1-2 | 7(3) |
| 1834 | Remcor WDG | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole Emamectin Benzoate | 7 3 | % | 004670 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 250 q/ha | Pambıq əkinləri | Pambıq sovkası | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1835 | Sparrow SC | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | g/L | 004671 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.25 l/ha | Qarğıdalı | Dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1836 | Royal süper 69 EW | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-P-ethyl Cloquintocet-mexyl (Safener) | 69 34.5 | g/L | 004672 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha | Buğda | Birillik dar yarpaqlı alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1837 | Zeta of 120 | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl (Safener) | 30 90 | g/L | 004673 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.4 l/ha | Payızlıq buğda | Dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 50/1-2 | 7(3) |
| 1838 | Royal Ultra | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Defoliant | Thidiazuron Diuron | 120 60 | g/L | 004674 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.6 l/ha | Pambıq | – | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1839 | Roypilon 100 SL | "Royal-Fen Kimya Tarim İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 100 | g/L | 004675 | 06.08.2024 | 06.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.5 l/ha | Soğan | Alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 60/1-2 | 7(3) |
| 1840 | Koruma Faltan 50 WP | "Koruma Klor Alkali San. Ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Folpet | 50 | % | 004676 | 07.08.2024 | 07.08.2029 | Türkiyə Respublikası | 2.0 kq | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/4 | 7(3) |
| 1841 | Atlantis WG 12.6 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Iodosulfuron-methyl-sodium Mesosulfuron-methyl Mefenpyr-diethyl | 6 30 90 | g/kg | 004677 | 07.08.2024 | 07.08.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.3 kq/ha | Buğda | Birillik ikiləpəli alaqlar | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | -/1 | 7(3) |
| 1842 | Benzonat Super | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 10 | % | 004682 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 45 q/ha | Kələm | Almaz güvə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1843 | General | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 004683 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 900 q/ha | Pomidor | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1844 | İmido | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 35 | % | 004684 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 75 ml/ha | Kələm | Almaz güvə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 21/2 | 7(3) |
| 1845 | Mimrod | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Bupirimate | 25 | % | 004685 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1200 ml/ha | Xiyar | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1846 | Srobi | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-Methyl | 50 | % | 004686 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 350 q/ha | Xiyar | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1847 | Abama | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Abamectin | 18 | g/L | 004687 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1200 ml/ha | Xiyar (istixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20/2 | 7(3) |
| 1848 | Akdara | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 25 | % | 004688 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 225 q/ha | Kartof | Manənə | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1849 | Acetam | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004689 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 112.5 q/ha | Xiyar (istixana) | Manənə | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1850 | Bestceler | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | g/L | 004690 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 150 ml/ha | Xiyar (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1851 | Difluben | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Diflubenzuron | 480 | g/L | 004691 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3200 ml/ha | Nar | Nar odlucası | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/2 | 7(3) |
| 1852 | Citrin | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 004692 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 225 ml/ha | Kələm | Kələm ağkəpənəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1853 | Difen | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 004693 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2500 ml/ha | Çiyələk (istixana) | Antraknoz xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 22-25/2 | 7(3) |
| 1854 | Delcis | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 004694 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 750 mL/ha | Kələm (İstixana) | Kələm manənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/1-2 | 7(3) |
| 1855 | Effecto | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl | 70 | % | 004695 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1.5 kq/ha | Buğda | Septarioz xəstəliyi | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/1-2 | 7(3) |
| 1856 | Golden Malation | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | g/L | 004696 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1650 ml/ha | Bibər (istixana) | Trips | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 14/2 | 7(3) |
| 1857 | Lamtam | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 90 | % | 004697 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 300 q/ha | Pambıq əkinləri | Pambıq sovkası | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1858 | Lamba | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarasid | Lambda-cyhalothrin | 5 | % | 004698 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 450 ml/ha | Pambıq əkinləri | Pambıq sovkası | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 18-20/1-2 | 7(3) |
| 1859 | Rodiont | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | g/L | 004699 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 75 ml/ha | Qarğıdalı əkinləri | Pambıq sovkası | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-22/2 | 7(3) |
| 1860 | Qolax | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 004700 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 300 q/ha | Çaltik | Birillik alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1861 | Qliff | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate | 757 | g/kg | 004701 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3 kq/ha | Limon | Alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/2 | 7(3) |
| 1862 | Seletoil | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Petroleum oil (Cas № 101316-46-5) | 950 | g/L | 004702 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 200 ml/ha | Alma | Akasiya yalançı qalxanlı yastıcası | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 20-25/1-2 | 7(3) |
| 1863 | Mankozeb | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 004703 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3750 q/100 l suya | Xiyar (istixana) | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 22-25/2 | 7(3) |
| 1864 | Rodonet | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl Mancozeb | 8 64 | % | 004704 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.4 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15/3-4 | 10(3) |
| 1865 | Septan | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 004705 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 28/3 | 10(3) |
| 1866 | Alled | "Seletex LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl aluminium | 80 | % | 004706 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | Çin Xalq Respublikası | 600 q/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 15-20/3 | 10(3) |
| 1867 | Talisman | "Galenika-Fitofarmacija a.d." | Serbiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | g/L | 004707 | 09.08.2024 | 09.08.2029 | Serbiya Respublikası | 1 l/ha | Qarğıdalı | Dar və enliyarpaq alaq otları | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 50/1-2 | 7(3) |
| 1868 | Duplex Pro | "Galenika-Fitofarmacija a.d." | Serbiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prothioconazole Azoxystrobin | 150 250 | g/L | 004710 | 09.08.2024 | 09.08.2029 | Serbiya Respublikası | 800 ml/ha | Buğda | Pas xəstəliyi | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur | 25/1-2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1869 | Fufanon EC | "Cheminova A/S " | Danimarka Dövləti | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 570 | g/L | 004718 | 12.09.2024 | 12.09.2029 | Danimarka Dövləti | 1 l/ha | 1) Üzüm 2) Alma | 1) Gənə<br>2) Mənənə<br>3) Yarpaqbükən<br>4) Yastıca | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə<br>tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 10 (4) |
| 1870 | Danadim Expert EC | "Cheminova A/S" | Danimarka Dövləti | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 004719 | 12.09.2024 | 12.09.2029 | Danimarka Dövləti | 1) 1.1-1.9 l/ha 2) 1.1-2.8 l/ha | 1) Alma 2) Üzüm | 1) Gənə, Mənənə, Yarpaqbükən<br>2) Gənə, salxım və | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə<br>tətbiqi tövsiyə olunur. | 40/2<br>20/2 | 10(4) |
| 1871 | Avexus | "Agri Sciences Tarım və İlaç Ürünleri San. ve Tic.Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Ethoxumesate<br>Phenmedipham<br>Desmedipham | 112<br>91<br>71 | g/L | 004720 | 12.09.2024 | 12.09.2029 | Türkiyə Respublikası | 750 ml/ha | Şəkər çuğunduru | Yabanı xardal, sirkan,<br>tülkü quyruğu | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə<br>tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1872 | Eurosmart 80 WG | "Adama Makhteshim Ltd" | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-Al | 80 | % | 004730 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | İtaliya Respublikası | 250 qr/100 l suya | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiçəkləmədən<br>əvvəl və meyvə formalaşdıqdan<br>sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15-20/2 | 7(3) |
| 1873 | Galigan 240 EC | "Adama Agan Ltd" | İsrail Dövləti | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 004731 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | İsrail Dövləti | 80 ml/1000 $m^2$ | Soğan | Alaq otlarına qarşı | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 1/- | 7(3) |
| 1874 | Feinzin | "Adama Agan Ltd" | İsrail Dövləti | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 004733 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | İsrail Dövləti | 0.6 kq/ha | Soya | Alaq otları | Vegetasiya müddətində<br>tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1875 | Legato Lenns | "Adama Agan Ltd" | İsrail Dövləti | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA salt<br>Diflufenican | 250<br>40 | g/L | 004734 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | İsrail Dövləti | 3 l/ha | Alma bağları | Alaq otlarına qarşı | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/2 | 7(3) |
| 1876 | Nimitz | "Adama Makhteshim Ltd" | İsrail Dövləti | Pestisid | Nematosid | Fluensulfone | 480 | g/L | 004736 | 13.09.2024 | 13.09.2029 | İsrail Dövləti | 8.5 l | Pomidor | Fir nematodu | Şitilər əkilməmişdən əvvəl<br>dərmanlanma aparmaq tövsiyə olunur. | 1/- | 7(3) |
| 1877 | Horis | "Seletex Limited." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 750 | g/kg | 004737 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | Çin Xalq Respublikası | 800 q/ha | Üzüm | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/3 | 10(3) |
| 1878 | Quadres | "Seletex Limited." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | g/L | 004738 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2 l/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/3 | 10(3) |
| 1879 | Tebekor | "Seletex Limited." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 25 | % | 004739 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.5 l/ha | Üzüm | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25-30/3 | 10(3) |
| 1880 | Topez | "Seletex Limited." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004740 | 16.09.2024 | 16.09.2029 | Çin Xalq Respublikası | 400 ml/ha | Üzüm | Oidium | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/4 | 7(3) |
| 1881 | Cyperain | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | g/L | 004741 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.20 l/ha | Buğda | Adi taxıl sovkası və<br>digər zərərvericilər | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/1-2 | 7(3) |
| 1882 | Lasting | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 004742 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.3 l/ha | Qarğıdalı | Sovkalar | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/1-2 | 7(3) |
| 1883 | Gensil FS 060 | "Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 60 | g/L | 004754 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Türkiyə Respublikası | Bir ton toxuma – 0.5 l | Buğda | Sürmə xəstəlikləri | Sapınqabağı toxumların<br>dərmanlanması üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1884 | İsador | "Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prothioconazole<br>Tebuconazole | 150<br>20 | g/L | 004756 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 kq toxum | Payızlıq buğda | Sürmə xəstəlikləri<br>(bərk, toz, daş sürmə),<br>fusarium kök çürüməsi,<br>toxumun kiflənməsi,<br>septoriya, unlu şeh<br>(ilkin fazalarda) xəstəlikləri | Sapınqabağı və əvəlcədən<br>toxumların dərmanlanması<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1885 | Chuck | "Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Triticonazole<br>Pyraclostrobin | 80<br>40 | g/L | 004757 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 kq | Payızlıq buğda | Sürmə xəstəlikləri,<br>fusarium kök çürüməsi,<br>toxumun kiflənməsi, septoriya,<br>unlu şeh xəstəlikləri | Sapınqabağı və ya əvəlcədən<br>toxumların dərmanlanması<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1886 | Albert 75 WG | "Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pyroxsulam<br>Cloquintocet-mexyl (safener) | 7.5<br>7.5 | % | 004758 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.25 kq/ha | Buğda | Dar və<br>enliyarpaqlı alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə<br>olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 1887 | Rockit 400 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 400 | g/L | 004762 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Azərbaycan<br>Respublikası | 150 ml/100 l suya | Alma | Mənənə, yastıca | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə<br>olunur. | 30/2 | 10(4) |
| 1888 | Capitano 5 WP | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 004763 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Azərbaycan<br>Respublikası | 320 q/100 l suya | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə<br>olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1889 | Raptor 18 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 004764 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Azərbaycan<br>Respublikası | 30 ml/ha | Pomidor | Hörümçək gənəsi | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 28/2 | 7(3) |
| 1890 | Trifconazole 100 EC | "Modern İnsecticides Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004765 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Hindistan Respublikası | 500 ml/ha 1000 l suya | Alma | Unlu şeh xəstəliyinə | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1891 | Flurofen 240 EC | "Modern İnsecticides Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 004767 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Hindistan Respublikası | 2.5 l/ha 400 l suya | Armud bağı sahəsində | Dar və enli<br>yarpaqlı alaq otlarına<br>qarşı | Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə<br>yarpaqdan çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 21/3 |
| 1892 | Condra 350 SC | "Modern İnsecticides Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 004768 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Hindistan Respublikası | 350-400 ml/ha 1000 l suya | Alma | Alma yaşıl mənənəsi,<br>alma ballıcası | Alaq otlarının aktiv inkişaf dövründə<br>yarpaqdan çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 7(3) |
| 1893 | Kalamit 75 DF | "Modern İnsecticides Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron methyl | 75 | % | 004769 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Hindistan Respublikası | 12 qr/ha | Buğda | Alaq otlarına | Alaq otunun 4-6 sm olan və<br>bitkinin 2-4 yarpaq inkişaf<br>fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1894 | Abamectin 18 EC | "Modern İnsecticides Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid+akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 004770 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Hindistan Respublikası | 250 ml/ha 1000 l suya | Alma | Avropa qırmızı<br>hörümçəyi | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 7(3) |
| 1895 | Supervin Plus 90 SP | "Modern İnsecticides Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methomyl | 90 | % | 004771 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Hindistan Respublikası | 800 qr/ha 1000 l suya | Alma | Alma meyvəyeyəni,<br>yarpaq bükən | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1896 | Proben 5 SG | "Modern İnsecticides Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 5 | % | 004773 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Hindistan Respublikası | 400 qr/ha 1000 l suya | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1897 | Bluesky 150 SC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 150 | g/L | 004774 | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Azərbaycan Respublikası | 35 ml/100 l suya | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/2 | 7(3) |
| 1898 | Archer 20 WP | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Akarisid | Pyridaben | 20 | % | 004776 | 30.09.2024 | 30.09.2029 | Azərbaycan Respublikası | 50-75 q/100 l suya | Gilas, Alça | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə<br>olunur. | 30/2 | 7(3) |
| 1899 | Roscana | "Agrobest Grup Tar.İ.Toh. İml.İth.İhr.San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyraclostrobin<br>Epoxiconazole | 85<br>62.5 | g/L | 004777 | 03.10.2024 | 03.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 2 l/ha | Buğda | Xəstəliklər<br>(Unlu şeh, Septorioz,<br>Qonur pas) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 42/1-2 | 7(3) |
| 1900 | Oberon SC 240 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Spiromesifen | 240 | g/L | 004779 | 04.10.2024 | 04.10.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.5 l/ha | Tərəvəz | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 7(3) |
| 1901 | Sencor SC 600 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 600 | g/L | 004780 | 04.10.2024 | 04.10.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.75 l/ha | 1) Kartof 2) Pomidor | Birillik birlapalı və ikilapalı alaqlar | 1) Madəni bitkinin cücşları əmələ gələnə qədər tətbiqi<br>tövsiyə olunur.<br>2) Madəni bitkinin 2-4 yarpaq mərhələsində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1902 | Movento SC 100 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat | 100 | g/L | 004781 | 04.10.2024 | 04.10.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.1 l/ha | Meyvə ağacları | Ballıca, Yastıcalar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/2 | 7(3) |
| 1903 | Ribasso 4 OD | "Koruma Klor Alkali San.ve Tic.A.Ş", | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | g/L | 004782 | 04.10.2024 | 04.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 1-1.5 l | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik taxıl fəsilasi alaqları | Bitkinin 4-6 yarpaq mərhələsində<br>tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1904 | İnfinito SC 687.5 | "Bayer AG" | Fransa Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fluopicolide<br>Propamocarb hydrochloride | 62.5<br>625 | g/L | 004783 | 04.10.2024 | 04.10.2029 | Fransa Respublikası | 1.2-1.6 l/ha | Kartof | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 7/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Skaut | "Qalenika-Fitofarmaciya s.c." | Serbiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione | 480 | g/L | 004784 | 04.10.2024 | 04.10.2029 | Serbiya Respublikası | 0.25 l/ha | Qarğıdalı | Dar və enliyarpaqlı alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 50/1-2 | 7(3) |
| 1906 | Aforoz 40 SL | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | İmazamox | 40 | g/L | 004785 | 07.10.2024 | 07.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.28 ml/ha 400 l suya | Soya | Alaq otlarına qarşı | Alaq otunun 8-10 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1907 | Function | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE)<br>Florasulam | 452.42<br>6.25 | g/L | 004786 | 07.10.2024 | 07.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.8 l/ha 400 l suya | Qarğıdalı | Alaq otlarına qarşı | Alaq otunun 4-6 yarpaq fazasında yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1908 | Kastoria SC | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl<br>Epoxiconazole | 310<br>187 | g/L | 004787 | 07.10.2024 | 07.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.2 l/ha 400 l suya | Buğda | Unlu şeh xəstəliyi | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1909 | Redrum 10 SC | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 004788 | 07.10.2024 | 07.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 360 ml/ha 1000 l suya | Pomidor | Avropa qırmızı hörümçəyi | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1910 | Sunstep | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | g/L | 004789 | 07.10.2024 | 07.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.27 l/ha 400 l suya | Qarğıdalı | Alaq otlarına qarşı | Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1911 | Sunamin 500 SL | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Alt.İml.Paz.San.ve Tic.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Dimethyl amine salt equivalent to 2,4-D acid | 500 | g/L | 004790 | 07.10.2024 | 07.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 2.2 l/ha 400 l suya | Qarğıdalı | Alaq otlarına qarşı | Alaq otları 4-6 yarpaq olan fazada yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1912 | Concid 5 EC | "Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 004791 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 l suya | Pomidor | İki nöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1913 | Proyza 72 SL | "Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propamocarb-HCl | 722 | g/L | 004792 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 250 ml/100 l suya | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1914 | Novamite | "Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 004793 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 35 ml/100 l suya | Pomidor | İki nöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1915 | Tulbert 240 SC | "Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 240 | g/L | 004794 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 1000 ml/ha | Pomidor | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1916 | Novirad 100 EC | "Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 004795 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 l suya | Pomidor | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1917 | Lacerta Maxx | "Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Difenoconazole | 200<br>125 | g/L | 004796 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 l suya | Xiyar | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1918 | Chamer 240 SC | "Astranova Tarım Tic. ve San.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Bifenazate | 240 | g/L | 004797 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 600 ml/ha | Pomidor | İkinöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1919 | Laseron 480 SC | "Evergreen Agrochemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 480 | g/L | 004798 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 200 ml/ha | Bibər (istixana) | Trips | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/2 | 7(3) |
| 1920 | Fundazol Plus | "Evergreen Agrochemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate methyl | 70 | % | 004799 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 5 kq/ha | Pomidor (istixana) | Kök çürüməsi xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 10(4) |
| 1921 | Yupiter | "Evergreen Agrochemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 004800 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 50 ml/100 l suya | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 1922 | Kastor 240 SC | "Evergreen Agrochemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Akarisid | Bifenazate | 240 | g/L | 004803 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 60 ml/100 l suya | Xiyar (istixana) | Tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1923 | Griver 50 WG | "Evergreen Agrochemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Flonicamid | 50 | % | 004804 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 15 q/100 l suya | Pomidor (istixana) | Manənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 22/1-2 | 7(3) |
| 1924 | Stroberon 50 WG | "Evergreen Agrochemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Kresoxim-Methyl | 50 | % | 004805 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 15 q/100 l suya | Alma | Damğıl xəstəliyi | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 10(4) |
| 1925 | Abamectin 18 EC | "Evergreen Agrochemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 004806 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 75 ml/100 l suya | Üzüm | Bağ hörümçək gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 22/2 | 10(4) |
| 1926 | Daria 20 WP | "Evergreen Agrochemical Co.,Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Tebufenpyrad | 20 | % | 004807 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 37.5 q/100 l suya | Alma | Qırmızı meyvə gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 22/2 | 7(3) |
| 1927 | Feniks, EC (Феникс, КЭ) | "Şirə Enterpryz" MMC<br>(ООО Ширэс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl<br>Cloquintocet-mexyl (safener) | 80<br>20 | g/L | 004809 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0,3 l/ha | Buğda | Yabanı vələmir və digər birləpəli<br>alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/1-2 | 7(3) |
| 1928 | Akbash 48 SL | "Feras Kimya Zirai Ilaç Tarım Hay.Nak.San.İç ve Diş Tic.Ltd.Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate IPA salt | 480 | g/L | 004810 | 08.10.2024 | 08.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 3 l/ha | Üzüm | Birillik ikilləpəli və birləpəli,<br>enliyarpaq alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/1-2 | 7(3) |
| 1929 | Bikvadrit | "Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Chlorothalonil | 60<br>500 | g/L | 004811 | 14.10.2024 | 14.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1800 ml/ha | Xiyar (İstixana) | Antraknoz xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 22-25 /2 | 7(3) |
| 1930 | Bireikon | "Shanghai MÖ Chemical Co.,Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Cyproconazole | 200<br>80 | g/L | 004813 | 14.10.2024 | 14.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 800 ml/ha | Buğda | Pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/1-2 | 7(3) |
| 1931 | Bioberon | "Shanghai MÖ Chemical Co.,Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Spiromesifen | 240 | g/L | 004814 | 14.10.2024 | 14.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 60 ml/100 l suya | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/1-2 | 7(3) |
| 1932 | Bitrpo | "Shanghai E-Tong Chemical Co.,Ltd.", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Prothioconazole | 200<br>150 | g/L | 004815 | 14.10.2024 | 14.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 750 ml/ha | Buğda | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/1-2 | 7(3) |
| 1933 | Sunacet 20 SP | "Jadesheen Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004816 | 14.10.2024 | 14.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 30 q/100 l suya | Pomidor | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1934 | Galloper 3 SC | "Jadesheen Chemical Co.,Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lufenuron<br>Emamectin benzoate | 20<br>10 | g/L | 004817 | 14.10.2024 | 14.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 40 ml/100 l suya | Xiyar | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1935 | Sulgran 80 WG | "SML Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid-Akarisid | Sulphur | 80 | % | 004818 | 14.10.2024 | 14.10.2029 | Hindistan Respublikası | 400 q/100 ml suya | Xiyar (istixana) | Unlu şeh xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/2 | 7(3) |
| 1936 | Bisuperstar | "Shijiazhuang Liger Chemical Co.,Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Difenoconazole | 200<br>125 | g/L | 004819 | 14.10.2024 | 14.10.2029 | Çin Xalq Respublikası | 750 ml/ha | Çəltik | Pirikulyarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/1-2 | 7(3) |
| 1937 | Mastertan | "Tan Tarım Ziraat İlaçları San.ve Tic. A.Ş .", | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux Mixture Equivalent to metallic copper | 65.82 | g/L | 004826 | 22.10.2024 | 22.10.2029 | Türkiyə Respublikası | 150 ml/ha | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1938 | Top Krop | «Ifoda Agro Kimyo Himoya» | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole<br>Tebuconazole | 200<br>200 | g/L | 004827 | 22.10.2024 | 22.10.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.25-0.3 l/ha | Buğda | Qonur və sarı pas,septorioz xəstəlikləri | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 1939 | Sim M-45 | "Pileryum Tarım ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 004828 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 2.5 kq/1000 l suya | Alma | Damğıl, Mamalı pas | Çiçəklənmədən sonra meyvələrin formalaşdığı və meyvələrin rəng almağa başladığı<br>vaxt yarpaqlara çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 7(3) |
| 1940 | Flo-Captan 50 WP | "Adama Makhteshim Ltd" | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 004837 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | İsrail Dövləti | 225 q/100 l su | Pomidor | Unlu şeh xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/2 | 7(3) |
| 1941 | Alverde 240 SC | "Basf SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Metaflumizone | 240 | g/L | 004838 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Fransa Respublikası | 110 ml/1000 $m^2$ | Pomidor | Pambıq sovkası | Zərərvericinin miqdarı iqtisadi-ziyanlı hədd səviyyəsində olduqda meyvə formalaşması dövründə<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1942 | Bellis WG | "Basf SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid<br>Piraclostrobin | 25.2<br>12.8 | % | 004839 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | İtaliya Respublikası | 1 kq | Meyvə | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 7(3) |
| 1943 | Focus Ultra | "Basf SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Cycloxydim | 100 | g/L | 004840 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 4,2 l/ha | Pomidor | Alaq otlarına qarşı | vegetasiya müddətində alaq otunun 6-8 sm olan mərhələsində 2-4 yarpaq fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1944 | Opera Max | "Basf SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyraclostrobin<br>Epoxiconazole | 85<br>62.5 | g/L | 004841 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | İspaniya Krallığı | 2.2 l | Buğda | Unlu şeh xəstəliyi | Vegetasiya müddətində xəstəliyin ilk əlamətləri müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1945 | Pix | "Basf SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | Mepiquat Chloride | 50 | g/L | 004842 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 120 ml/1000 $m^2$ | Pambıq | | Qönçələmə fazasında, bitkilərin 30-35%-nin boy və inkişafının tənzimlənməsi zəruriyyəti yarandıqda tətbiqi tövsiyə olunur. | -/3 | 7(3) |
| 1946 | Signum WG | "Basf SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid<br>Pyraclostrobin | 267<br>67 | g/kg | 004843 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 1.5 kq | Ərik | Klyasterosporioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 7(3) |
| 1947 | Stomp Aqua | "Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch " | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 455 | g/L | 004844 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Fransa Respublikası | 320 ml/1000 $m^2$ | Soğan | Alaq otlarına qarşı | Bitkinin 2-3, alaq otunun 3-5 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1948 | Sercadis Plus | "Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Freienbach Branch " | İsveçrə Konfederasiyası | Pestisid | Fungisid | Fluxapyroxad<br>Difenoconazole | 75<br>50 | g/L | 004845 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | İspaniya Krallığı | 18 ml/100 l suya | Üzüm | Oidium xəstəliyi | 1-ci çiləmə salxımlarda gilələrin yetişməsindən əvvəl və xəstəliyin<br>ilk inkişafı müşahidə edildikdə,<br>2-ci çiləmə xəstəliyin intensiv inkişafı dövründə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Ceres | "Hektaş Ticaret T.A.Ş.," | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cymoxanil<br>Famoxadone | 30<br>22.5 | % | 004846 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 45 q/100 l suya | Pomidor | Fitoftora | 1-ci çiləmə töradicinin inkişafının ilk dövründə,<br>2-ci çiləmə fitoftora xəstəliyinin<br>kitləvi inkişaf dövründə tətbiqi tövsiyə olunur | -/2 | 7(3) |
| 1950 | Hektaş Despina | "Hektaş Ticaret T.A.Ş.," | Türkiya Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | 6-Benzyladenin<br>Giberellin A4/A7 | 18.8<br>18.5 | g/L | 004847 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 75 ml/100 l suya | Alma | | Alma bitkisində kökdən kənar yeniləmə,<br>bitkinin ümumi inkişafını,<br>çiçəklənməni sürətləndirir,<br>xəstəliklərə qarşı davamlılığı artır | -/2 | 7(3) |
| 1951 | Hektaş Fibon | "Hektaş Ticaret T.A.Ş.," | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Spiromesifen | 240 | g/L | 004848 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 450 ml/ha | Pambıq | Hörümçək gənəsi | Pambıq əkinlərində hörümçək gənəsinə qarşı<br>3-4 yarpaq əmələ gələndə bir yarpaqda 4-5 adad<br>dişvurdu cücənin aşkarlanması zamanı tətbiqi | -/1 | 7(3) |
| 1952 | Padlock 240 EC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş.," | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 240 | g/L | 004849 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 400 mL/ha | Soğan | Soğanda olan alaq otları | Alaq otu 1-3 sm olan və bitkinin 1-2 yarpaq fazasında | -/1 | 7(3) |
| 1953 | Hekvidor 600 FS | "Hektaş Ticaret T.A.Ş.," | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 600 | g/L | 004850 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 1 ton toxuma 135 ml preparat | Kartof | Məftil qurdları, danadişi, kolooroda böcəyi | Toxum materialı səpindən əvvəl 1 $m^2$ 4-5 ədəd məftil qurdu,<br>2-3 ədəd danadişi,<br>3-4 ədəd kolorodа böcəyi olduqda dərmanlanır. | -/1 | 7(3) |
| 1954 | Hektaş Logos | "Hektaş Ticaret T.A.Ş.," | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | S-metolachlor<br>Benoxacor (safaner) | 915<br>45 | g/L | 004851 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 1.7 l/ha | Pomidor | Pomidor bitkisində alaq otları | Səpindən əvvəl pomidor əkinlərində<br>alaq otlarına qarşı tətbiqi tövsiyə olunur | -/1 | 7(3) |
| 1955 | Hektaş Arkaz | "Hektaş Ticaret T.A.Ş.," | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pirimiphos methyl | 500 | g/L | 004852 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 2.2 l/ha | Pomidor | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində iqtisadi ziyanlı<br>həddi nəzərə alınmaqla tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1956 | Cameo | "Hektaş Ticaret T.A.Ş.," | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Methoxyfenozide | 240 | g/L | 004853 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 0.6 l/ha | Pomidor | İstixana ağqanadlısı | İstixana ağqanadlısı pomidor əkinlərində<br>ağqanadlıya qarşı tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/2 | 7(3) |
| 1957 | Hektaş Galia | "Hektaş Ticaret T.A.Ş.," | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam<br>Lambda-cyhalothrin | 141<br>106 | g/L | 004854 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 0.40 l/ha | Qarğıdalı | Pambıq sovkasına qarşı | 1-ci çiləmə süpürgənin əmələ gəlmə fazasında,<br>2-ci çiləmə isə danin süd-mum yetişmə fazasında tətbiqi<br>tövsiyə olunur. | -/2 | 7(3) |
| 1958 | Becano SC 500 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | İndaziflam | 500 | g/L | 004855 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 0.1 l/ha | Meyvə bağı | Birillik və bəzi çoxillik enliyarpaqlı alaqlar | Alaq otunun inkişaf mərhələsində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1959 | Vesuper 75 DF | "Anhui Fengle Agrochemical Co.,Ltd", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron-methyl | 75 | % | 004856 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.01 kq/ha | Buğda | Birillik ikilapəli alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1960 | Trendex 100 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004857 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Azərbaycan Respublikası | 55 q/100 lt suya | Pomidor (istixana) | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1961 | Selesta 15 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole<br>Difenoconazole | 150<br>150 | g/L | 004858 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Azərbaycan Respublikası | 50 ml/100 lt suya | Pomidor (istixana) | Alternarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1962 | Mirenca 80 WP | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 004859 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Azərbaycan Respublikası | 220 q/100 lt suya | Pomidor (istixana | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1963 | Megamix 8-64 WP | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb<br>Metalaxyl | 64<br>8 | % | 004860 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Azərbaycan Respublikası | 270 q/100 lt suya | Xiyar (istixana) | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1964 | Lorenzo 250 SC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 250 | g/L | 004861 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Azərbaycan Respublikası | 80 ml/ha | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1965 | Alemana 65 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | g/L | 004862 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Azərbaycan Respublikası | 1) 150 q/100 l suya<br>2) 125 q/100 l suya<br>3) 200 q/100 l suya | Alma | 1) Qanlı məməniə 2) Güvə 3) Yastıca | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/2 | 10(3) |
| 1966 | Zey-back | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San. ve Tic.A.Ş." | Türkiya Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | Mepiquat Chloride | 50 | g/L | 004863 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 1.1 l/ha 400 l suya | Pambıq | | Vegetasiya müddətində 3 dəfə yarpaqdan<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/3 | 7(3) |
| 1967 | Kumaz EC | "Sunset Kimya Tarım Ürünleri ve Ait.İml.Paz.San. ve Tic.A.Ş." | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 116.2 | g/L | 004864 | 01.11.2024 | 01.11.2029 | Türkiya Respublikası | 780 ml/ha 400 l suya | Pambıq | Alaq otlarına qarşı | Alaq otları 6-8 sm olan fazada yarpaqdan<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1968 | Valsamba EC | "Ningbo Generic Chemical Co., Ltd", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 004866 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 300 ml/ha | Kələm | Kələm qurdu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 7(3) |
| 1969 | Chrysamed Dedex | "Ningbo Generic Chemical Co., Ltd", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 10 | g/L | 004867 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 45 ml/ha | Kələm | Kələm qurdu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 7(3) |
| 1970 | Hektovet | "Hektaş Ticaret T.A.Ş", | Türkiya Respublikası | Pestisid | Yayıcı-yapışdırıcı | Polyoxyethylene isodecyl ether | 90 | % | 004868 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Türkiya Respublikası | 25 ml/100 l su 1000 l/ha su işçi mahlula<br>250 ml | Alma | Alma yaşıl manənası əleyhinə<br>istifadə məsəddi tətlə sarmasıqlı | | -/10-15 | 7(3) |
| 1971 | Spanosect 22.8 % SC | "Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd." | İordaniya Krallığı | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 22.8 | % | 004869 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | İordaniya Krallığı | 1) 0.8 kq/ha 2) 0.7 kq/ha 3) 0.3 kq/ha | Alma | 1) Alma meyvəyeyəni<br>2) Güvə<br>3) Çürək tırtılı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 10-15/3-4 | 7(3) |
| 1972 | Silvzole | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co.,Ltd.", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 250 | g/L | 004870 | 05.11.2024 | 11/5/2029 | Çin Xalq Respublikası | 1.2 l/ha | Buğda | Unlu şeh,sarı pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 42/1-2 | 7(3) |
| 1973 | Homeros 20 EC | "Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Esfenvalerate | 200 | g/L | 004871 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Türkiya Respublikası | 0.60 l/ha | Pomidor (istixana) | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 22/1-2 | 14(1) |
| 1974 | Conella 20 SC | "Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | g/L | 004872 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Türkiya Respublikası | 12.5 ml/100 l suya | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20-22/2 | 7(3) |
| 1975 | Tolosa Super | "Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Ait. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clethodim | 116.2 | g/L | 004873 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Türkiya Respublikası | 0.60 l/ha | Soğan | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/1-2 | 7(3) |
| 1976 | Duet | "Tapazol Chemical Works Ltd." | İsrail Dövləti | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole<br>Azoxystrobin | 250<br>200 | g/L | 004874 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | İsrail Dövləti | 25 ml/1000 $m^2$ sahəyə | Şaftalı | Pas xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15-20/2 | 7(3) |
| 1977 | Sorento 100 SC | "Evergreen Agrochemical Co.,Ltd.", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat | 100 | g/L | 004875 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 100 ml/100 l suya | Armud | Armud bağacığı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/1-2 | 7(3) |
| 1978 | Glyphoyam 48% SL | "Yamama Agri Products Industrial Co., Ltd" | İordaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | Glyphosate IPA | 48 | % | 004876 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | İordaniya Krallığı | 600 ml/40 l su 1000 $m^2$ | Gilas | Birillik və çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60-90/1-2 | 7(3) |
| 1979 | Bakir Special | "Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic. A.Ş.", | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper salts of fatty and rosin acids (equal to 51.4 g/L Metallic copper) | 583 | g/L | 004881 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Türkiya Respublikası | 220 ml/1000 $m^2$ | Pomidor (istixana) | Alternarioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 10(2) | 7(3) |
| 1980 | Contest | "Doğal Kimyevi Maddeler ve Zirai İlaçlar San. ve Tic. A.Ş.", | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 004882 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Türkiya Respublikası | 0.25 l/ha | Pomidor | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 28/1-2 | 7(3) |
| 1981 | Yona | "Doğal Kimyevi Maddeler ve<br>Zirai İlaçlar San. ve Tic.A.Ş.", | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Bentazone | 480 | g/L | 004883 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Türkiya Respublikası | 2.2 l/ha | Soğan | Alaq otlarına | Alaq otunun 1-3 sm olan və bitkinin 1-2 yarpaq<br>inkişaf fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 1982 | Bioprocal | "Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | Prohexadione-calcium | 10 | % | 004903 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1) 0.50-0.75 kq/ha 1000 l su<br>2) 1 kq/ha 1000 l su | 1) Alma 2) Albalı | Zoğ | Vegetasiya müddətində yarpaqdan<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 7/3 | 7(3) |
| 1983 | Biomethrin | "Shangai AgroChina Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 004904 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 250-500 ml/ha | Alma | Şüşəqanad kəpənək | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | Çiləmələr arasındakı<br>interval<br>zərərvericinin<br>inkişafından asılı<br>olaraq təyin edilir./2-<br>3 | 7(3) |
| 1984 | Biolan | "Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dithianon | 70 | % | 004905 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1) 0.18 kq/ha 1000 l su<br>2) 0.35-1 kq/ha 1000 l su<br>3) 1 kq/ha 1000 l su<br>4) 1 kq/ha 1000 l su | 1) Alma<br>2) Armud<br>3) Şaftalı<br>4) Ərik | 1) Damğıl<br>2) Damğıl<br>3) Yarpaq qıvrılması<br>4) Deşikli ləkəlilik | Vegetasiya müddətində yarpaqdan<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 1) 7 gün<br>2) yoxdur<br>3 və 4) 10-15 gün<br>//2-3 dəfə | 7(3) |
| 1985 | Suncopper 50 WP | "Jadesheen Chemical Co.Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper Oxychloride<br>equivalent to metallic copper | 50 | % | 004906 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1,2,3 və 5) 800 q/100 l su<br>4) 400 q/100 l su | 1) Alma<br>2) Armud<br>3) Şaftalı<br>4) Ərik<br>5) Gavalı | 1) Damğıl<br>2) Damğıl<br>3) Yarpaq qıvrılması<br>4) Deşikli ləkəlilik<br>5) Cib-cibə | 1) Qönçaların şişmə mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.<br>2) Yazda çiçəklənmə mərhələsində tətbiqi tövsiyə<br>olunur. | 1) 15 gün<br>2) 10 gün<br>3,4 və 5) 21 gün //2<br>dəfə | 7(3) |
| 1986 | Biodim | "Shangai Agrochina Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Dimethoate | 40 | % | 004907 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1.250 l/ha 1000 l/su | Alma | 1) Yaşıl alma mənənəsi<br>2) Qızılgül yarpaqbükəni<br>3) Qonur meyvə gənəciyi | Vegetasiya müddətində yarpaqdan<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 1 və 2) 7-10 gün/2-3<br>dəfə<br>3) 15-20 gün/ 2 dəfə | 7(3) |
| 1987 | Fosal | "Shangai Agrochina Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-Aluminum | 80 | % | 004908 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.5 kq/ha | Alma | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/2-3 | 7(3) |
| 1988 | Biphosat | "Shangai AgroChina Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İPA | 480 | g/L | 004909 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 3 l/ha 300 l/ha su işçi məhlulu | Feyxoa | Birillik enli və dar yarpaqlı alaq otları,<br>iki illik alaq otları, Çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60-90/1-2 | 7(3) |
| 1989 | Perceptio 250 EC | "Suno Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş" | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 004910 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 300 ml/ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1990 | Bimagor | "Shijiazhuang Liger Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Dimethoate | 40 | % | 004911 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1500 ml/ha | Pambıq | Mənənə | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/1-2 | 7(3) |
| 1991 | Bigalia | "Shanghai MİO Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam<br>Lambda cyhalothrin | 141<br>106 | g/L | 004912 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 105 ml/ha | Payızlıq buğda | Mənənə | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/1-2 | 7(3) |
| 1992 | Bicayenne | "Shangahi E-Tong Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiamethoxam | 24 | % | 004914 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Çin Xalq Respublikası | 300 ml/ha | Pomidor (istixana) | İstixana ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/1-2 | 7(3) |
| 1993 | Biminoil | "Hanyu Sk Ets Co., Ltd ", | Cənubi Koreya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Mineral Oil (Cas № 64742-55-8) | 83 | % | 004915 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Cənubi Koreya Respublikası | 2 l/100 l suya | Alma | Mənənə ,<br>qırmızı meyvə gənəsinin<br>yəticəsinin qışlama fazalarına | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20-25/2 | 7(3) |
| 1994 | Ossiclor 50 PB Manica | "Manica S.p.A " | İtaliya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper | 50 | % | 004916 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | İtaliya Respublikası | 2.4 kq/ha | Alma | Damğıl xəstəliyi | Vegetasiya dövründə çiləmə üsulu ilə<br>tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 10(4) |
| 1995 | FRS Must-İ 65 EC | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San.<br>İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Malathion | 650 | g/L | 004917 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Türkiya Respublikası | 1 l/ha | Pambıq | Mənənə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/1-2 | 7(3) |
| 1996 | FRS Bordo | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San.<br>İç ve Dış Tic.Ltd.Sti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux mixture equivalent to<br>metallic copper | 20 | % | 004918 | 05.11.2024 | 05.11.2029 | Türkiya Respublikası | 1500 q/100 l suya | Şaftalı | Yarpaq qıvrılması | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1997 | FRS Paunt | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San.<br>İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004919 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiya Respublikası | 50 ml/100 l suya | Xiyar (istixana) | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/2 | 7(3) |
| 1998 | Fherus | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San.<br>İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosteyl-Al | 80 | % | 004920 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiya Respublikası | 250 q/100 l suya | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 1999 | FRS Kuga 5 EC | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San.<br>İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-p-ethyl | 50 | g/L | 004921 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiya Respublikası | 1000 ml/ha | Pomidor | Alaq otları, çayır toyuq dansı, hələb kalışı | Vegetasiya müddətində çiləmə<br>üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | FRS Glok 80 WG | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid-akarisid | S | 80 | % | 004922 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 400 q/100 l suya | Xiyar | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2001 | Mondeo 300 SC | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım Hay.Nak.San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 300 | g/L | 004923 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 125 ml/100 l suya | Pomidor | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2002 | Basultra 200 SL | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glufosinate ammonium salt | 200 | g/L | 004924 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 3-7.5 l/ha | Meyvə | Alaq otları | Cərgə aralarında olan birillik və çoxillik alaqlara qarşı tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2003 | Chekic 600 | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Aclonifen | 600 | g/L | 004925 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.25 -500 l/ha suya | Günəbaxan | Alaq otları | Çıxış sonrası geniş yarpaqlı alaqlara qarşı tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2004 | Doberman 240 SC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Insektisid-akarisid | Spiromesifen | 240 | g/L | 004926 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 40-50 ml/100 l suya | Alma | Gənələr | Hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə gənəsi müşahidə olunduqda tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/2 | 7(3) |
| 2005 | Fosfogard 400 | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Phosphorus Acid (mono and dipotassium salts) | 400 | g/L | 004927 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 4 l/ha | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 10/2 | 7(3) |
| 2006 | Linx | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | 6-Benzyladenin<br>Giberallin A4/A7 | 18,8<br>18,5 | g/L | 004928 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 700 ml/ha | Meyvə bitkiləri | | Bitkilərin inkişafı fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2007 | Safa Extra Fix | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | Mepiquat Chloride | 50 | g/L | 004929 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha 0.1%-li | Soğan | | Bitki 3-4 yarpaq olduqda tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2008 | Safa Tonik | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | Sodium p-nitrophenolate<br>Sodium o-nitrophenolate<br>5-nitroguaiacolate | 3<br>2<br>1 | g/L | 004930 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 500 ml/1000 l suya | Meyvə bitkiləri | | Bitkilərin inkişaf mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2009 | Sarfrex 65 WP | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Dodine | 65 | % | 004931 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 1 kq/ha | Alma | Dəmgil | Meyvələrin ağaclarında çiçək ləçəklərinin 80%-nin tökildüyü mərhələdə tətbiqi tövsiyə olunur. | 12/2 | 7(3) |
| 2010 | Synergizer 62.5 WG | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil<br>Fludioxonil | 37,5<br>25 | % | 004932 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.4 kq/ha | Gilas | Monilya | Çiçəklənənin başlanğıcında və tam çiçəkləmə dönəmində tətbiqi tövsiyə olunur. | 12/2 | 7(3) |
| 2011 | Taqat WP | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl | 70 | % | 004933 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 60 q/100 l su 0.06%-li | Ərik | Moniliya | Bitkilərin çiçəkləməsi zamanı tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2012 | Tebicur FS 060 | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 60 | g/L | 004934 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 kq toxum | Buğda | Toz sürmə | Buğda bitkisində toz sürmə xəstəliyinə qarşı tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2013 | Topcup 240 EC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafob-propargyl<br>Cloquintocet-mexyl (safener) | 240<br>60 | g/L | 004935 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 200 ml/ha | Buğda | Dar yarpaqlı alaqlar | Buğdanın boruyaçəmə fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2014 | Zorba 10 SC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 004936 | 06.11.2024 | 06.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 25-35 ml/100 l su | Meyvə ağacları | Gənələr | Hər yarpaq səthində 4-5 ədəd meyvə gənələrinin sürfə və nimfaları olduqda tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 2015 | Polux | "Galenika-Fitofarmaciya s.c.", ("Галеника Фитофармација а.д) | Serbiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltametrin | 25 | g/L | 004938 | 15.11.2024 | 15.11.2029 | Serbiya Respublikası | 30 ml/100 l suya | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20-22/2 | 7(3) |
| 2016 | ACS Sayokan 5 EC | "Sector Tarım Kimya Gıda Paz.San. ve Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 004939 | 15.11.2024 | 15.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 200 ml/ha | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 15/2-3 | 7(3) |
| 2017 | Weffa Bordomix | "Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallic copper equivalent to bordeaux mixture | 20 | % | 004942 | 18.11.2024 | 18.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 5 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/2 | 7(3) |
| 2018 | Koruma Tonik | "Koruma Klor Alkali San.ve Tic. A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | Sodium para nitrophenolate<br>Sodium ortho nitrophenolate<br>Sodium penta nitroguaiacolate | 3<br>2<br>1 | g/L | 004943 | 18.11.2024 | 18.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 50 ml/100 l su | Alma | | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2019 | Entopik Super 240 EC | "İlfoda Agro Kimyo Himoya" | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl<br>Cloquintocet-mexyl (antidote) | 240<br>60 | g/L | 004945 | 27.11.2024 | 27.11.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.15 l/ha | Buğda | Birləpəli alaqlar | Buğdanın kollanma fazasında, birləpəli alaqların 2-3 yarpaq fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 2020 | Entostar 750 WDG | "İlfoda Agro Kimyo Himoya" | Özbəkistan Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron methyl | 750 | q/kq | 004946 | 27.11.2024 | 27.11.2029 | Özbəkistan Respublikası | 0.02 kq/ha | Buğda | Birlik ikiləpəli alaqlar | Alaqların erkən inkişaf fazasında çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 2021 | Affiche WG | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesosulfuron-methyl<br>Iodosulfuron-methyl-sodium<br>Mefenpyr-diethyl (safener) | 3<br>0,6<br>9 | % | 004947 | 27.11.2024 | 27.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.3 kq/ha | Buğda | Birləpəli və ikiləpəli alaqların 2-6 yarpaq fazasında | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 2022 | Balan Süper | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-p-etyhl<br>Mefenpyr-diethyl (safener) | 75<br>69 | g/L | 004948 | 27.11.2024 | 27.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.8 l/ha | Arpa | Birləpəli alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 2023 | Clopyr 100 | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 100 | g/L | 004949 | 27.11.2024 | 27.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha | Buğda | Çöl keçnişi və digər enliyarpaqlı alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 2024 | Dally Süper 464 SL | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2.4-D Acid dimethylammonium salt<br>Dicamba | 344<br>120 | g/L | 004950 | 27.11.2024 | 27.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha | Buğda | Birillik və çoxillik ikiləpəli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 2025 | Granland | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron methyl | 75 | % | 004951 | 27.11.2024 | 27.11.2029 | Türkiyə Respublikası | 15 q/ha | Buğda | Birillik ikiləpəli alaqların erkən inkişaf fazasında | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/1-2 | 7(3) |
| 2026 | Kassius,WSP (Кассиус,ВРП) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Rimsulfuron | 250 | q/kq | 004952 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,05 kq/ha | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur. | 60(1-2) | 7(3) |
| 2027 | Hermes,OD (Гермес, МД) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-P-ethyl<br>İmazamox | 50<br>38 | g/L | 004953 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 1,0 L/ha 200 L suya | soya | Birillik və bazi çoxillik ikiləpəli və dənli alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur. | 60(1-2) | 7(3) |
| 2028 | Metamil MC, WDG<br>( Метамил МЦ, ВДГ) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb<br>Metalaxyl | 640<br>80 | g/kg | 004954 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 2,5 kq/ha 2) 2-2.5 kq/ha | 1) Üzüm 2) Meyvə 3) Kartof | 1) Mildiu 2) Dəmgil 3) Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur. | 20(3) | 7(3) |
| 2029 | Espero, SC (Эсперо, КС) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid<br>Alpha-cypermethrin | 200<br>120 | g/L | 004955 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,20 L/ha 300 L suya | Qarğıdalı | Qarğıdalı gövdə sovkası | Vegetasiya dövründə zərərvericilər müşahidə edildikdə çiləmə aparılır | 20(2) | 7(3) |
| 2030 | Forvard OEC, (Форвард, МКЭ) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Quizalofop-P-ethyl | 60 | g/L | 004956 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 0.9-1.5 l/ha<br>2) 1.5-2.5 l/ha | 1) Kələm, pomidor, kartof<br>2) Soğan,soya | Birillik və çoxillik taxıl fasilasi alaqları | Alaq otunun 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2031 | Mekar, ME (Мекар, МЭ) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Abamectin | 18 | g/L | 004957 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 1 l/ha 1000 l suya | Gavalı | Tor gənələri | Zərərli orqanizm müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 10(1-2) | 7(3) |
| 2032 | Kantor, CSC (Кантор, ККР) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 200 | g/L | 004958 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.65-0.75 l/ha | Alma | Dəmgil | Vegetasiya dövründə 10-15% sirayətlənmə müşahidə olunduqda çiləmə aparılmalıdır | 10(1-2) | 7(3) |
| 2033 | Medeya, ME (Медея, МЭ) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole<br>Flutriafol | 50<br>30 | g/L | 004959 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,8-1,2 l/ha | 1) alma, armud<br>2) üzüm<br>3) kartof | 1) Dəmgil, unlu şeh<br>2) Oidium, antraknoz<br>3) Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu tətbiqi tövsiyə olunur. | 21(2) | 7(3) |
| 2034 | Indigo, SC (Индиго, КС) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Tribasic copper sulfate | 345 | g/L | 004960 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 5,0 lt 1000 lt su | 1) Şaftalı 2) Ərik | 1) Yarpaq qıvrılması 2) Klasterosporioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15(1-2) | 7(3) |
| 2035 | Titul Duo, CSC (Титул Дуо, ККР) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole<br>Tebuconazole | 200<br>200 | g/L | 004961 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,32 L/ha 200 L suya | Buğda | Sarı pas<br>qonur pas<br>unlu şeh xəstəlikləri | Vegetasiya dövründə zərərli orqanizm müşahidə edildikdə yarpaqdan çiləmə | 40(1-2) | 7(3) |
| 2036 | Orvego | "Basf SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ametoctradin<br>Dimethomorph | 300<br>225 | g/L | 004963 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | İspaniya Krallığı | 110 ml/100 l suya | Xiyar | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -(2) | 7(3) |
| 2037 | Cantus WG | "Basf SE" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid | 500 | q/kq | 004964 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 1,5 kq/ha | Ərik | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21(2) | 7(3) |
| 2038 | Aliette WG 80 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl-aluminium | 800 | g/kg | 004965 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Fransa Respublikası | 0.2 | Tərəvəz əkinləri | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 7(2) | 7(3) |
| 2039 | Beamont | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ürünleri San. ve Tic. Ltd.Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lufenuron | 50 | g/L | 004968 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.2 l/ha | Qarğıdalı | Sovkalar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 35(1-2) | 7(3) |
| 2040 | Strider | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti.", | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pinoxaden<br>Cloquintocet-mexyl (safener) | 45<br>15 | g/L | 004969 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha | Buğda | Birləpəli alaqların 2-4 yarpaq kollanma fazasında | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60(1-2) | 7(3) |
| 2041 | Yutaka | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İml. İth. İhr. San.ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prochloraz<br>Trifloxystrobin<br>Cyproconazole | 250<br>75<br>50 | g/L | 004970 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 1000 ml/ha | Buğda | Unlu şeh, Sarı pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 42(1-2) | 7(3) |
| 2042 | Kazuya | "Agrobest Grup Tarım İlaçları Toh. İml. İth. İhr. San.ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 004971 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 200 ml/ha | Buğda | Ziyankar bağacıq | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14(1-2) | 7(3) |
| 2043 | Hermin 72% SL | "Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd" | İordaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | 2.4-D Dimethyl Amine salt | 72 | % | 004972 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | İordaniya Krallığı | 1.4 l/ha | Buğda | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar | Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur. | 14(1-2) | 7(3) |
| 2044 | Conyam 25% EC | "Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd" | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Propiconazole | 25 | % | 004973 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | İordaniya Krallığı | 100 ml/ha | Buğda | Unlu şeh, sarı pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 28/1-2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045 | Granyam 75% WDG | "Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd" | İordaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | Tribenuron methyl | 75 | % | 004974 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | İordaniya Krallığı | 20 q/ha | Buğda | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar | Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur. | 14(1-2) | 7(3) |
| 2046 | Yamabic 30% EC | "Yamama Agri Products Industrial Co.Ltd" | İordaniya Krallığı | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl<br>Clomazone(reserved) | 24<br>6 | % | 004975 | 02.12.2024 | 02.12.2029 | İordaniya Krallığı | 65 ml/ha | Buğda | Birillik birlipaylı alaqlar | Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur. | 21(1-2) | 7(3) |
| 2047 | Star 10% EC | "Campo Alboran S.L." | İspaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004976 | 03.12.2024 | 03.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.75 l/ha | Xiyar (istixana) | Unlu şeh xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14(2) | 7(3) |
| 2048 | Tiacrid | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 480 | g/L | 004977 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 20 ml/100 l su | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15(2) | 7(3) |
| 2049 | Cleverole | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Chlorantraniliprole | 200 | g/L | 004978 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 1) 12.5 ml/100 l suya, 2) 20 ml/100 l suya | 1)Alma, 2)Şaftalı,ərik, gavalı | 1)Alma meyvəyeyəni, 2)Şaftalı güvəsi | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14(2-3) | 7(3) |
| 2050 | Cyperain | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 004979 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.20 l/ha | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15(2) | 7(3) |
| 2051 | Emacarb Plus | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb<br>Emamectin benzoate | 100<br>20 | g/L | 004980 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 0.25 l/ha | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14(3-4) | 7(3) |
| 2052 | Raincozeb | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 004981 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 250 q/100 l su (2.5 kq/ha, 1000 l su) | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15(2) | 7(3) |
| 2053 | Goldrole Xtra | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Flubendiamide | 20 | % | 004982 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 20 q/100 l su (0,2 kq/ha, 1000 l su) | Alma | Alma meyvəyeyəni | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15(2-3) | 7(3) |
| 2054 | Fenfen | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 004983 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.5 l/ha 400 l/ha sy işçi məhlulu | Armud | Birillik, ikillik, çoxillik alaq otları | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur. | -(1) | 7(3) |
| 2055 | Metnate | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiophanate-methyl | 70 | % | 004984 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 60q/100 l su | 1)Alma, 2)Armud, 3)Ərik,4)Gilas,5)Şaftalı | 1)Damğıl, Unlu şeh, 2) Damğıl, 3) 4) 5)Meyvə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15(2-4) | 7(3) |
| 2056 | Cleverole Plus | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Chlorantraniliprole<br>Abamectin | 45<br>18 | g/L | 004985 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 90 ml/100 l suya | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2057 | Ethpyri | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 400 | g/L | 004986 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 95 ml/100 l suya | Pomidor | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2058 | Acegoal | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004987 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 30 q/100 l suya | Pomidor | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2059 | Floca Xtra | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Flonicamid | 50 | % | 004988 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 15 q/100 l suya | Xiyar | Mənənələr | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2060 | Penzole | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 004989 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 50 ml/100 l suya | Xiyar | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2061 | Preguard | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fluazinam | 500 | g/L | 004990 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 75 ml/100 l suya | Pomidor | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2062 | Shaolin Xtra | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil<br>Fludioxonil | 37.5<br>25 | % | 004991 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 60 qr/100 l suya | Pomidor | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2063 | Spanvic | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spinosad | 480 | g/L | 004992 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 30 ml/100 l suya | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2064 | Upaxial | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pyriproxyfen | 100 | g/L | 004993 | 05.12.2024 | 05.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 50 ml/100 l suya | Pomidor | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2065 | Bimetiram | "Nanjing Bestgreen Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metiram | 70 | % | 004994 | 09.12.2024 | 09.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 2.2 kq/ha | Xiyar | Yalançı unlu şeh | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2066 | Biplan | "İprochem Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 004995 | 09.12.2024 | 09.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 225 q/ha | Xiyar | Mənənə | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2067 | Bimut | "İprochem Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Tebuconazole | 120<br>200 | g/L | 004996 | 09.12.2024 | 09.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 300 ml/ha | Xiyar | Unlu şeh | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2068 | Dark Blue 50 WP | "Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 004997 | 09.12.2024 | 09.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 300 q/100 l su və ya 3 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 28/3 | 10(3) |
| 2069 | ACS Delda 2.5 EC | "Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 004998 | 09.12.2024 | 09.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 30 ml/100 lt su və ya 300 ml/ha | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya və qışlama müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 3(3-4) | 7(3) |
| 2070 | ACS Gladio 110 SC | "Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiya Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 004999 | 09.12.2024 | 09.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 25 ml/100 l su və ya 250 ml/ha | Üzüm | İkinöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 7(3) | 7(3) |
| 2071 | ACS İncubus | "Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiya Respublikası | Pestisid | Akarisid | Bifenazate | 240 | g/L | 005000 | 09.12.2024 | 09.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 60 ml/100 l su və ya 600 ml/ha | Üzüm | İkinöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14(3) | 10(3) |
| 2072 | Vacomil- Plus 50% WP | "Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl<br>Copper oxychloride | 15<br>35 | % | 005001 | 12.12.2024 | 12.12.2029 | İordaniya Krallığı | 1.5 kq/ha | 1) Alma 2) Şaftalı 3) Ərik 4) Gilas 5) Gavalı | 1 və 2) Unlu şeh 3, 4 və 5) Xərçəng | 1 və 2) Zoğlarda 15%-lik yoluxma aşkar edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur.<br>3,4 və 5) Cərtənin ilkin inkişaf həyəcanında 2%-lik sirkəsiftələnmə | 1 və 2) 3-4 dəfə, 3,4 və 5) 2-4 dəfə | 48 saat |
| 2073 | Ekipp Super WG 61 | "Bayer AG" | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Herbisid | Foramsulfuron<br>Iodosulfuron-methyl-sodium<br>Isoxadifen-ethyl (safener) | 300<br>10<br>300 | g/kg | 005003 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Almaniya Federativ Respublikası | 150 q/ha+2 l/ha MERO | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik birlipaylı və ikilipaylı alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60(1-2) | 7(3) |
| 2074 | Bordocan 20 WP | "Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Bordeaux mixture equivalent to metallic copper | 20 | % | 005007 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 6,0 | Meyvə | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2075 | Can Kaptan 50 WP | "Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Captan | 50 | % | 005008 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 1,0-1,2 | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/2 | 7(3) |
| 2076 | Cansa Ranidap 48 SL | "Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiya Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glyphosate İsopropylamine salt | 480 | g/L | 005009 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 3,0 | Meyvə bağı | Birillik taxıl fəsiləsi və ikilipaylı alaqlar | Yazda və yayda inkişafda olan alaqlara qarşı çiləmə (mədəni bitkini qorumaq şərti ilə) üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 30/1-2 | 7(3) |
| 2077 | Sumosa EC | "Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti." | Türkiya Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 005010 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 0,1-0,2 | Kartof | Kolorado kartof böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/2 | 7(4) |
| 2078 | Primadonna SE ("Примадонна, СЭ") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D acid (2-ethylhexyl ester)<br>Florasulam | 200<br>3.7 | g/L | 005011 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,9 l/ha 200 l suya | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik birlipaylı alaq otları | Vegetasiya müddətində alaq otlarının 5-7 yarpaq fazalarında istifadə edilir. | 60/1-2 | 7(3) |
| 2079 | Faskord EC ("Фаскорд, КЭ") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Alpha-cypermethrin | 100 | g/L | 005012 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 0,10-0,15 l/ha, 2) 0,1 l/ha | 1) Buğda 2) Otlaqlar | 1) Taxıl hafı ziyankar bağacıq, taxıl böcəkləri, zəlicə böcəyi, mənənələr, 2) Çəyirtkələr, | 1) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.<br>2) Sürsəlləmiş sahələrin cücərməyi tərkibə olunur | -/1 | 1) 20 (2) gün; 2) 20 (3) gün |
| 2080 | Şirma, SC ("Ширма, КС") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Fluazinam | 500 | g/L | 005013 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0.75 l/ha 1000 l su | Meyvə bitkiləri | Damğıl | Vegetasiya müddətində xəstəlik müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/2 | 7(3) |
| 2081 | Yunona, ME, ("Юнона, МЭ") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 50 | g/L | 005014 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,5 l/ha 1000 l su | Alma bitkisi | Alma meyvəyeyəni və yarpaqbükənlər | Vegetasiya müddətində 15% zərərvericisi müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/1-2 | 7(3) |
| 2082 | Kondor, WDG ("Кондор, ВДГ") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Triflusulfuron-methyl | 500 | g/kg | 005015 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 30 q/ha 200 l suya | Şəkər çuğunduru | Birillik birlipaylı alaqlar | Bitkilərin çıxışından sonra yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/2 | 7(3) |
| 2083 | Oktava, OD ("Октава, МД") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron<br>Florasulam | 60<br>3.6 | g/L | 005016 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 1 l/ha 200 l suya | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik birlipaylı və ikilipaylı alaqlar | Mədəni bitkilərin 3-6 yarpaq fazasında və alaq otlarının böyümasinin erkən fazalarında akin sahalərinin çiləməsi üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/1-2 | 7(3) |
| 2084 | Betaren 22, OEC ("Бетарен 22, МКЭ") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Fenmedifam<br>Desmedifam | 110<br>110 | g/L | 005017 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 3 l/ha 200 l işçi məhlul | Şəkər çuğunduru | Birillik birlipaylı alaqlara qarşı | Bitkinin 4 həqiqi yarpaq fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/1-3 | 7(3) |
| 2085 | Оксуцен Екстра, ЕС ("Оксоген Экстра, КЭ") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Fenoxaprop-P-ethyl<br>Antidote | 140<br>35 | g/L | 005018 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,5 l/ha | Payızlıq taxıllar | Birillik alaqlar | Yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2086 | Fenizan, SL ("Фенизан, ВР") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Dicamba acid<br>Chlorsulfuron acid | 360<br>22.2 | g/L | 005019 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,14-0,2 l/ha | Taxıl | Birillik birlipaylı və bazı çoxillik birlipaylı alaqlar | Bitkinin kollanma mərhələsinin əvvəli (3-4 yarpaq) və sonu akinlərə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2087 | Akardo, CSC ("Акардо, ККР") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Spirodiclofen | 250 | g/L | 005020 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,06 l/ha 1000 l suya | Meyvə bitkiləri | Meyvə tor gənəsi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2088 | Zontran, CSC ("Зонтран, ККР") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 250 | g/L | 005021 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 1,0 l/ha 2) 1,7 l/ha | 1) Kartof 2) Pomidor | Birillik birlipaylı və taxıl fəsilesi alaqları | Cücərtilər əmələ gələnə qədər inkişafda olan alaqlara çilənmalı qtil akinindan<br>15-20 gün sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2089 | Lornet, SL ("Лорнет, ВР") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 300 | g/L | 005022 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 1) 0,2-0,4 l/ha 2) 0,2-0,5 l/ha | 1) Payızlıq taxıllar 2) Qarğıdalı | Birillik taxıl fəsilesi alaqları | 1) Yazda taxılın boruya çıxma mərhələsində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.<br>2) Mədəni bitkinin 3-6 yarpaq mərhələsində çiləmə | -/1 | 7(3) |
| 2090 | Mitron, SC ("Митрон, КС") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Herbisid | Metamitron | 700 | g/L | 005023 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 2 l/ha 300 l suya | Şəkər çuğunduru | Birillik birlipaylı alaq otları | Bitkilərin cücərmə fazasından sonra çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/2 | 7(3) |
| 2091 | Tvingo, SC ("Твинго, КС") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | Difubenzuron<br>İmidacloprid | 180<br>45 | g/L | 005024 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 1 l/ha 1000 l suya | Alma bitkisi | Alma meyvəyeyəni, Alma yaşıl mənənəsi | Vegetasiya müddətində 15% zərərvericisi müşahidə olunduqda çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/1-2 | 7(3) |
| 2092 | Tebu 60, ME ("Тебу 60, МЭ") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 60 | g/L | 005025 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,4-0,5 l/t | Taxıl | Bark və toz sürmə | Toxumların dərmanlanması işçi məhlul sərfi-1 tona 10 litr. | | 7(3) |
| 2093 | Triada , CSC ("Триада, ККР") | "«Велкоо Агрохим" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | Fungisid | Propiconazole<br>Tebuconazole<br>Fenpropimorph | 140<br>140<br>30 | g/L | 005026 | 18.12.2024 | 18.12.2029 | Rusiya Federasiyası | 0,6 l/ha 1000 l suya | Alma və armud bitkiləri | Meyvə çürüməsi (kif) xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/1-2 | 7(3) |
| 2094 | Token 50 WP | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallic copper | 50 | % | 005029 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | Azərbaycan Respublikası | 550 q/100 lt suya | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 18/2 | 7(3) |
| 2095 | Token 20 WP | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallic copper | 20 | % | 005030 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | Azərbaycan Respublikası | 800 q/100 lt suya | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/1-2 | 7(3) |
| 2096 | Sparkle 80 WP | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Thiram | 80 | % | 005031 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | Azərbaycan Respublikası | 300 q/100 lt suya | Noxud | Antraknoz | Sapidanqabaq toxumun dərmanlanması üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2097 | Stargate SC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 005032 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | Azərbaycan Respublikası | 40 ml/100 lt suya | Pomidor (istixana) | Tor gənəsi | Meyvaların əmələ gəlmə dövründə tətbiqi tövsiyə olunur. | 3/1-2 | 7(3) |
| 2098 | Rockstar 240 SC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Akarisid | Spirodiclofen | 240 | g/L | 005033 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | Azərbaycan Respublikası | 30 ml/100 lt suya | Gilas | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/2 | 7(3) |
| 2099 | Melodyne 48 SL | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyicisi | Etephon | 480 | g/L | 005034 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | Azərbaycan Respublikası | 0.3 ml/100 lt suya | Pomidor | | Texniki yetişkənlikdən əvvəl çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2100 | Contra 5 WP | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil | 50 | % | 005035 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | Azərbaycan Respublikası | 400 q/1000 lt suya | Alma | Damğıl | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/2 | 7(3) |
| 2101 | Overlex 50 EC | "Agro-Tech Solutions" MMC | Azərbaycan Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 005036 | 20.12.2024 | 20.12.2029 | Azərbaycan Respublikası | 50-60 ml/100 lt suya | Alma | Qırmızı alma gənəciyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | Mazal-21.2 % EC | "Vapco Veterinary and Agricultural Products Manufacturing Co.Ltd." | İordaniya Krallığı | Pestisid | Fungisid | İmazalil | 21.2 | % | 005042 | 24.12.2024 | 24.12.2029 | İordaniya Krallığı | 0.5 kq/ha | 1) Alma 2) Armud | 1) Unlu şeh 2) Yarpaq ləkələri | 1) 100 zoğda xəstəliyin törədiciləri ilə 15%-lik sirayətlənmə aşkar edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur.<br>2) Xəmirəmə 15%-lik sirayətlənmə aşkar edildikdə | 7/2-4<br>10/2-3 | 7(3) |
| 2103 | Lepha | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Flonicamid<br>Pyriproxyfen | 100<br>60 | g/L | 005043 | 24.12.2024 | 24.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.70 l/ha | Pambıq | Ağqanadlı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/1-2 | 7(3) |
| 2104 | Axxess | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Prochloraz | 450 | g/L | 005044 | 24.12.2024 | 24.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 1000 ml/ha | Buğda | Unlu şeh, Sarı pas | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 56/1-2 | 7(3) |
| 2105 | Copside | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper oxychloride equivalent to metallic copper | 50 | % | 005046 | 24.12.2024 | 24.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 300 q/100 l | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində və çiçələmə dövründə çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/4 | 10 (3) |
| 2106 | Mexamite | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 005047 | 24.12.2024 | 24.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 50 ml/100 l yaxud 500 ml/ha | Üzüm | İkinöqtəli qırmızı hörümçək | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 7/2 | 10 (3) |
| 2107 | Bastnate | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Glufosinate-ammonium | 200 | g/L | 005048 | 24.12.2024 | 24.12.2029 | Çin Xalq Respublikası | 7.5 l/ha | Alma | Alaq otları | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 40/2 | 7(3) |
| 2108 | Arias | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | İmazamox | 40 | g/L | 005050 | 24.12.2024 | 24.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 1.25 l/ha | Soya | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı və daryarpaqlı alaqlar | Alaq otlarının ilkin fazalarında<br>tətbiqi tövsiyə olunur. | 18/1-2 | 7(3) |
| 2109 | Velomax | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San ve Tic.Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione<br>Nicosulfuron | 75<br>30 | g/L | 005051 | 24.12.2024 | 24.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 2 l/ha | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar | Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur. | 35/1-2 | 7(3) |
| 2110 | Savegard 30 L | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Hymexazol | 360 | g/L | 005056 | 26.12.2024 | 26.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 150 ml/100 l suya | Pomidor | Kök çürüməsi | Vegetasiya müddətində torpaq üzərinə çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/1-2 | 7(3) |
| 2111 | FRS Rampar FS 060 | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 60 | g/L | 005057 | 26.12.2024 | 26.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 0.50 l/1 ton toxuma | Buğda | Bərk sürmə | Sapından əvvəl dərmanlanmanın<br>aparılması tövsiyə edilir. | 25/1-2 | 7(3) |
| 2112 | D-Methalin 330 EC | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | g/L | 005058 | 26.12.2024 | 26.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 5 l/ha | Pomidor | Ağ amarant, Dirrik parpərəni,<br>Unluca, Yabanı xardal | Çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2113 | FRS Henna | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Ametoctradin<br>Dimethomorph | 300<br>225 | g/L | 005059 | 26.12.2024 | 26.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 80 ml/100 l suya | Pomidor | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2114 | Tro-Fer 5 EC | "Feras Kimya Zirai İlaç Tarım ve Hay.Nak.San.İç ve Dış Tic.Ltd.Şti | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Lambda-cyhalothrin | 50 | g/L | 005060 | 26.12.2024 | 26.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 500 ml/ha | Pomidor | Pambıq sovkası | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2115 | ACS Pasha 25 EC | "Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Cypermethrin | 250 | g/L | 005066 | 27.12.2024 | 27.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 300 ml/ha | Pomidor | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 2116 | ACS Acetam 20 SP | "Sector Tarım Kimya Gıda Paz. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 005067 | 27.12.2024 | 27.12.2029 | Türkiyə Respublikası | 300 g/100 l suya | Pomidor | Tütün ağqanadlısı | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir | 20/2 | 7(3) |
| 2117 | İmidor, WSC (Имидор, ВРК) | "Şelkovo Agroxim" SC (АО «Щелково Агрохим») | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 200 | g/L | 005070 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Rusiya Federasiyası | 1) 0.1+200 l suya/ha<br>2) 0.25+200 l suya/ha<br>3) 0.07+200 l suya/ha | 1) Kartof<br>2) Pambıq<br>3) Buğda | 1) Kolorado kartof böcəyi<br>2) Pambıq sovkası<br>3) Ziyankar bağacıq, Taxıl böcəkləri, Zolica böcəyi, Mənanələr, Çəyirtəkəkimilər | 1) Zərərverici müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur.<br>2) Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur.<br>3) Ziyanvericilərin inkişafından asılı olaraq tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 28(3) |
| 2118 | $ECO_2Fume$ | "Cytec İndustries İnc" | Kanada Dövləti | Pestisid | Fumiqant | $PH_3$<br>$CO2$ | 2<br>98 | % | 005081 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Kanada Dövləti | 1000 ppm-də 4.8 kq/kub metrə | Pomidor | Pomidor minalayıcı güvəsi | Saxlanma kamerasında pomidor minalayıcı güvəsi<br>müşahidə edildikdə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2119 | Cowboy 240 EC | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clodinafop-propargyl<br>Cloquintocet-mexyl (safener) | 240<br>60 | g/L | 005082 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 0,2 l/ha | Buğda | Birillik birləpəli və ikiləpəli alaqlar | Buğda bitkisinin kollanma boruyaçıxma mərhələsində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2120 | Hekta Süper | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Tebuconazole | 60 | g/L | 005083 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 0,60 l/1 ton toxuma | Buğda | Bərk sürmə xəstəliyi | Sapından əvvəl toxum materialının<br>dərmanlanması nəzərdə tutulur. | -/1 | 7(3) |
| 2121 | Fumazin M-45 | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 80 | % | 005084 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 2,0 kq/ha | Üzüm | Mildiu | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/3 | 7(3) |
| 2122 | Hektaş Bakır | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper oxychloride equivalent to 50% metallic copper | 50 | % | 005085 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 350 q/100 l suya | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə çiçəklənmədən əvvəl,<br>2-ci çiləmə isə meyvələrin formalaşmasından sonra<br>tətbiq olunur. | 15/2 | 7(3) |
| 2123 | Resital Duo | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE)<br>Florasulam | 452,42<br>6,25 | g/L | 005086 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 0,7 l/ha | Buğda | Birillik və çoxillik ikiləpəli alaqlar | Mədəni bitkinin kollanma boruyaçıxma mərhələsində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2124 | Venti | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Thiacloprid | 240 | g/L | 005087 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 0,4-0,5 | Alma | Meyvəyeyən, Mənanələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 7/2 | 7(3) |
| 2125 | Theory | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Cyprodinil<br>Fludioxonil | 150<br>100 | g/L | 005088 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 1,25-1,5 | Üzüm | Boz çürümə | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/3 | 7(3) |
| 2126 | Monett | "Hektaş Ticaret T.A.Ş" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione<br>Nicosulfuron | 37,5<br>15 | g/L | 005089 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 2,0-3,0 l/ha | Qarğıdalı | Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar | Mədəni bitkinin 3-6 yarpaq və alaq otunun ilkin inkişaf mərhələsində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2127 | Herbimat 330 EC | "Ferbis Tarim Tic. Ve San. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Pendimethalin | 330 | g/L | 005090 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 5,0 l/ha | Qarğıdalı | Birillik taxıl fəsiləsi və ikiləpəli alaqlar | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2128 | Metalaxyl 35% WS | "Kr Lifesciences Pvt. Ltd" | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metalaxyl | 35 | % | 005093 | 21.01.2025 | 21.01.2030 | Hindistan Respublikası | 100 kq toxuma/600 qr | Günəbaxan | Mildiu | Sapından əvvəl toxumun dərmanlanması üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/1-2 | 7(3) |
| 2129 | Pyrimil 500 EC | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Pirimiphos methyl | 500 | g/L | 005103 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 5 l/ha 1000 l işçi məhlula | Xiyar | Minalayıcı güvə | Yarpaqların 5-6 adad və meyvələrin formalaşması<br>fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/1-2 | 7(3) |
| 2130 | Bayoud 10 EC | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Penconazole | 100 | g/L | 005104 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 0,5 l/ha 800-1000 l işçi məhlula | Xiyar | Unlu şeh | Bitkinin 5-6 meyvələrin formalaşması fazalarında<br>yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiq olunur. | -/2 | 7(3) |
| 2131 | Metazeb WP | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb<br>Metalaxyl | 640<br>80 | g/kg | 005105 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 2,5 kq/ha | Meyvə | Damğıl, Unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2132 | Kresolid | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Boscalid<br>Kresoxim methyl | 200<br>100 | g/L | 005106 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 0,3 l/ha 800-1000 l işçi məhlula | Xiyar | Unlu şeh | Yarpaqların 5-6 adad və meyvələrin formalaşması<br>fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/2 | 7(3) |
| 2133 | Peros | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Pyrimethanil | 400 | g/L | 005107 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 1,2 l/ha | Meyvə | Damğıl, monilioz | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2134 | Azox 50 WDG | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin | 500 | g/kg | 005108 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 0,5 l/ha | Meyvə | Damğıl, unlu şeh | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 25/2 | 7(3) |
| 2135 | Vertamectin Forte WG | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Abamectin | 50 | g/kg | 005109 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 0,25 kq/ha | Pomidor (istixana) | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 3/2 | 7(3) |
| 2136 | Dezimin 2.5 EC | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 005110 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 0,3 l/ha 100 l işçi mahlul | Xiyar | Bostan mənanəsi | Yarpaqların 5-6 adad və meyvələrin formalaşması<br>fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/2 | 7(3) |
| 2137 | Devalan 20 SP | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 200 | g/kg | 005111 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 0,3 kq/ha 1000 l işçi mahlula | Xiyar | Bostan mənanəsi | Yarpaqların 5-6 adad və meyvələrin formalaşması<br>fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2138 | Difend EC | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole | 250 | g/L | 005112 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 0,5 l/ha | Pomidor (istixana) | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 3/2 | 7(3) |
| 2139 | Fostal 80 WP | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Fungisid | Fosetyl aluminium | 800 | g/kg | 005113 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 2,0 kq/ha 1000 l işçi mahlula | Xiyar | Yalançı unlu şeh | Yarpaqların 5-6 adad və meyvələrin formalaşması<br>fazasında tətbiqi tövsiyə olunur. | 10/2 | 7(3) |
| 2140 | Armor 350 SC | "DVA Agro GmbH." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid<br>Lambda-cyhalothrin | 200<br>150 | g/L | 005114 | 23.01.2025 | 23.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 0,25 l/ha | Pomidor (istixana) | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu<br>ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 3/2 | 7(3) |
| 2141 | Kocide 2000 | "Cosaco LLC." | Amerika Birləşmiş Ştatları | Pestisid | Fungisid | Copper Hydroxide equvalent to 35% metallic copper | 53.8 | % | 005115 | 24.01.2025 | 24.01.2030 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 1) 1.75-2.5, 2) 2.0-2.5,<br>3) 4.6-6.0, 4 və 5) 1.75-2.5 kq/ha | 1) Üzüm 2) Alma 3) Şaftalı<br>4) Kartof 5) Pomidor | 1) Mildiu 2) Damğıl 3) Yarpaq qıvrılması, Bakterial yanığı, Bakterial ləkəlik, Fitoftora<br>4) Fitoftora 5) Erkən yarpaq yanığı, Bakterial ləkəlik | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 10-10/3<br>10-15/3<br>10-15/3<br>7-10/2<br>5-10/2 | 7(3) |
| 2142 | Zuum 10 SC | "Ertar Kimya Tar. Ürün. ve Alt. İmal. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti" | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 005116 | 28.01.2025 | 28.01.2030 | Türkiyə Respublikası | 0.30 l/ha | Pambıq | Hörümçək gənəsi | Orta hesabla 1 yarpaqda 4-5 adad<br>zərərverici olduqda tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/1-2 | 7(3) |
| 2143 | Shizuku | "Pilarquim (Shangai) Co.Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Spirotetramat<br>Abamectin | 124<br>31 | g/L | 005117 | 28.01.2025 | 28.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 60 ml/100 l su | Armud | Armud yarpaq biraciyi , Armud ballıcası | Yarpaq başına 1-2 adad sürfə və nimfalar aşkar olunduqda<br>yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 12-15/2 | 7(3) |
| 2144 | Biovertimek | "Shanghai Agrochina Chemical Co., Ltd" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Bitki boy tənzimləyici | Ethephon | 720 | g/L | 005118 | 30.01.2025 | 30.01.2030 | Çin Xalq Respublikası | 50 ml/ha | Pambıq əkinləri | | Vegetasiya müddətində<br>çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/3 | 7(3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2145 | Poltiglia Manica 20 WG | "Manica S.p.A." | İtaliya Respublikası | Pestisid | Fungisid | Copper metal | 20 | % | 005119 | 30.01.2025 | 30.01.2030 | İtaliya Respublikası | 5,0 kq/ha | Xiyar (istixana) | Yalançı unlu şeh xəstəliyi | Meyvələrin formalaşması və xəstəliyin intensiv inkişafa başlaması mərhələsində dərmanlanmanın apanılması tövsiyə olunur. | 22-25/2 | 7(3) |
| 2146 | Caniplan 20 SP | "Cansa Kimya San.ve Tic. Ltd. Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Acetamiprid | 20 | % | 005120 | 14.02.2025 | 14.02.2030 | Türkiyə Respublikası | 0,025-0,04 | Kartof | Kalorado kartof böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. | 14/1-2 | 7(3) |
| 2147 | Kotoox 10 SC | "Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Etoxazole | 110 | g/L | 005121 | 14.02.2025 | 14.02.2030 | Türkiyə Respublikası | 25 ml/100 l suya | Alma | Avropa qırmızı hörümçəyi | Alma bitkisində yarpaq səthində 8-10 ədəd zərərvericinin sürfələri müşahidə olunduqda tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/2 | 7(3) |
| 2148 | Oxyfene 2 E | "Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Oxyfluorfen | 240 | g/L | 005122 | 14.02.2025 | 14.02.2030 | Türkiyə Respublikası | 2,5 l/ha 400 l suya | Armud bağı | Alaq otları | Vegetasiyanın əvvəlində alaq otlarına qarşı tətbiq edilir. | 15/1-2 | 7(3) |
| 2149 | Copentan SC | "Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Metallic copper equivalent to copper sulphate | 65.82 | g/L | 005123 | 14.02.2025 | 14.02.2030 | Türkiyə Respublikası | 125 ml/100 l suya | Armud | Dəmgil | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə edilir | 7-10/2 | 7(3) |
| 2150 | Mancozeb 75% WP | "Kr Lifesciences Pvt.Ltd" | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb | 75 | % | 005142 | 25.02.2025 | 25.02.2030 | Hindistan Respublikası | 1500 q/750 l suya | Kartof | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. | 20/2 | 7(3) |
| 2151 | Mancozeb 64% + Metalaxyl 8% WP | "Kr Lifesciences Pvt.Ltd" | Hindistan Respublikası | Pestisid | Fungisid | Mancozeb<br>Metalaxyl | 64<br>8 | % | 005143 | 25.02.2025 | 25.02.2030 | Hindistan Respublikası | 1800 q/1000 l suya | Kartof | Fitoftora | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. | 20/2 | 7(3) |
| 2152 | Skystar | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Fungisid | Azoxystrobin<br>Cyproconazole | 200<br>80 | g/L | 005145 | 25.02.2025 | 25.02.2030 | Çin Xalq Respublikası | 500 ml/ha | Çəltik | Yarpaq ləkə xəstəliyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə edilir. | 56/1-2 | 7(3) |
| 2153 | Gavan Plus | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd." | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Mesotrione<br>Nicosulfuron | 75<br>30 | g/L | 005146 | 25.02.2025 | 25.02.2030 | Çin Xalq Respublikası | 2000 ml/ha | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik ikilapalı alaq otlarına qarşı tətbiq edilir. | Qarğıdalının təkrar əkinlərində bitkinin inkişafının 7-8 yarpaq<br>əmələgəlmə mərhələsində alaqlara qarşı çilənməlidir. | 60/1-2 | 7(3) |
| 2154 | Radar | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Bitki inkişaf tənzimləyici | Sodium naphthalene acetate<br>Sodium p-nitrophenolate<br>Sodium o-nitrophenolate<br>Sodium 5-nitroguaiacolate | 25<br>3<br>2<br>1 | g/L | 005147 | 25.02.2025 | 25.02.2030 | Türkiyə Respublikası | 100 ml/100 lt suya | Üzüm | | Vegetasiya müddətində yarpaqlar üzərinə çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15-20/5 | 7(3) |
| 2155 | Korazim | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Clopyralid | 100 | g/L | 005154 | 25.02.2025 | 25.02.2030 | Türkiyə Respublikası | 1 l/ha | Buğda | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar | Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/1-2 | 7(3) |
| 2156 | Sphinx | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Tribenuron-methyl | 75 | % | 005155 | 25.02.2025 | 25.02.2030 | Türkiyə Respublikası | 10 q/ha | Buğda | Birillik və çoxillik enliyarpaqlı alaqlar | Alaq otlarının ilkin fazalarında tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/1-2 | 7(3) |
| 2157 | Splash | "Agri Sciences Tarım ve İlaç Ür.San.ve Tic.Ltd.Şti. | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Fungisid | Difenoconazole<br>Propiconazole | 150<br>150 | g/L | 005156 | 25.02.2025 | 25.02.2030 | Türkiyə Respublikası | 450 ml/ha | Buğda | Xəstəliklər (Unlu şeh, sarı pas) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 21/1-2 | 10(5) |
| 2158 | Qelifas, EC (Гелифас, КЭ) | "Şans Enterprayz" MMC (ООО Шанс Энтерпрайз) | Rusiya Federasiyası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb | 150 | g/L | 005157 | 03.03.2025 | 03.03.2030 | Rusiya Federasiyası | 0,3 l/ha | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni (gilaqurdu) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 12/2 | 7(3) |
| 2159 | Nicoking | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Nicosulfuron | 40 | g/L | 005161 | 06.03.2025 | 06.03.2030 | Çin Xalq Respublikası | 1250 ml/ha | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik ikilapalı alaq otlarına qarşı tətbiq edilir. | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/1-2 | 7(3) |
| 2160 | Teamspray | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | 2,4-D 2-Ethylhexyl ester<br>Florasulam | 452.42<br>6.25 | g/L | 005162 | 06.03.2025 | 06.03.2030 | Çin Xalq Respublikası | 700 ml/ha | Qarğıdalı | Birillik və çoxillik ikilapalı alaq otlarına qarşı | Vegetasiya müddətində yarpaqdan çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 60/1-2 | 7(3) |
| 2161 | Valesure | "Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.", | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Flazasulfuron | 25 | % | 005163 | 06.03.2025 | 06.03.2030 | Çin Xalq Respublikası | 200 q/ha | Üzüm | Birillik ikilapalı və birlapalı alaq otları | Nisbi sükunət dövründə gövdəliklər açılana qədər tətbiqi tövsiyə olunur | 40-60/3 | 7(3) |
| 2162 | Bimark | "Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 350 | g/L | 005180 | 06.03.2025 | 06.03.2030 | Çin Xalq Respublikası | 1696,5 ml/ha | Yaylıq kartof əkinləri | Birillik enliyarpaq alaq otları | Alaq otunun vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 45/1-2 | 7(3) |
| 2163 | Pajero | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İndoxacarb<br>Abamectin | 75<br>18 | g/L | 005184 | 10.03.2025 | 10.03.2030 | Türkiyə Respublikası | 0,7 l/ha | Alma | Alma meyvəyeyəni | Meyvələrdə 2%-li sirayatlanma aşkar olunduqda və yaxud 1 feromon tələdə 5-7 ədəd kəpənək olduqda tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/3-4 | 7(3) |
| 2164 | Smilodon | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid-akarisid | Paraffin Oil (Cas Nr8042-47-5) | 800 | g/L | 005185 | 10.03.2025 | 10.03.2030 | Türkiyə Respublikası | 1) 1,5 l, 1,0 l, 0,8 l 2) 3,0 l, 0,8 l, 0,5 l | 1) Armud 2) Şaftalı | 1) Armud ballıcası 2) Tut yasticası | 1) Çiçəklənmədən öncə çəhrayı konus mərhələsində tətbiqi tövsiyə olunur.<br>2) Sürfələrin təkrar göründüyü zaman tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2-3 | 7(3) |
| 2165 | Sunalpha 20 EC | "Safa Tarım A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Esfenvalerate | 200 | g/L | 005186 | 10.03.2025 | 10.03.2030 | Türkiyə Respublikası | 7,5 ml/100 l su yaxud 75 ml/ha | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni (gilaqurdu) | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 15/2 | 7(3) |
| 2166 | Banderilla 70 WP | "Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Herbisid | Metribuzin | 70 | % | 005218 | 18.03.2025 | 18.03.2030 | Türkiyə Respublikası | 0.75-1.0 kq/ha | Pomidor | Birillik ikilapalı və taxıl fəsiləsi alaqları | Şitil əkilməsindən əvvəl torpağa çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | -/1 | 7(3) |
| 2167 | Dekagard 25 EC | "Doğal Kim. Mad. ve Zirai İlaç. San. ve Tic. A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Deltamethrin | 25 | g/L | 005219 | 18.03.2025 | 18.03.2030 | Türkiyə Respublikası | 1) 0.05-0.15 l/ha; 2) 0.3 l/ha | 1) Alma; 2) Kartof | 1) Meyvəyeyən; 2) Kolorado kartof böcəyi | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 30/2 | 7(3) |
| 2168 | Jaguar 10 SG | "Evergreen Agrochemical Co. LTD" | Çin Xalq Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Emamectin Benzoate | 10 | % | 005220 | 18.03.2025 | 18.03.2030 | Çin Xalq Respublikası | 20 q/100 l suya | Pomidor (istixana) | Mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 7/2 | 7(3) |
| 2169 | Fenoxycarb 25 WP | "Modern İnsecticides Limited." | Hindistan Respublikası | Pestisid | İnsektisid | Fenoxycarb | 250 | g/kg | 005221 | 18.03.2025 | 18.03.2030 | Hindistan Respublikası | 0.6 kq/ha | Üzüm | Salxım yarpaqbükəni | Vegetasiya müddətində tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/2 | 7(3) |
| 2170 | Kingsor 5 EC | "Koruma Klor Alkali San ve Tic.A.Ş." | Türkiyə Respublikası | Pestisid | Akarisid | Hexythiazox | 50 | g/L | 005222 | 19.03.2025 | 19.03.2030 | Türkiyə Respublikası | 1.2 l/ha | Pambıq | Gənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 14/2 | 7(3) |
| 2171 | Velum Prime SC 400 | "Bayer AG." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | Nematisid | Fluopyram | 400 | g/L | 005223 | 19.03.2025 | 19.03.2030 | Almaniya Federativ Respublikası | 0,6 l/ha | Pomidor (örtülü sahə) | Kök, gövdə, fir nematodları | Şitillər əkilənə qədər torpağa çiləmək və sonrakı işləmə 30-40 gündən sonra tətbiqi tövsiyə olunur. | 30-40/2 | 7(3) |
| 2172 | Confidor SC 350 | "Bayer AG." | Almaniya Federativ Respublikası | Pestisid | İnsektisid | İmidacloprid | 350 | g/L | 005224 | 19.03.2025 | 19.03.2030 | Almaniya Federativ Respublikası | 0,2-0,35 l/ha | Meyvə | Mənənələr | Vegetasiya müddətində çiləmə üsulu ilə tətbiqi tövsiyə olunur. | 20/1-2 | 7(3) |